

附表二十六之二 CDAI (Crohn's disease activity index)

總分最高為 600 分

| 臨床或檢驗項目   | 加權   | 得分 |
|---|------|----|
| 每星期中每天稀便與軟便次數之總和  | X 2  |    |
| 每星期中每天腹痛分數之總和<br>(0=無, 1=輕微, 2=中度, 3=嚴重; 每星期總和: 0-21)   | X 5  |    |
| 每星期中每天身體狀況分數之總和<br>(0=好, 1=稍差, 2=差, 3=很差, 4=極差; 每星期總和: 0-28)  | X 7  |    |
| 併發症之發生  | X 20 |    |
| 服用強的止瀉藥或鴉片類藥物來止瀉  | X 30 |    |
| 腹部有腫塊<br>(0=無, 2=可能有摸到, 5=確定有)  | X 10 |    |
| 血紅素 hematocrit 與正常值(男 47%,女 42%)之差距(差 1%=1 分)   | X 6  |    |
| 與標準體重之百分比差距(差 1%=1 分)   | X 1  |    |
| 有下列項目各加 1 分<br>1. 關節痛或關節炎<br>2. 眼睛炎 iris or uveitis<br>3. 發生 erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, 或 aphthous ulcers<br>4. 肛裂或肛門瘻管或膿瘍<br>5. 身體其他地方瘻管<br>6. 最近一週內曾有發燒體溫超過 38.5°C |      |    |
| <b>總 分</b>  |      |    |