

114 年

門診透析整體性醫療品質資訊公開報告



衛生福利部

中央健康保險署

115 年 7 月

目 錄

壹、前言.....	1
貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義.....	2
參、指標值監測結果.....	15
一、血液透析.....	15
指標 1：血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin).....	15
指標 2：血液透析_尿素氮透析效率-URR.....	19
指標 3：血液透析_貧血檢查-Hb.....	22
指標 4：血液透析_住院率（住院人次/每千人）.....	25
指標 5：血液透析_死亡率（死亡人數/每百人）.....	29
指標 6：瘻管重建率(重建次數/每千人月).....	32
指標 7：血液透析_脫離率.....	34
指標 8：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率.....	37
指標 9：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率.....	39
指標 10：55 歲以下血液透析病人移植登錄率.....	41
指標 11：血液透析_鈣磷乘積.....	43
指標 12：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率.....	46
指標 13：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率.....	48
二、腹膜透析：.....	50
指標 1：腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin).....	50
指標 2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V.....	54
指標 3：腹膜透析_貧血檢查-Hb.....	57
指標 4：腹膜透析_住院率（住院人次/每千人）.....	60
指標 5：腹膜透析_死亡率（死亡人數/每百人）.....	64
指標 6：腹膜透析_腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每百人月）.....	67
指標 7：腹膜透析_脫離率.....	69
指標 8：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率.....	72
指標 9：腹膜透析_C 型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率.....	74
指標 10：55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率.....	76
指標 11：腹膜透析_鈣磷乘積.....	78
指標 12：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率.....	81
指標 13：腹膜透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率.....	83
三、整體透析.....	85
指標 1：C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率.....	85
指標 2：HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率.....	87
肆、結論：.....	89
附錄 表 1、114 年整體性監測結果表.....	90

附錄 表 2、114 年分區別指標監測結果彙整表.....	96
-------------------------------	----

壹、前言

● 緣起：

本報告係依據「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」整體性醫療品質資訊之門診透析公開項目暨「全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案」之專業醫療服務品質指標編列，以健保特約醫療機構之醫療費用申報資料及透析院所上傳至健保署 VPN 系統資料為主要資料來源，彙編各指標趨勢情形而成；主要分為血液透析及腹膜透析 2 大部分，呈現各指標之操作型定義、整體與健保署 6 個分區業務組¹及醫療院所各層級別之監測統計。

● 意義：

本報告指標項目依其屬性區分為正向指標、負向指標、參考指標及規定合理範圍指標。對正向指標之監測目的，在於期待指標數值呈上升或平穩但維持高於某一數值之趨勢，若呈現明顯下降趨勢，則需進一步瞭解原因；反之，對負向指標，則期待指標數值呈下降或平穩但維持低於某一數值之趨勢，若呈現明顯上升趨勢，則需進一步瞭解原因；對於參考指標及規定合理範圍指標之監測目的，在於期待指標數值呈平穩趨勢，若呈現巨幅變動，則需進一步瞭解原因。

● 特別聲明：

本報告資料無法反映完整醫療過程與結果，因此，指標數字的表現可能為多重原因造成，醫療適當性仍需就病人情形由醫療專業認定，不應直接認定反映品質，請使用者審慎解讀。

註 1；健保署 6 個分區係指中央健康保險署臺北、北區、中區、南區、高屏及東區等六個分區服務範圍。

貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義

第一部分：血液透析

指標1. 營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白(Albumin)人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白(Albumin)檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白(Albumin)檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白(Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl(BCP法)之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗血清白蛋白(Albumin) BCG法或BCP法人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均值*(1 $\pm$ 10%)為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均值*(1-10%)為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標2. 尿素氮透析效率-URR

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗URR人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報URR檢驗值之總和。

分母：申報URR檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗 $URR \geq 65\%$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗 URR 人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $值 * (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $值 * (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗 $Hb > 8.5g/dL$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $值 * (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $值 * (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標4. 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所之血液透析病人總住院次數。

分母：追蹤期間之血液透析病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*1000(住院次數/每千人)。

※病患歸屬於統計期間最多透析次數之院所，若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多之院所為歸屬。

二、參考值：本項為負向指標，依特約類別分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，以最近3年平均値*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間<1年之死亡率

分子：追蹤期間血液透析小於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間血液透析小於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100(人數/每百人)。

(二) 透析時間≥1年之死亡率

分子：追蹤期間血液透析大於等於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間血液透析大於等於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100(人數/每百人)。

二、參考值：

(一) 透析時間<1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均

值*(1+10%)為上限。

(二) 透析時間 $\geq$ 1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均
值*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標6. 瘻管重建率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有血液透析病人重新接受動靜脈瘻管
或人工血管手術前90天申報資料計算歸屬院所之
總次數。

分母：追蹤期間之血液透析病患歸屬原則總病人月數。

計算：〔分子/分母〕*1000 (人次/每千人月)。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一) 脫離率(I)-腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受
透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二) 脫離率(II)-因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值：本項列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標8. B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體 (anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下血液透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下血液透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下血液透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均 $\times(1-10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每年。

指標11. 鈣磷乘積

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人測量鈣磷乘積人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 合格率

分子：分母病人測量鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\text{值} \times (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標12. B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報HBsAg檢驗病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

指標13. C型肝炎抗體(anti-HCV) 受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報anti-HCV檢驗病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

第二部分：腹膜透析

指標1. 營養狀態-血清白蛋白 (Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白(Albumin)人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白(Albumin)檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白(Albumin)檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白(Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl(BCP法) 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗血清白蛋白(Albumin)BCG法或BCP法人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均值*($1\pm 10\%$)為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均值*($1-10\%$)為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標2. 尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Weekly Kt/V檢驗值之總和。

分母：申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Weekly Kt/V人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\pm 10\%$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\pm 10\%$ 為下限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\pm 10\%$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\pm 10\%$ 為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標4. 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所之腹膜透析病人總住院次數。

分母：追蹤期間之腹膜透析病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*1000(住院次數/每千人)。

※病患歸屬於統計期間最多透析次數之院所，若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多之院所為歸屬。

二、參考值：本項為負向指標，依特約類別分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，以最近3年平均値*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間<1年之死亡率

分子：追蹤期間腹膜透析小於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間腹膜透析小於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100(人數/每百人)。

(二) 透析時間≥1年之死亡率

分子：追蹤期間腹膜透析大於等於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間腹膜透析大於等於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100(人數/每百人)。

二、參考值：

(一) 透析時間<1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均

值*(1+10%)為上限。

(二) 透析時間 $\geq$ 1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均值*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標6. 腹膜炎發生率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人發生腹膜炎前90天申報資料計算歸屬院所之發生腹膜炎總次數。

分母：追蹤期間之病患歸屬原則總病人月數。

計算：〔分子/分母〕*100 (人次/每百人月)。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一) 脫離率(I)-腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二) 脫離率(II)-因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值：本項列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標8. B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下腹膜透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下腹膜透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下腹膜透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均 $\times(1-10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每年。

指標11. 鈣磷乘積

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人測量鈣磷乘積人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 合格率

分子：分母病人測量鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\text{值} \times (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標12. B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報HBsAg檢驗病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

指標13. C型肝炎抗體(anti-HCV) 受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報anti-HCV檢驗病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

第三部分：整體透析

指標1：C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率

一、公式說明：

分子：統計期間及追蹤統計期前3年申報HCV RNA檢查或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數。

分母：慢性透析病人C型肝炎抗體(anti-HCV)陽性人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均值*(1-10%)為下限。
(此項指標為110年新增項目)

三、監測頻率：每年。

指標2：HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率

一、公式說明：

分子：C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數(排除最末次收案治療失敗、復發與再感染者)。

分母：於統計期間及追蹤統計期前3年慢性透析病人HCV RNA陽性或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均值*(1-10%)為下限。(此項指標為110年新增項目)

三、監測頻率：每年。

參、指標值監測結果

一、 血液透析

指標 1：血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

(一) 參考值：

1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，114 年為 88.26%~100.00%。

2.合格率：

(1)血清白蛋白(Albumin)≥3.5gm/dl(BCG 法)之百分比：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，114 年為≥85.05%。

(2)血清白蛋白(Albumin)≥3.0gm/dl(BCP 法)之百分比：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，114 年為≥85.62%。

(二) 整體監測結果：

1.114 年 Albumin 受檢率為 97.98%，較 113 年之 98.11%下降，符合規定合理範圍。


2.114 年 Albumin(BCG 法)≥3.5gm/dl 之百分比為 94.78%，較 113 年之 94.87%下降，於參考值範圍。

3.114 年 Albumin(BCP 法)≥3.0gm/dl 之百分比為 97.09%，較 113 年之 94.92%上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：

Albumin 受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。


血液透析_Albumin-受檢率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	97.95%	98.28%	97.71%	98.17%	97.63%	97.06%	98.10%
113年	97.91%	98.15%	97.63%	98.00%	98.09%	97.00%	98.11%
114年	97.92%	97.57%	97.57%	97.74%	98.08%	97.07%	97.98%


Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。

血液透析_Albumin(BCG) ≥ 3.5 百分比



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	95.26%	94.58%	92.86%	94.28%	93.83%	94.17%	94.30%
113年	95.66%	95.01%	94.28%	94.65%	94.22%	94.52%	94.87%
114年	95.25%	95.05%	94.28%	94.48%	94.53%	94.24%	94.78%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	94.02%	93.84%	94.04%	97.30%	100.00%	100.00%	94.60%
113年	94.30%	93.59%	95.13%	94.77%	100.00%	97.50%	94.92%
114年	96.58%	94.63%	98.31%	98.68%	100.00%	99.23%	97.09%

(四) 層級別：

Albumin 受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。


血液透析_Albumin-受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.15%	98.11%	96.82%	98.03%	98.10%
113年	98.44%	97.82%	97.02%	98.01%	98.11%
114年	98.09%	97.15%	97.10%	97.89%	97.98%

Albumin(BCG 法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。


血液透析_Albumin(BCG) ≥ 3.5 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	95.09%	92.93%	92.20%	95.00%	94.30%
113年	95.10%	93.68%	92.76%	95.54%	94.87%
114年	96.03%	94.11%	92.50%	95.14%	94.78%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。

血液透析_Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	100.00%	92.38%	98.07%	98.67%	94.60%
113年	96.79%	92.73%	96.83%	98.51%	94.92%
114年	100.00%	95.76%	97.92%	98.60%	97.09%

-：當年度該層級院所無使用 BCP 法檢測 Albumin。

指標 2：血液透析_尿素氮透析效率-URR

(一) 參考值：


- 1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，114 年為 88.22%~100.00%。
- 2.合格率：URR ≥ 65%之百分比以最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，114 年為 ≥ 88.97%。

(二) 整體監測結果：

- 1.114 年 URR 受檢率為 97.94%，較 113 年之 98.05%下降，符合規定合理範圍。
- 2.114 年 URR ≥ 65%之百分比為 98.83%，較 113 年之 98.84%下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


URR 受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	97.91%	98.14%	97.71%	98.16%	97.59%	96.97%	98.06%
113年	97.87%	97.97%	97.59%	97.97%	98.00%	96.96%	98.05%
114年	97.88%	97.46%	97.56%	97.72%	98.01%	97.07%	97.94%

URR $\geq$ 65%之百分比：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。

血液透析_尿素氮透析效率- $\geq$ 65%之百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	98.96%	98.54%	98.88%	99.05%	99.03%	98.37%	98.93%
113年	98.91%	98.54%	98.83%	98.89%	98.89%	97.91%	98.84%
114年	98.90%	98.57%	98.83%	98.83%	98.83%	98.42%	98.83%

(四) 層級別：

URR 受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。


血液透析_尿素氮透析效率-URR檢查比率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.05%	98.00%	96.77%	97.99%	98.06%
113年	98.32%	97.64%	96.95%	97.97%	98.05%
114年	98.01%	97.07%	96.97%	97.84%	97.94%

URR $\geq$ 65%之百分比：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。

血液透析_尿素氮透析效率- $\geq$ 65%之百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.72%	98.61%	98.57%	99.04%	98.93%
113年	98.74%	98.55%	98.55%	98.88%	98.84%
114年	98.73%	98.51%	98.51%	98.88%	98.83%

指標 3：血液透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


- 1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，114 年為 88.40%~100.00%。
- 2.合格率：Hb>8.5g/dL 之百分比以最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，114 年為 ≥88.52%。

(二) 整體監測結果：

- 1.114 年 Hb 受檢率為 98.09%，與 113 年之 98.25%下降，符合規定合理範圍。
- 2.114 年 Hb>8.5g/dL 之百分比為 98.55%，較 113 年之 98.43%上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：


Hb 受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	98.00%	98.39%	97.80%	98.35%	97.98%	97.23%	98.25%
113年	97.88%	98.41%	97.85%	98.23%	98.31%	97.27%	98.25%
114年	97.89%	97.97%	97.67%	97.89%	98.15%	97.41%	98.09%

Hb>8.5g/dL 之百分比：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。

血液透析Hb>8.5g/dL百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	98.15%	98.41%	97.98%	98.58%	98.68%	97.02%	98.33%
113年	98.17%	98.23%	98.25%	98.46%	99.06%	97.93%	98.43%
114年	98.58%	98.26%	98.46%	98.64%	98.75%	97.80%	98.55%

(四) 層級別：


Hb 受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。

血液透析- Hb 受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.41%	98.17%	97.09%	98.16%	98.25%
113年	98.53%	97.91%	97.27%	98.13%	98.25%
114年	98.21%	97.25%	97.35%	98.01%	98.09%

Hb>8.5g/dL 之百分比：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.60%	98.77%	97.88%	98.03%	98.33%
113年	98.87%	98.61%	98.24%	98.06%	98.43%
114年	99.06%	98.88%	97.96%	98.30%	98.55%

指標 4：血液透析_住院率（住院人次/每千人）

（一）參考值:最近3年平均値*(1+10%)為上限，114年為 ≤ 452.73 。


1. 醫學中心： ≤ 424.85 。
2. 區域醫院： ≤ 502.79 。
3. 地區醫院： ≤ 493.54 。
4. 基層診所： ≤ 421.85 。

（二）整體監測結果：

114 年住院率統計值為 403.42，較 113 年之 409.91 下降，於參考值範圍。

（三）分區別：


住院率：114 年各分區統計值除東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	400.42	392.58	453.95	423.66	414.11	491.83	417.87
113年	397.35	386.95	435.44	418.00	409.88	452.20	409.91
114年	384.48	366.47	428.32	422.91	409.43	490.37	403.42


(四) 層級別：

住院率：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	396.62	454.96	459.71	390.29	417.87
113年	377.61	465.72	445.37	380.97	409.91
114年	384.36	440.78	452.36	375.29	403.42

醫學中心：114 年各分區統計值除東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	419.28	339.44	417.29	351.44	354.56	501.44	396.62
113年	386.45	306.61	405.59	357.48	358.34	487.44	377.61
114年	395.90	336.42	418.85	352.00	352.76	461.54	384.36

區域醫院：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	445.91	399.34	518.44	444.31	463.97	482.61	454.96
113年	463.09	430.98	478.05	481.22	479.35	444.91	465.72
114年	431.74	369.27	466.49	472.46	468.46	474.30	440.78

地區醫院：114 年各分區統計值除南區、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	443.83	423.13	469.58	494.58	462.49	550.42	459.71
113年	437.54	414.60	452.93	478.89	444.35	495.11	445.37
114年	436.54	398.34	443.61	509.78	474.16	555.38	452.36

基層診所：114 年各分區統計值除東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	371.32	370.75	420.17	398.99	395.51	445.21	390.29
113年	370.98	355.23	409.26	381.08	387.56	402.19	380.97
114年	356.35	348.44	402.22	383.43	386.33	457.52	375.29

指標 5：血液透析_死亡率（死亡人數/每百人）

（一）參考值：


- 1.透析時間<1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，
114 年為 ≤ 2.77 。
- 2.透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，
114 年為 ≤ 3.22 。

（二）整體監測結果：

- 1.114 年透析時間<1 年之死亡率為 2.2，較 113 年之 2.36 下降，於參考值範圍。
- 2.114 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為 2.89，較 113 年之 2.82 上升，於參考值範圍。


（三）分區別：

透析時間<1 年之死亡率：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	2.35	2.63	2.85	2.65	2.14	2.77	2.51
113年	2.29	2.50	2.58	2.17	2.26	2.50	2.36
114年	1.98	2.32	2.46	2.40	2.05	2.01	2.20


透析時間 ≥ 1 年之死亡率：114年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	2.89	2.98	2.97	2.83	2.93	3.19	2.93
113年	2.82	2.86	2.73	2.86	2.87	2.68	2.82
114年	2.88	3.03	2.86	2.84	2.84	2.91	2.89

(四) 層級別：


透析時間 < 1 年之死亡率：114年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	1.83	2.07	3.09	2.60	2.51
113年	1.55	2.12	2.72	2.50	2.36
114年	1.24	1.89	2.69	2.35	2.20

透析時間 ≥ 1 年之死亡率：114年各層級統計值除地區醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。

血液透析_透析時間 ≥ 1 年死亡率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	2.18	2.75	3.23	3.01	2.93
113年	2.23	2.73	3.17	2.84	2.82
114年	2.14	2.74	3.25	2.96	2.89

指標 6：瘻管重建率(重建次數/每千人月)


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，114年為 ≤ 2.63 。

(二) 整體監測結果：

114年瘻管重建率為2.06，較113年之2.25下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


瘻管重建率：114年各分區統計值除中區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	1.83	2.03	5.06	2.27	0.93	1.72	2.38
113年	1.77	1.90	4.70	1.95	1.02	2.06	2.25
114年	1.64	1.76	4.36	1.87	0.77	1.69	2.06

(四) 層級別：

瘻管重建率：114 年各層級統計值除區域醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	3.13	3.36	2.41	1.56	2.38
113年	3.02	3.45	2.06	1.41	2.25
114年	2.59	3.16	2.23	1.23	2.06

指標 7：血液透析_脫離率

(一) 參考值:


- 1.脫離率(I)-腎功能回復：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。
- 2.脫離率(II)-腎移植：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

(二) 整體監測結果：

- 1.114 年脫離率(I)腎功能回復為 1.77%，較 113 年之 1.85%下降。
- 2.114 年脫離率(II)腎移植為 0.24%，較 113 年之 0.28%下降。

(三) 分區別:


脫離率(I)腎功能回復：114 年各分區統計值與 113 年比較除臺北、中區下降及高屏持平，其他分區皆上升。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	1.38%	2.30%	1.84%	1.71%	2.01%	2.33%	1.79%
113年	1.82%	2.07%	2.17%	2.01%	1.21%	1.90%	1.85%
114年	1.57%	2.10%	1.79%	2.02%	1.21%	3.60%	1.77%

脫離率(II)腎移植：114 年各分區統計值與 113 年比較，除臺北、北區、中區、南區、東區下降，其他分區皆上升。


血液透析_脫離率(II)-腎移植



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	0.40%	0.32%	0.23%	0.14%	0.30%	0.24%	0.29%
113年	0.44%	0.24%	0.26%	0.14%	0.19%	0.29%	0.28%
114年	0.33%	0.20%	0.23%	0.12%	0.24%	0.10%	0.24%


(四) 層級別：

脫離率(I)腎功能回復：114 年各層級統計值與 113 年比較，除區域醫院、基層診所下降，其他層級皆上升。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	1.42%	1.57%	2.11%	1.88%	1.79%
113年	1.25%	1.61%	2.34%	2.02%	1.85%
114年	1.50%	1.59%	2.49%	1.64%	1.77%

脫離率(II)腎移植：114 年各層級統計值與 113 年比較，各層級皆下降。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	0.68%	0.30%	0.22%	0.24%	0.29%
113年	0.70%	0.34%	0.20%	0.20%	0.28%
114年	0.65%	0.18%	0.16%	0.19%	0.24%

指標 8：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，114年為 $\leq 0.20\%$ 。

(二) 整體監測結果：

114 年 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.18%，與 113 年之 0.2% 下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


B 型肝炎表面抗原轉陽率：114 年各分區統計值除北區、中區、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	0.20%	0.13%	0.21%	0.16%	0.24%	0.31%	0.20%
113年	0.24%	0.18%	0.23%	0.10%	0.18%	0.18%	0.20%
114年	0.14%	0.23%	0.22%	0.17%	0.18%	0.30%	0.18%

(四) 層級別：

B 型肝炎表面抗原轉陽率：114 年各層級統計值除地區醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	0.20%	0.27%	0.19%	0.16%	0.20%
113年	0.19%	0.33%	0.20%	0.13%	0.20%
114年	0.18%	0.20%	0.24%	0.15%	0.18%

指標 9：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，114年為 $\leq 0.26\%$ 。

(二) 整體監測結果：

114 年 C 型肝炎抗體轉陽率為 0.23%，較 113 年之 0.2% 上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：


C 型肝炎抗體轉陽率：114 年各分區統計值除南區、高屏、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	0.20%	0.22%	0.34%	0.32%	0.18%	0.91%	0.26%
113年	0.16%	0.22%	0.24%	0.17%	0.14%	0.55%	0.20%
114年	0.12%	0.20%	0.16%	0.27%	0.39%	0.55%	0.23%

(四) 層級別：

C 型肝炎抗體轉陽率：114 年各層級統計值除區域醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	0.19%	0.26%	0.33%	0.24%	0.26%
113年	0.13%	0.30%	0.27%	0.13%	0.20%
114年	0.19%	0.29%	0.26%	0.18%	0.23%

指標 10：55 歲以下血液透析病人移植登錄率

(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1-10\%)$ 為下限，114年為 $\geq 27.41\%$ 。


(二) 整體監測結果：

114 年 55 歲以下血液透析病人移植登錄率為 31.09%，較 113 年之 31.33%下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：

55 歲以下血液透析病人移植登錄率：114 年各分區統計值除南區低於參考值，其他分區皆於參考值範圍。


血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	33.46%	29.18%	36.32%	27.19%	26.02%	30.74%	31.30%
113年	33.00%	28.87%	35.60%	27.81%	27.19%	30.17%	31.33%
114年	32.97%	28.11%	35.20%	26.60%	28.25%	29.48%	31.09%

(四) 層級別：

55 歲以下血液透析病人移植登錄率：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	48.00%	31.07%	30.14%	26.94%	31.30%
113年	46.36%	29.74%	30.21%	27.38%	31.33%
114年	44.84%	29.77%	28.05%	27.57%	31.09%

指標 11：血液透析_鈣磷乘積

(一) 參考值：


- 1.受檢率:最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，114 年為 88.26%~100.00%。
- 2.合格率(鈣磷乘積 $<60\text{mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比): 最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，114 年為 $\geq 87.65\%$ 。

(二) 整體監測結果：

- 1.114 年血液透析鈣磷乘積受檢率為 97.97%，較 113 年之 98.11%下降，符合規定合理範圍。
- 2.114 年血液透析鈣磷乘積合格率为 97.53%，較 113 年之 97.38%上升，於參考值範圍。


(三) 分區別：

血液透析鈣磷乘積受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	97.95%	98.24%	97.70%	98.16%	97.63%	97.01%	98.09%
113年	97.92%	98.12%	97.62%	97.99%	98.09%	97.00%	98.11%
114年	97.92%	97.55%	97.57%	97.70%	98.06%	97.07%	97.97%


血液透析鈣磷乘積合格率：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	96.84%	97.39%	97.46%	98.07%	97.57%	97.06%	97.44%
113年	96.94%	97.12%	97.65%	97.87%	97.21%	97.09%	97.38%
114年	97.29%	97.30%	97.46%	98.13%	97.46%	96.67%	97.53%


(四) 層級別：

血液透析鈣磷乘積受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.10%	98.12%	96.80%	98.01%	98.09%
113年	98.43%	97.79%	97.03%	98.00%	98.11%
114年	98.07%	97.13%	97.09%	97.88%	97.97%

血液透析鈣磷乘積合格率：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	97.31%	97.32%	97.05%	97.32%	97.44%
113年	97.67%	97.04%	96.99%	97.19%	97.38%
114年	97.72%	97.49%	96.85%	97.30%	97.53%

指標 12：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，114年為88.28%~100.00%。

(二) 整體監測結果：

114 年血液透析 B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率為 98.16%，較 113 年之 98.25%下降，符合規定合理範圍。

(三) 分區別：


血液透析 B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	95.87%	98.24%	96.89%	98.64%	98.40%	96.87%	97.86%
113年	97.27%	97.79%	98.21%	98.19%	97.75%	96.86%	98.25%
114年	97.70%	97.96%	97.71%	97.68%	97.72%	97.04%	98.16%

(四) 層級別

血液透析 B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	97.73%	96.97%	96.57%	96.38%	97.86%
113年	98.21%	97.23%	95.27%	97.39%	98.25%
114年	98.47%	97.32%	94.31%	97.10%	98.16%

指標 13：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，114年為88.55%~100.00%。

(二) 整體監測結果：

114 年血液透析 C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率為 98.51%，較 113 年之 98.46%上升，符合規定合理範圍。

(三) 分區別：


血液透析 C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	97.00%	98.34%	97.02%	98.70%	98.36%	96.56%	98.22%
113年	97.75%	97.82%	98.20%	98.21%	98.19%	96.99%	98.46%
114年	98.06%	98.17%	97.79%	98.74%	97.82%	97.29%	98.51%

(四) 層級別：

血液透析 C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	97.75%	98.08%	96.52%	96.61%	98.22%
113年	98.31%	97.49%	95.67%	97.62%	98.46%
114年	98.58%	97.46%	95.08%	97.39%	98.51%

二、腹膜透析：

指標 1：腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

(一) 參考值：

1.受檢率：最近 3 年平均值*($1\pm 10\%$)為規定合理範圍，114 年為 88.33%~100.00%。

2.合格率：

(1)血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl(BCG 法)之百分比：最近 3 年平均值*($1-10\%$)為下限，114 年為 $\geq 80.68\%$ 。

(2)血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.0 gm/dl(BCP 法)之百分比：最近 3 年平均值*($1-10\%$)為下限，114 年為 $\geq 82.37\%$ 。

(二) 整體監測結果：


1.114 年 Albumin 受檢率為 98.65%，較 113 年之 98.39%上升，符合規定合理範圍。

2.114 年 Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比為 90.11%，較 113 年之 90.09%上升，於參考值範圍。

3.114 年 Albumin(BCP 法) ≥ 3.0 gm/dl 之百分比為 82.56%，較 113 年之 85.84%下降，於參考值範圍。


(三) 分區別：

Albumin 受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	98.48%	99.67%	97.14%	97.79%	98.63%	98.83%	98.31%
113年	99.00%	99.67%	96.45%	98.05%	99.01%	98.27%	98.39%
114年	98.73%	99.46%	97.52%	98.93%	99.16%	97.69%	98.65%


Albumin(BCG 法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	92.06%	90.43%	86.03%	87.57%	89.50%	82.84%	89.33%
113年	91.13%	90.94%	88.25%	89.37%	90.77%	83.53%	90.09%
114年	91.24%	90.52%	86.58%	91.02%	91.20%	88.17%	90.11%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：114 年各分區統計值除北區低於參考值，其他分區皆於參考值範圍。

腹膜透析 Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	95.60%	77.78%	89.74%	95.77%	-	-	94.24%
113年	81.43%	75.00%	97.06%	-	100.00%	-	85.84%
114年	85.71%	50.00%	100.00%	-	-	-	82.56%

-：當年度分區業務組所轄院所無使用 BCP 法檢測 Albumin。

(四) 層級別：

Albumin 受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。


腹膜透析Albumin-受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.81%	98.22%	94.61%	100.00%	98.31%
113年	98.88%	97.54%	99.07%	100.00%	98.39%
114年	98.88%	98.22%	98.62%	98.21%	98.65%

Albumin(BCG 法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。


腹膜透析Albumin(BCG) ≥ 3.5 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	90.07%	89.53%	80.09%	97.22%	89.33%
113年	90.57%	88.88%	89.97%	94.12%	90.09%
114年	91.14%	88.01%	89.34%	89.09%	90.11%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：114 年各層級統計值除地區醫院低於參考值，區域醫院於參考值範圍。

腹膜透析Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	-	94.80%	77.78%	-	94.24%
113年	-	86.00%	83.33%	100.00%	85.84%
114年	-	82.89%	80.00%	-	82.56%

-：當年度該層級院所無使用 BCP 法檢測 Albumin。

指標 2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

(一) 參考值：


1. Weekly Kt/V 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，114 年為 87.24%~100.00%。
2. 合格率：Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，114 年為 $\geq 83.56\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 114 年 Weekly Kt/V 受檢率為 97.79%，較 113 年之 97.44% 上升，符合規定合理範圍。
2. 114 年 Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比為 92.54%，較 113 年之 92.86% 下降，於參考值範圍。


(三) 分區別：

Weekly Kt/V 受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	97.14%	98.15%	95.67%	96.87%	97.00%	98.25%	97.01%
113年	97.96%	98.56%	95.44%	96.84%	98.30%	97.69%	97.44%
114年	97.67%	98.48%	96.51%	98.24%	98.70%	97.69%	97.79%


Weekly Kt/V $\geq$ 1.7 百分比：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	93.67%	94.14%	92.55%	93.82%	92.59%	92.26%	93.33%
113年	93.72%	92.38%	90.16%	95.49%	91.98%	94.67%	92.86%
114年	93.22%	92.60%	89.30%	95.03%	92.47%	92.90%	92.54%


(四) 層級別：

Weekly Kt/V 受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	97.49%	96.88%	92.95%	100.00%	97.01%
113年	98.17%	96.07%	98.46%	100.00%	97.44%
114年	98.01%	97.37%	97.79%	96.43%	97.79%

Weekly Kt/V $\geq$ 1.7 百分比：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	94.09%	93.67%	85.71%	80.56%	93.33%
113年	93.11%	92.78%	90.60%	79.41%	92.86%
114年	93.26%	91.30%	92.66%	87.04%	92.54%

指標 3：腹膜透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


- 1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，114 年為 88.27%~100.00%。
- 2.合格率：Hb>8.5 g/dL 之百分比以最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，114 年為 ≥87.49%。

(二) 整體監測結果：

- 1.114 年 Hb 受檢率為 98.52%，較 113 年之 98.33%上升，符合規定合理範圍。
- 2.114 年 Hb>8.5 g/dL 之百分比為 96.94%，與 113 年之 97.1%下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


Hb 受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	98.64%	99.81%	97.25%	97.39%	98.99%	98.13%	98.37%
113年	99.07%	99.64%	96.04%	97.99%	98.94%	98.26%	98.33%
114年	98.83%	99.45%	96.86%	98.75%	99.02%	97.41%	98.52%

Hb>8.5 g/dL 之百分比：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。

腹膜透析Hb>8.5 g/dL百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	97.46%	97.73%	96.56%	97.32%	97.09%	99.05%	97.27%
113年	97.32%	97.82%	95.88%	96.24%	97.70%	98.23%	97.10%
114年	97.49%	95.41%	96.00%	97.29%	97.53%	98.23%	96.94%

(四) 層級別


Hb 受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。

腹膜透析 HB-受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.73%	98.44%	95.12%	100.00%	98.37%
113年	98.80%	97.47%	99.44%	100.00%	98.33%
114年	98.74%	98.12%	98.51%	97.44%	98.52%

Hb>8.5 g/dL 之百分比：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	97.62%	96.95%	95.60%	100.00%	97.27%
113年	97.32%	96.51%	96.65%	94.44%	97.10%
114年	97.32%	96.03%	96.48%	94.74%	96.94%

指標 4：腹膜透析_住院率（住院人次/每千人）

（一）參考值:最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，114年為 ≤ 463.84 。

1.醫學中心： ≤ 415.90 。

2.區域醫院： ≤ 504.78 。

3.地區醫院： ≤ 582.39 。


4.基層診所： ≤ 994.91 。

（二）整體監測結果：

114 年住院率統計值為 426.07，較 113 年之 433.53 下降，於參考值範圍。

（三）分區別：


住院率：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	436.26	410.08	444.94	378.84	391.44	462.69	419.47
113年	435.19	414.94	477.51	403.27	421.56	392.75	433.53
114年	448.67	372.37	457.86	417.37	380.88	448.80	426.07


(四) 層級別：

住院率：114 年各層級統計值除區域醫院、地區醫院、基層診所高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	373.28	451.69	537.70	1067.57	419.47
113年	386.63	483.90	562.50	812.50	433.53
114年	387.61	483.13	484.85	515.79	426.07


醫學中心：114 年各分區統計值除臺北高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	396.50	362.70	406.04	273.61	353.83	404.76	373.28
113年	392.48	399.51	421.27	308.60	383.68	337.96	386.63
114年	441.49	347.52	409.04	298.79	327.30	352.94	387.61

區域醫院：114 年各分區統計值除中區、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。


腹膜透析(區域醫院)_住院率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	479.11	431.76	444.03	450.26	410.44	560.00	451.69
113年	527.40	410.14	529.53	469.42	434.07	486.96	483.90
114年	448.60	377.36	567.84	503.75	465.38	630.63	483.13

地區醫院：114 年各分區統計值除臺北、南區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。

腹膜透析(地區醫院)_住院率




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	513.16	426.47	603.29	589.74	558.82	-	537.70
113年	266.67	461.83	712.71	583.33	663.79	-	562.50
114年	725.00	428.57	387.88	766.67	572.41	-	484.85

-：該分區業務組所轄地區醫院無歸戶之個案。

基層診所：114 年各分區統計值除高屏高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。

腹膜透析(基層診所)_住院率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	-	807.69	395.83	-	-	-	1067.57
113年	-	625.00	456.52	-	2500.00	-	812.50
114年	-	420.00	116.28	-	3000.00	-	515.79

-：該分區業務組所轄地區醫院無歸戶之個案。

指標 5：腹膜透析_死亡率（死亡人數/每百人）

（一）參考值

1. 透析時間 < 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，114 年為 ≤ 1.36 。
2. 透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，114 年為 ≤ 2.12 。


（二）整體監測結果：

1. 114 年透析時間 < 1 年之死亡率統計值為 1.21，較 113 年之 1.23 下降，於參考值範圍。
2. 114 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率統計值為 1.95，較 113 年之 1.94 上升，於參考值範圍。

（三）分區別：


透析時間 < 1 年之死亡率：114 年各分區統計值除臺北高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。

腹膜透析_透析時間 < 1 年之死亡率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	1.36	1.50	1.55	1.05	1.15	1.85	1.35
113年	1.26	0.76	1.11	0.50	2.40	1.90	1.23
114年	1.73	0.85	0.94	0.40	1.33	0.84	1.21


透析時間 ≥ 1 年之死亡率：114年各分區統計值除中區、高屏、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	2.00	2.11	1.77	2.38	2.00	1.51	2.02
113年	1.76	2.14	1.98	1.92	1.97	2.86	1.94
114年	1.83	1.76	2.22	1.67	2.27	2.26	1.95


(四) 層級別：

透析時間 < 1 年之死亡率：114年各層級統計值除區域醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	0.96	1.50	3.05	0.00	1.35
113年	0.96	1.61	1.27	0.00	1.23
114年	0.93	1.76	0.77	0.00	1.21

透析時間 ≥ 1 年之死亡率：114年各層級統計值除區域醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	1.51	2.51	3.41	0.89	2.02
113年	1.59	2.26	3.48	2.06	1.94
114年	1.58	2.64	1.84	1.39	1.95

指標 6：腹膜透析_腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每百人月）


（一）參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，114年為 ≤ 1.77 。

（二）整體監測結果：

114年腹膜炎發生率統計值為1.69，較113年之1.58上升，於參考值範圍。

（三）分區別：

腹膜炎發生率：114年各分區統計值除中區、高屏高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	1.83	1.65	1.91	1.29	1.45	1.18	1.65
113年	1.46	1.80	1.63	1.48	1.60	2.37	1.58
114年	1.70	1.76	1.83	1.33	1.82	1.37	1.69

(四) 層級別：

腹膜炎發生率：114 年各層級統計值除區域醫院、地區醫院、基層診所高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。

腹膜透析_腹膜炎發生率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	1.67	1.66	1.62	1.94	1.65
113年	1.62	1.82	2.39	1.39	1.58
114年	1.64	1.85	2.10	2.22	1.69

指標 7：腹膜透析_脫離率

(一) 參考值:


- 1.脫離率(I)-腎功能回復：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。
- 2.脫離率(II)-腎移植：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

(二) 整體監測結果：

- 1.114 年脫離率(I)腎功能回復為 0.94%，較 113 年之 0.79% 上升。
- 2.114 年脫離率(II)腎移植為 1.01%，較 113 年之 1.5% 下降。


(三) 分區別：

脫離率(I)腎功能回復：114 年各分區統計值與 113 年比較除北區、中區下降及東區持平，其他分區皆上升。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	1.26%	1.31%	1.39%	1.56%	0.00%	0.00%	1.12%
113年	0.74%	1.52%	1.23%	0.00%	0.66%	0.00%	0.79%
114年	1.05%	0.69%	0.44%	0.78%	1.97%	0.00%	0.94%


脫離率(II)腎移植：114 年各分區統計值與 113 年比較除臺北、北區、中區、南區、東區下降，其他分區皆上升。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	2.11%	1.64%	1.23%	0.74%	1.65%	0.00%	1.54%
113年	1.83%	1.76%	1.48%	1.31%	0.75%	1.34%	1.50%
114年	1.09%	1.24%	0.78%	0.56%	1.43%	0.65%	1.01%


(四) 層級別：

脫離率(I)腎功能回復：114 年各層級統計值與 113 年比較，除地區醫院下降，其他層級皆上升。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	1.04%	1.33%	0.83%	0.00%	1.12%
113年	0.70%	0.44%	3.09%	0.00%	0.79%
114年	1.03%	1.00%	0.00%	0.00%	0.94%

脫離率(II)腎移植：114 年各層級統計值與 113 年比較，各層級皆下降。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	2.10%	0.89%	0.99%	4.00%	1.54%
113年	1.98%	0.60%	2.46%	4.35%	1.50%
114年	1.30%	0.43%	1.54%	0.00%	1.01%

指標 8：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率


(一) 參考值：最近3年平均值*(1+10%)為上限，114年為 $\leq 0.27\%$ 。

(二) 整體監測結果：

114 年腹膜透析 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.21%，較 113 年之 0.17%上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：


腹膜透析 B 型肝炎表面抗原轉陽率：114 年各分區統計值除臺北、中區、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	0.34%	0.44%	0.39%	0.00%	0.84%	0.00%	0.38%
113年	0.17%	0.15%	0.28%	0.13%	0.12%	0.00%	0.17%
114年	0.28%	0.00%	0.29%	0.00%	0.26%	0.79%	0.21%

(四) 層級別：

腹膜透析 B 型肝炎表面抗原轉陽率：114 年各層級統計值除基層診所高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	0.32%	0.38%	0.68%	4.17%	0.38%
113年	0.13%	0.25%	0.00%	0.00%	0.17%
114年	0.25%	0.11%	0.00%	2.22%	0.21%

指標 9：腹膜透析_C 型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率


（一）參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，114年為 $\leq 0.11\%$ 。

（二）整體監測結果：

114 年腹膜透析 C 型肝炎抗體轉陽率為 0.14%，較 113 年之 0.14%持平，高於參考值。

（三）分區別：


腹膜透析 C 型肝炎抗體轉陽率：114 年各分區統計值除中區、南區、高屏高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	0.05%	0.00%	0.18%	0.00%	0.33%	0.00%	0.11%
113年	0.11%	0.14%	0.26%	0.12%	0.11%	0.00%	0.14%
114年	0.00%	0.00%	0.35%	0.13%	0.36%	0.00%	0.14%

(四) 層級別：

腹膜透析 C 型肝炎抗體轉陽率：114 年各層級統計值除區域醫院、地區醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	0.10%	0.14%	0.00%	0.00%	0.11%
113年	0.15%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%
114年	0.09%	0.22%	0.38%	0.00%	0.14%

指標 10：55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率


(一) 參考值：最近3年平均值*(1-10%)為下限，114年為 $\geq 57.54\%$ 。

(二) 整體監測結果：

114 年 55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率為 65.85%，較 113 年之 65.92%下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率：114 年各分區統計值，除高屏、東區低於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	65.37%	59.07%	72.13%	65.19%	54.78%	47.37%	63.87%
113年	64.85%	64.18%	74.20%	65.90%	60.09%	53.09%	65.92%
114年	65.33%	64.07%	74.37%	69.61%	54.82%	52.44%	65.85%

(四) 層級別：

55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	69.99%	55.77%	53.77%	60.00%	63.87%
113年	71.10%	56.78%	63.27%	60.00%	65.92%
114年	69.94%	58.19%	58.90%	59.09%	65.85%

指標 11：腹膜透析_鈣磷乘積

(一) 參考值：


- 1.受檢率:最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，114 年為 88.33%~100.00%。
- 2.合格率(鈣磷乘積 $<60\text{mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比): 最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，114 年為 $\geq 86.50\%$ 。

(二) 整體監測結果：

- 1.114 年腹膜透析鈣磷乘積受檢率為 98.66%，較 113 年之 98.38%上升，符合規定合理範圍。
- 2.114 年腹膜透析鈣磷乘積合格率为 95.73%，較 113 年之 96.31%下降，於參考值範圍。


(三) 分區別：

腹膜透析鈣磷乘積受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	98.44%	99.67%	97.07%	97.79%	98.63%	98.83%	98.28%
113年	99.00%	99.67%	96.38%	98.05%	99.01%	98.27%	98.38%
114年	98.77%	99.46%	97.52%	98.93%	99.16%	97.69%	98.66%


腹膜透析鈣磷乘積合格率：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	96.07%	96.30%	95.47%	96.23%	96.53%	95.86%	96.11%
113年	96.22%	97.23%	95.55%	96.30%	96.11%	97.06%	96.31%
114年	95.86%	95.08%	94.91%	95.66%	96.72%	97.63%	95.73%


(四) 層級別：

腹膜透析鈣磷乘積受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	98.78%	98.18%	94.61%	100.00%	98.28%
113年	98.88%	97.54%	98.77%	100.00%	98.38%
114年	98.90%	98.22%	98.62%	98.21%	98.66%

腹膜透析鈣磷乘積合格率：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	96.33%	96.13%	92.98%	97.22%	96.11%
113年	96.47%	95.75%	96.56%	100.00%	96.31%
114年	95.76%	95.38%	96.36%	94.55%	95.73%

指標 12：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，114年為87.01%~100.00%。

(二) 整體監測結果：

114 年腹膜透析 B 型肝炎表面抗原受檢率為 97.48%，較 113 年之 96.9%上升，符合規定合理範圍。

(三) 分區別：


腹膜透析 B 型肝炎表面抗原受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	96.50%	96.02%	96.71%	97.86%	93.55%	96.83%	96.40%
113年	99.03%	94.43%	95.84%	97.10%	95.02%	93.02%	96.90%
114年	98.57%	96.06%	97.51%	97.91%	94.81%	96.03%	97.48%

(四) 層級別

腹膜透析 B 型肝炎表面抗原受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	95.06%	97.78%	94.56%	95.83%	96.40%
113年	97.08%	96.48%	91.28%	95.24%	96.90%
114年	97.43%	96.66%	94.54%	93.33%	97.48%

指標 13：腹膜透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，114年為87.03%~100.00%。

(二) 整體監測結果：

114 年腹膜透析 C 型肝炎抗體受檢率為 97.34%，較 113 年之 97%上升，符合規定合理範圍。

(三) 分區別：


腹膜透析 C 型肝炎抗體受檢率：114 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	96.21%	95.79%	96.80%	97.57%	93.93%	96.32%	96.27%
113年	98.99%	95.40%	95.66%	97.23%	95.09%	93.38%	97.00%
114年	98.54%	95.97%	97.18%	97.88%	94.67%	95.45%	97.34%

(四) 層級別

腹膜透析 C 型肝炎抗體受檢率：114 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



三、整體透析

指標 1：C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1-10\%)$ 為下限，114年為 $\geq 78.95\%$ 。

(二) 整體監測結果：

114 年 C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率為 85.87%，較 113 年之 86.31% 下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	86.40%	92.09%	80.60%	84.95%	90.39%	97.02%	86.97%
113年	88.03%	89.69%	81.96%	84.36%	87.34%	94.76%	86.31%
114年	88.13%	90.11%	82.57%	83.01%	86.35%	92.07%	85.87%

(四) 層級別：

C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	93.06%	86.69%	89.60%	85.61%	86.97%
113年	93.25%	86.96%	88.95%	84.37%	86.31%
114年	89.50%	87.07%	89.34%	83.50%	85.87%

指標 2：HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率


(一) 參考值：最近3年平均值*(1-10%)為下限，114年為 $\geq 82.45\%$ 。

(二) 整體監測結果：

114 年 HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率為 93.16%，較 113 年之 92.54% 上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：


HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率：114 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
112年	88.85%	89.52%	95.26%	93.09%	92.94%	97.56%	92.15%
113年	90.00%	91.23%	92.70%	94.56%	92.07%	96.20%	92.54%
114年	90.87%	90.28%	95.77%	94.02%	93.80%	91.72%	93.16%

(四) 層級別：

HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率：114 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
112年	95.62%	94.76%	94.10%	89.72%	92.15%
113年	91.67%	95.14%	92.68%	91.33%	92.54%
114年	96.94%	97.27%	92.59%	90.81%	93.16%

肆、結論：

- 一、114年全國統計值之整體監測結果如附錄表1，血液透析部分皆於參考值範圍內；腹膜透析部分除「C型肝炎抗體轉陽率」高於參考值，其餘指標皆於參考值範圍內。
- 二、各分區統計值指標監測結果如附錄表2，部分指標未於參考值範圍：

(一) 負向指標有部分分區高於參考值：

1. 血液透析：住院率、瘻管重建率、B型肝炎表面抗原轉陽率、C型肝炎抗體轉陽率。
2. 腹膜透析：住院率、透析時間<1年死亡率、透析時間 $\geq$ 1年之死亡率、腹膜炎發生率、B型肝炎表面抗原轉陽率、C型肝炎抗體轉陽率。

(二) 正向指標有部分分區低於參考值：血液透析「55歲以下透析病人移植登錄率」與腹膜透析「血清白蛋白(Albumin) $\geq$ 3.0gm/dl(BCP法)之百分比」及「55歲以下透析病人移植登錄率」。

附錄 表1、114年整體性監測結果表

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)	監測結果之趨勢
血液透析			
指標1：營養狀態 血清白蛋白 (Albumin) -受檢率	規定合理範圍	88.26%~100.00% O	114年Albumin受檢率為97.98%，較113年之98.11%下降，符合規定合理範圍。
血清白蛋白(BCG) $\geq$ 3.5之百分比	正向	$\geq 85.05\%$ O	114 年 Albumin(BCG 法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比為94.78%，較113年之94.87%下降，於參考值範圍。
血清白蛋白(BCP) $\geq$ 3.0之百分比	正向	$\geq 85.62\%$ O	114 年 Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比為97.09%，較113年之94.92%上升，於參考值範圍。
指標2： 尿素氮透析效率 URR-受檢率	規定合理範圍	88.22%~100.00% O	114年URR受檢率為97.94%，較113年之98.05%下降，符合規定合理範圍。
URR $\geq 65\%$ 之百分比	正向	$\geq 88.97\%$ O	114 年 URR $\geq 65\%$ 之百分比為98.83%，較113年之98.84%下降，於參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率	規定合理範圍	88.40%~100.00% O	114年Hb受檢率為98.09%，與113年之98.25%下降，符合規定合理範圍。
Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比	正向	$\geq 88.52\%$ O	114 年 Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比為98.55%，較113年之98.43%上升，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)		監測結果之趨勢
指標4： 同院住院率 (住院人次/每千人)	負向	醫學 中心	≤ 424.85 O	114年統計值為403.42，較113年之409.91下降，於參考值範圍(≤ 452.73)。各層級別住院率均於參考值範圍。
		區域 醫院	≤ 502.79 O	
		地區 醫院	≤ 493.54 O	
		基層 診所	≤ 421.85 O	
指標5： 死亡率 (死亡人數/每百人)	透析時間<1年 負向	≤ 2.77 O		114年透析時間<1年之死亡率為2.2，較113年之2.36下降，於參考值範圍。
	透析時間 ≥ 1 年 負向	≤ 3.22 O		114年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為2.89，較113年之2.82上升，於參考值範圍。
指標6： 瘻管重建率 (重建次數/每千人月)	負向	≤ 2.63 O		114年瘻管重建率為2.06，較113年之2.25下降，於參考值範圍。
指標7： 脫離率(百分比) 脫離率(I)- 腎功能回復 脫離率(II)- 腎移植	參考指標	不另訂定		114年脫離率(I)腎功能回復為1.77%，較113年之1.85%下降。 114年脫離率(II)腎移植為0.24%，較113年之0.28%下降。
指標8： B型肝炎表面抗原 (HBsAg)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.20\%$ O		114年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.18%，與113年之0.2%下降，於參考值範圍。
指標9： C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.26\%$ O		114年C型肝炎抗體轉陽率為0.23%，較113年之0.2%上升，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)	監測結果之趨勢
指標10： 55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)	正向	≥27.41% O	114年55歲以下血液透析病人移植登錄率為31.09%，較113年之31.33%下降，於參考值範圍。
指標11： 鈣磷乘積-受檢率	規定合理範圍	88.26%~100.00% O	114年血液透析鈣磷乘積受檢率為97.97%，較113年之98.11%下降，符合規定合理範圍。
鈣磷乘積 < 60 mg ² /dL ²	正向	≥87.65% O	114年血液透析鈣磷乘積合格率為97.53%，較113年之97.38%上升，於參考值範圍。
指標12： B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率	規定合理範圍	88.28%~100.00% O	114年血液透析B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率為98.16%，較113年之98.25%下降，符合規定合理範圍。
指標13： C型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率(百分比)	規定合理範圍	88.55%~100.00% O	114年血液透析C型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率為98.51%，較113年之98.46%上升，符合規定合理範圍。
腹膜透析			
指標1：營養狀態 血清白蛋白(Albumin)-受檢率	規定合理範圍	88.33%~100.00% O	114年Albumin受檢率為98.65%，較113年之98.39%上升，符合規定合理範圍。
血清白蛋白(BCG) ≥ 3.5之百分比	正向	≥80.68% O	114年Albumin(BCG法) ≥ 3.5gm/dl之百分比為90.11%，較113年之90.09%上升，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)		監測結果之趨勢
血清白蛋白(BCP) $\geq$ 3.0之百分比	正向	$\geq 82.37\%$ O		114 年 Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比為82.56%，較113年之85.84%下降，於參考值範圍。
指標2： 尿素氮透析效率 Weekly Kt/V-受檢率	規定合理範圍	87.24%~100.00% O		114年 Weekly Kt/V 受檢率為97.79%，較113年之97.44%上升，符合規定合理範圍。
Weekly Kt/V ≥ 1.7 之百分比	正向	$\geq 83.56\%$ O		114年 Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比為92.54%，較113年之92.86%下降，於參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率	規定合理範圍	88.27%~100.00% O		114年Hb受檢率為98.52%，較113年之98.33%上升，符合規定合理範圍。
Hb>8.5g/dL之百分比	正向	$\geq 87.49\%$ O		114年Hb>8.5 g/dL 之百分比為96.94%，與113年之97.1%下降，於參考值範圍。
指標4： 住院率 (住院人次/每千人)	負向	醫學中心	≤ 415.90 O	114年統計值為426.07，較113年之433.53下降，於參考值範圍(≤ 463.84)；各層級別住院率均於參考值範圍。
		區域醫院	≤ 504.78 O	
		地區醫院	≤ 582.39 O	
		基層診所	≤ 994.91 O	

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)	監測結果之趨勢
指標5： 死亡率 (死亡人數/每百人)	透析時間<1年 負向	≤ 1.36 O	114年透析時間<1年之死亡率統計值為1.21，較113年之1.23下降，於參考值範圍。
	透析時間 ≥ 1 年 負向	≤ 2.12 O	114年透析時間 ≥ 1 年之死亡率統計值為1.95，較113年之1.94上升，於參考值範圍。
指標6： 腹膜炎發生率(發生 腹膜炎次數/每100人 月)	負向	≤ 1.77 O	114年腹膜炎發生率統計值為1.69，較113年之1.58上升，於參考值範圍。
指標7： 脫離率(百分比) 脫離率(I) -腎功能回復 脫離率(II) -腎移植	參考指標	不另訂定	114年脫離率(I)腎功能回復為0.94%，較113年之0.79%上升。114年脫離率(II)腎移植為1.01%，較113年之1.5%下降。
指標8： B型肝炎表面抗原 (HBsAg)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.27\%$ O	114年腹膜透析B型肝炎表面抗原轉陽率為0.21%，較113年之0.17%上升，於參考值範圍。
指標9： C型肝炎抗體(anti- HCV)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.11\%$ >	114年腹膜透析C型肝炎抗體轉陽率為0.14%，較113年之0.14%持平，高於參考值。
指標10： 55歲以下腹膜透析病人 移植登錄率	正向	$\geq 57.54\%$ O	114年55歲以下腹膜透析病人移植登錄率為65.85%，較113年之65.92%下降，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)	監測結果之趨勢
指標11： 鈣磷乘積 -受檢率 -鈣磷乘積 $<60\text{mg}^2/\text{dL}^2$	規定合理範圍	88.33%~100.00% ○	114年腹膜透析鈣磷乘積受檢率為98.66%，較113年之98.38%上升，符合規定合理範圍。
	正向	$\geq 86.50\%$ ○	114年腹膜透析鈣磷乘積合格率为95.73%，較113年之96.31%下降，於參考值範圍。
指標12： B型肝炎表面抗原 (HBsAg)受檢率	規定合理範圍	87.01%~100.00% ○	114年腹膜透析B型肝炎表面抗原受檢率為97.48%，較113年之96.9%上升，符合規定合理範圍。
指標13： C型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率	規定合理範圍	87.03%~100.00% ○	114年腹膜透析C型肝炎抗體受檢率為97.34%，較113年之97%上升，符合規定合理範圍。
整體透析			
指標1： C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA-檢查率	正向	$\geq 78.95\%$ ○	114年C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率為85.87%，較113年之86.31%下降，於參考值範圍。
指標2： HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物-治療率	正向	$\geq 82.45\%$ ○	114年HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率為93.16%，較113年之92.54%上升，於參考值範圍。

【註】*「○」表該項整體性之醫療品質資訊項目於參考值範圍

「>」表該項整體性之醫療品質資訊項目高於參考值上限

附錄 表 2、114 年分區別指標監測結果彙整表

114年門診血液透析總額醫療品質資訊彙整表

指 標	指 標 項 目		臺 北	北 區	中 區	南 區	高 屏	東 區	全 署	指 標 方 向	參 考 值	臺 北	北 區	中 區	南 區	高 屏	東 區	全 署
	血液透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	97.92%	97.57%	97.57%	97.74%	98.08%	97.07%	97.98%	合理範圍	88.26%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	217	105	147	110	144	23	746									
		Albumin(BCG)平均值	3.93	3.91	3.89	3.92	3.91	3.90	3.92									
		Albumin(BCG)≥ 3.5百 分 比	95.25%	95.05%	94.28%	94.48%	94.53%	94.24%	94.78%	正 向	≥ 85.05%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	9	4	3	3	2	2	23									
		Albumin-平均值(BCP)	3.47	3.66	3.77	3.67	3.92	3.88	3.64									
2	URR(102年新增項目,取代原Kt/V)	Albumin(BCP)≥ 3.0百 分 比	96.58%	94.63%	98.31%	98.68%	100.00%	99.23%	97.09%	正 向	≥ 85.62%	○	○	○	○	○	○	○
		URR-受檢率	97.88%	97.46%	97.56%	97.72%	98.01%	97.07%	97.94%	合理範圍	88.22%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		URR-平均值	75.30	74.51	74.27	74.82	74.40	72.91	74.68									
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	URR≥ 65%百 分 比	98.90%	98.57%	98.83%	98.83%	98.83%	98.42%	98.83%	正 向	≥ 88.97%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-受檢率	97.89%	97.97%	97.67%	97.89%	98.15%	97.41%	98.09%	合理範圍	88.40%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.47	10.41	10.39	10.46	10.50	10.37	10.45									
4	住院率	Hb> 8.5百 分 比	98.58%	98.26%	98.46%	98.64%	98.75%	97.80%	98.55%	正 向	≥ 88.52%	○	○	○	○	○	○	○
		醫學中心	住院次數	1,469	291	551	220	587	156	3,274								
			住院率(住院次數/千人)	395.90	336.42	418.85	352.00	352.76	461.54	384.36	負 向	≤ 424.85	○	○	○	○	○	>
		區域醫院	住院次數	1,950	1,100	1,650	1,304	1,010	222	7,234								
住院率(住院次數/千人)	431.74		369.27	466.49	472.46	468.46	474.30	440.78	負 向	≤ 502.79	○	○	○	○	○	○	○	
5	地區醫院	住院次數	991	1,347	1,658	1,173	1,175	351	6,694									
		住院率(住院次數/千人)	436.54	398.34	443.61	509.78	474.16	555.38	452.36	負 向	≤ 493.54	○	○	○	>	○	>	○
		基層診所	住院次數	4,753	1,818	2,768	2,809	3,216	329	15,689								
			住院率(住院次數/千人)	356.35	348.44	402.22	383.43	386.33	457.52	375.29	負 向	≤ 421.85	○	○	○	○	○	>
6	死亡率 (人/百人)	透析時間<1年之死亡率	1.98	2.32	2.46	2.40	2.05	2.01	2.20	負 向	≤ 2.77	○	○	○	○	○	○	○
		透析時間≥1年之死亡率	2.88	3.03	2.86	2.84	2.84	2.91	2.89	負 向	≤ 3.22	○	○	○	○	○	○	○
7	瘻管重建率	瘻管重建次數	193	108	334	118	55	18	824									
		瘻管重建率(人次/千人月)	1.64	1.76	4.36	1.87	0.77	1.69	2.06	負 向	≤ 2.63	○	○	>	○	○	○	○
8	脫離率	腎功能恢復人數	44	31	33	30	19	10	167									
		脫離率(I)-腎功能回復	1.57%	2.10%	1.79%	2.02%	1.21%	3.60%	1.77%	參考指標	不另訂定							
		腎移植人數	76	24	34	15	33	2	184									
		脫離率(II)-腎移植	0.33%	0.20%	0.23%	0.12%	0.24%	0.10%	0.24%	參考指標	不另訂定							
9	B型肝炎表面抗原轉陽率	轉陽人數	25	22	26	17	20	5	115									
		陰性人數	18,463	9,658	12,050	10,218	11,363	1,692	62,917									
		轉陽率	0.14%	0.23%	0.22%	0.17%	0.18%	0.30%	0.18%	負 向	≤ 0.20%	○	>	>	○	○	>	○
10	C型肝炎抗體轉陽率	轉陽人數	24	20	20	27	45	9	145									
		陰性人數	19,430	9,926	12,223	10,074	11,545	1,626	64,279									
		轉陽率	0.12%	0.20%	0.16%	0.27%	0.39%	0.55%	0.23%	負 向	≤ 0.26%	○	○	○	>	>	>	○
11	五十五歲以下透析病人移植登錄率	登錄人數	1,406	764	1,031	579	755	143	4,669									
		病患人數	4,265	2,718	2,929	2,177	2,673	485	15,018									
		登錄率(百分比)	32.97%	28.11%	35.20%	26.60%	28.25%	29.48%	31.09%	正 向	≥ 27.41%	○	○	○	<	○	○	○
12	鈣磷乘積指標	鈣磷乘積-受檢率	97.92%	97.55%	97.57%	97.70%	98.06%	97.07%	97.97%	合理範圍	88.26%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	97.29%	97.30%	97.46%	98.13%	97.46%	96.67%	97.53%	正 向	≥ 87.65%	○	○	○	○	○	○	○
13	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率	申報HBsAg檢驗值之人數	18,038	9,461	11,774	9,981	11,104	1,642	61,759									
		B肝-前一年之陰性人數	18,463	9,658	12,050	10,218	11,363	1,692	62,917									
		B肝-受檢率	97.70%	97.96%	97.71%	97.68%	97.72%	97.04%	98.16%	合理範圍	88.28%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
14	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率	申報Anti-HCV檢驗值之人數	19,053	9,744	11,953	9,947	11,293	1,582	63,322									
		C肝-前一年之陰性人數	19,430	9,926	12,223	10,074	11,545	1,626	64,279									
		C肝-受檢率	98.06%	98.17%	97.79%	98.74%	97.82%	97.29%	98.51%	合理範圍	88.55%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○

114年門診腹膜透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.73%	99.46%	97.52%	98.93%	99.16%	97.69%	98.65%	合理範圍	88.33%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	27	23	29	17	18	4	118										
		Albumin(BCG)平均值	3.79	3.77	3.70	3.78	3.79	3.69	3.77										
		Albumin(BCG)≥ 3.5百分比	91.24%	90.52%	86.58%	91.02%	91.20%	88.17%	90.11%	正向	≥80.68%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	4	1	1	0	0	0	6										
		Albumin-平均值(BCP)	3.36	2.84	3.01				3.31										
		Albumin(BCP)≥ 3.0百分比	85.71%	50.00%	100.00%				82.56%	正向	≥82.37%	○	<	○				○	
2	Weekly Kt/V	Weekly Kt/V-受檢率	97.67%	98.48%	96.51%	98.24%	98.70%	97.69%	97.79%	合理範圍	87.24%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	1.98	2.11	1.97	2.03	2.05	1.99	2.01										
		Weekly Kt/V≥ 1.7百分比	93.22%	92.60%	89.30%	95.03%	92.47%	92.90%	92.54%	正向	≥83.56%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	98.83%	99.45%	96.86%	98.75%	99.02%	97.41%	98.52%	合理範圍	88.27%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.31	10.28	10.20	10.22	10.29	10.75	10.28										
		Hb> 8.5百分比	97.49%	95.41%	96.00%	97.29%	97.53%	98.23%	96.94%	正向	≥87.49%	○	○	○	○	○	○	○	
4	住院率	醫學中心	住院次數	706	147	349	136	235	39	1,611									
			住院率(住院次數/千人)	441.49	347.52	409.04	298.79	327.30	352.94	387.61	負向	≤415.90	>	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	住院次數	336	110	283	269	121	35	1,153									
			住院率(住院次數/千人)	448.60	377.36	567.84	503.75	465.38	630.63	483.13	負向	≤504.78	○	○	>	○	○	>	○
		地區醫院	住院次數	15	60	32	12	42		160									
			住院率(住院次數/千人)	725.00	428.57	387.88	766.67	572.41		484.85	負向	≤582.39	>	○	○	>	○		○
		基層診所	住院次數		11	3		3		25									
			住院率(住院次數/千人)		420.00	116.28		3000.00		515.79	負向	≤994.91		○	○		>		○
5	死亡率 (人/百人)	透析時間<1年之死亡率	1.73	0.85	0.94	0.40	1.33	0.84	1.21	負向	≤1.36	>	○	○	○	○	○	○	
		透析時間≥1年之死亡率	1.83	1.76	2.22	1.67	2.27	2.26	1.95	負向	≤2.12	○	○	>	○	>	>	○	
6	腹膜炎發生率	腹膜炎發生次數	443	173	294	147	213	25	1291										
		腹膜炎發生率(人次/百人月)	1.70	1.76	1.83	1.33	1.82	1.37	1.69	負向	≤1.77	○	○	>	○	>	○	○	
7	脫離率	腎功能恢復人數	4	1	1	1	3	0	10										
		脫離率(I)-腎功能回復	1.05%	0.69%	0.44%	0.78%	1.97%	0.00%	0.94%	參考指標	不另訂定								
		腎移植人數	24	10	10	5	13	1	63										
		脫離率(II)-腎移植	1.09%	1.24%	0.78%	0.56%	1.43%	0.65%	1.01%	參考指標	不另訂定								
8	B型肝炎表面抗原轉陽率	轉陽人數	5	0	3	0	2	1	11										
		陰性人數	1,813	660	1,046	765	771	126	5,164										
		轉陽率	0.28%	0.00%	0.29%	0.00%	0.26%	0.79%	0.21%	負向	≤0.27%	>	○	>	○	○	>	○	
9	C型肝炎抗體轉陽率	轉陽人數	0	0	4	1	3	0	8										
		陰性人數	1,916	719	1,135	800	845	132	5,531										
		轉陽率	0.00%	0.00%	0.35%	0.13%	0.36%	0.00%	0.14%	負向	≤0.11%	○	○	>	>	>	○	>	
10	五十五歲以下透析病人移植 登錄率	登錄人數	650	296	473	307	250	43	2,017										
		病患人數	995	462	636	441	456	82	3,063										
		登錄率(百分比)	65.33%	64.07%	74.37%	69.61%	54.82%	52.44%	65.85%	正向	≥57.54%	○	○	○	○	<	<	○	
11	鈣磷乘積指標	鈣磷乘積-受檢率	98.77%	99.46%	97.52%	98.93%	99.16%	97.69%	98.66%	合理範圍	88.33%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		鈣磷乘積< 60 mg2/dL2	95.86%	95.08%	94.91%	95.66%	96.72%	97.63%	95.73%	正向	≥86.50%	○	○	○	○	○	○	○	
12	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受 檢率	申報HBsAg檢驗值之人數	1,787	634	1,020	749	731	121	5,034										
		B肝-前一年之陰性人數	1,813	660	1,046	765	771	126	5,164										
		B肝-受檢率	98.57%	96.06%	97.51%	97.91%	94.81%	96.03%	97.48%	合理範圍	87.01%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
13	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢 率	申報Anti-HCV檢驗值之人數	1,888	690	1,103	783	800	126	5,384										
		C肝-前一年之陰性人數	1,916	719	1,135	800	845	132	5,531										
		C肝-受檢率	98.54%	95.97%	97.18%	97.88%	94.67%	95.45%	97.34%	合理範圍	87.03%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	

114年門診血液透析總額醫療品質資訊彙整表

指 標	指 標 項 目		臺 北	北 區	中 區	南 區	高 屏	東 區	全 署	指 標 方 向	參 考 值	臺 北	北 區	中 區	南 區	高 屏	東 區	全 署
	整 體 透 析 (血 液 與 腹 膜 合 併 計 算)																	
1	HCV RNA檢 查 率 (110年新增)	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA-檢 查 率(年)	88.13%	90.11%	82.57%	83.01%	86.35%	92.07%	85.87%	正 向	≥78.95%	○	○	○	○	○	○	○
2	抗 病 毒 藥 物 治 療 率 (110年新增)	HCV RNA陽性慢性透析病人抗 病 毒 藥 物 -治 療 率(年)	90.87%	90.28%	95.77%	94.02%	93.80%	91.72%	93.16%	正 向	≥82.45%	○	○	○	○	○	○	○

備註：

- 一、依據「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。
- 二、門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：依全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案所訂參考值。
- 三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。
- 四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。