

「藥品給付規定」修訂對照表

第 5 節 激素及影響內分泌機轉藥物

Hormones & drugs affecting hormonal mechanism

(自 115 年 8 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
5.6.1. 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) (101/3/1、101/5/1、102/2/1、102/8/1、103/2/1、103/10/1、104/8/1、106/12/1、114/3/1、115/7/1、<u>115/8/1</u>) 1. 藥品種類(略) 2. 使用規定 (1)使用條件 I. 限用於停經後婦女(alendronate、zoledronate、denosumab 及 risedronate 35mg 亦可使用於男性，risedronate 150mg 不可使用於男性)因骨質疏鬆症(須經 DXA 檢測 BMD 之 T score $\leq$ -2.5SD)引起脊椎或髖部骨折，或因骨質疏少症(osteopenia)(經 DXA 檢測 BMD 之 -2.5SD < T score < -1.0SD)引起脊椎或髖部 2 處或 2 次(含)以上之骨折。<u>denosumab 及 alendronate (除 COVAXIN、Mosmass、Apo-Alendronate、Fosamax、Binosto 及 Alendro-Dthen 外)</u>除使用於上述條件外，亦可用於前述因骨質疏鬆症引起之遠端橈骨或近端肱骨骨折，或骨質疏少症引起之遠端橈骨、近端肱骨 2 處或 2 次(含)以上之骨折。	5.6.1. 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) (101/3/1、101/5/1、102/2/1、102/8/1、103/2/1、103/10/1、104/8/1、106/12/1、114/3/1、115/7/1) 1. 藥品種類(略) 2. 使用規定 (1)使用條件 I. 限用於停經後婦女(alendronate、zoledronate、denosumab 及 risedronate 35mg 亦可使用於男性，risedronate 150mg 不可使用於男性)因骨質疏鬆症(須經 DXA 檢測 BMD 之 T score $\leq$ -2.5SD)引起脊椎或髖部骨折，或因骨質疏少症(osteopenia)(經 DXA 檢測 BMD 之 -2.5SD < T score < -1.0SD)引起脊椎或髖部 2 處或 2 次(含)以上之骨折。<u>使用 Prolia、Alendronate Sandoz 70mg Tablets 及 PlusDmax Tablets "Sinphar"</u>除上述條件外，亦可用於前述因骨質疏鬆症引起之遠端橈骨或近端肱骨骨折，或骨質疏少症引起之遠端橈骨、近端肱骨 2 處或 2 次(含)以上之骨折。(101/5/1、102/8/1、103/10/1、

修訂後給付規定	原給付規定
(101/5/1、102/8/1、103/10/1、104/8/1、106/12/1、114/3/1、115/7/1、<u>115/8/1</u>) II. 用於骨質疏鬆症患者（須經 DXA 檢測 BMD 之 T-score$\leq$-2.5），且合併下列至少一項骨質疏鬆性骨折高風險因子者，限使用 <u>denosumab 及 alendronate</u>(除 <u>COVAXIN</u>、<u>Mosmass</u>、<u>Apo-Alendronate</u>、<u>Fosamax</u>、<u>Binosto</u> 及 <u>Alendro-Dthen</u> 外)，且須於病歷上載明：<u>(114/3/1、115/7/1、115/8/1)</u> i 類風溼性關節炎。 ii 糖尿病且使用胰島素。 iii 使用糖皮質類固醇(>5 毫克/天)超過 3 個月。 (2)治療時，一次限用一項藥物，不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。 (3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。	104/8/1、106/12/1、114/3/1、115/7/1) II. 用於骨質疏鬆症患者（須經 DXA 檢測 BMD 之 T-score$\leq$-2.5），且合併下列至少一項骨質疏鬆性骨折高風險因子者，限使用 <u>Prolia</u>、<u>Alendronate Sandoz 70mg Tablets</u> 及 <u>PlusDmax Tablets "Sinphar"</u>，且須於病歷上載明：<u>(114/3/1、115/7/1)</u> i 類風溼性關節炎。 ii 糖尿病且使用胰島素。 iii 使用糖皮質類固醇(>5 毫克/天)超過 3 個月。 (2)治療時，一次限用一項藥物，不得併用其他骨質疏鬆症治療藥物。 (3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。

備註:劃線部分為新修訂規定