「藥品給付規定」修訂對照表

第 9 節 抗癌瘤藥物 Antineoplastics drugs

（自 115 年 12 月 1 日生效）

修訂後給付規定	原給付規定
9.43.Lenalidomide(如 Revlimid)：（101/12/1、106/10/1、109/2/1、109/8/1、112/4/1、114/10/1、115/3/1、115/4/1、115/5/1、115/9/1、115/12/1） 1.多發性骨髓瘤： (1)(略) (2)與 dexamethasone 合併使用於先前已接受至少一種治療失敗之多發性骨髓瘤患者，且需同時符合下列Ⅰ與Ⅱ的條件：（101/12/1、112/4/1、115/12/1） Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標（但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)：(112/4/1、115/12/1） ⅰ.若前一線治療中 M component 最低值≧5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值＜5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧0.5g/dL。 ⅱ.Urine M-protein 需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加	9.43.Lenalidomide(如 Revlimid)：（101/12/1、106/10/1、109/2/1、109/8/1、112/4/1、114/10/1、115/3/1、115/4/1、115/5/1、115/9/1） 1.多發性骨髓瘤： (1)(略) (2)與 dexamethasone 合併使用於先前已接受至少一種治療失敗之多發性骨髓瘤患者，且需同時符合下列Ⅰ與Ⅱ的條件：（101/12/1、112/4/1） Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標（但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)：(112/4/1） ⅰ.若前一線治療中 M component 最低值≧5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值＜5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧0.5g/dL。 ⅱ.Urine M-protein 需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前

≧25%。 iii.對於無法測得血清與尿液M蛋白的病人，需要比較「受影響」、「未受影響」serum free light chain (FLC:κ或λ)濃度之間的差值(dFLC)，此差值需增加>10 mg/dL，且需較前一線治療中的最低差值(dFLC)增加≧25%。(可以測得M蛋白者以M蛋白變化為準)。(115/12/1) iv.在non-secretary myeloma病人，骨髓漿細胞(plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 v.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma，且須經病理切片證實。 vi.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vii.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.出現下列任一臨床症狀： (略) (3)~(5)(略) 2.~3.(略)	一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.在non-secretary myeloma病人，骨髓漿細胞(plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iv.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 v.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vi.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.出現下列任一臨床症狀： (略) (3)~(5)(略) 2.~3.(略)
9.62. Pomalidomide(如Pomalyst):(107/1/1、109/2/1、112/4/1、113/9/1、115/12/1) 1.~2.(略) 3.需經事前審查核准後使用：	9.62. Pomalidomide(如Pomalyst):(107/1/1、109/2/1、112/4/1、113/9/1) 1.~2.(略) 3.需經事前審查核准後使用：

(107/1/1、112/4/1、115/12/1) (1)初次申請以3個療程為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件：(112/4/1、115/12/1) Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病人開始治療前須在連續2次評估中均符合同一指標（但若為plamacytoma 體積增加，或是新產生的bone lesion(s)或新plasmacytoma，則僅需1次評估)：(112/4/1) i.若前一線治療中M component 最低值≧5 g/dL，血清M蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中M component最低值＜5 g/dL，血清M蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.對於無法測得血清與尿液M蛋白的病人，需要比較「受影響」、「未受影響」serum free light chain (FLC:κ或λ)濃度之間的差值(dFLC)，此差值需增加>10 mg/dL，且需較前一線治療中的最低差值(dFLC)增加≧25%。(可以測得M蛋白者以M蛋白變化為準)。(115/12/1) iv.在non-secretary myeloma 病人，骨髓漿細	(107/1/1、112/4/1) (1)初次申請以3個療程為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件：(112/4/1) Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病人開始治療前須在連續2次評估中均符合同一指標（但若為plamacytoma 體積增加，或是新產生的bone lesion(s)或新plasmacytoma，則僅需1次評估)：(112/4/1) i.若前一線治療中M component 最低值≧5 g/dL，血清M蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中M component最低值＜5 g/dL，血清M蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.在non-secretary myeloma 病人，骨髓漿細

胞 (plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 v.新產生的 bone lesion(s)或 plasmacytoma；且須經病理切片證實。 vi.Plasmacytoma 體積增加≧50%。 vii.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.(略) (2)(略) 4.~7.(略)	胞 (plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iv.新產生的 bone lesion(s)或 plasmacytoma；且須經病理切片證實。 v.Plasmacytoma 體積增加≧50%。 vi.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.(略) (2)(略) 4.~7.(略)
9.75. Carfilzomib (如 Kyprolis)：(109/2/1、112/4/1、113/4/1、115/12/1) 1.~2.(略) 3. 需經事前審查核准後使用：(109/2/1、112/4/1、115/12/1) (1)初次申請以 4 個療程(每療程為 4 週)為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件：(109/2/1、112/4/1、115/12/1) Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標 (但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)：(112/4/1、115/12/1) i.若前一線治療中 M component 最低值≧5	9.75. Carfilzomib (如 Kyprolis)：(109/2/1、112/4/1、113/4/1) 1.~2.(略) 3. 需經事前審查核准後使用：(109/2/1、112/4/1) (1)初次申請以 4 個療程(每療程為 4 週)為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件：(109/2/1、112/4/1) Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標 (但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)：(112/4/1) i.若前一線治療中 M component 最低值≧5

g/dL，血清M蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中M component最低值＜5 g/dL，血清M蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.對於無法測得血清與尿液M蛋白的病人，需要比較「受影響」、「未受影響」serum free light chain (FLC:κ或λ)濃度之間的差值(dFLC)，此差值需增加>10 mg/dL，且需較前一線治療中的最低差值(dFLC)增加≧25%。(可以測得M蛋白者以M蛋白變化為準)。(115/12/1) iv.在non-secretary myeloma病患，骨髓漿細胞(plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 v.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 vi.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vii.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.(略) (2)~(3)(略)	g/dL，血清M蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中M component最低值＜5 g/dL，血清M蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.在non-secretary myeloma病患，骨髓漿細胞(plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iv.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 v.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vi.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.(略) (2)~(3)(略)

4.~5.(略)	4.~5.(略)
9.77. Ixazomib (如 Ninlaro)： (109/3/1、112/4/1、115/12/1) 1.~2.(略) 3.需經事前審查核准後使用： (109/3/1、112/4/1、115/12/1) (1)初次申請以 4 個療程為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件：(109/3/1、112/4/1、115/12/1) Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標 (但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)：(112/4/1、115/12/1) i.若前一線治療中 M component 最低值≧5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值＜5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein 需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.對於無法測得血清與尿液 M 蛋白的病人，需要比較「受影響」、「未受影響」serum free light chain (FLC:κ或λ)濃度之間的差值(dFLC)，此差	9.77. Ixazomib (如 Ninlaro)： (109/3/1、112/4/1) 1.~2.(略) 3.需經事前審查核准後使用： (109/3/1、112/4/1) (1)初次申請以 4 個療程為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件：(109/3/1、112/4/1) Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標 (但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)：(112/4/1) i.若前一線治療中 M component 最低值≧5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值＜5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein 需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。

值需增加>10 mg/dL，且需較前一線治療中的最低差值(dFLC)增加≧25%。(可以測得M蛋白者以M蛋白變化為準)。(115/12/1) iv.在non-secretary myeloma 病患，骨髓漿細胞 (plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 v.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 vi.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vii.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.(略) (2)~(3)(略) 4.~5.(略)	iii.在non-secretary myeloma 病患，骨髓漿細胞 (plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iv.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 v. Plasmacytoma體積增加≧50%。 vi.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.(略) (2)~(3)(略) 4.~5.(略)
9.108. Isatuximab(如Sarclisa)：(113/4/1、114/9/1、115/12/1) 1.(略) 2.須經事前審查核准後使用：(113/4/1、114/9/1、115/12/1) (1)首次申請為10次輸注，且需同時符合下列Ⅰ.、Ⅱ.與Ⅲ.的條件： Ⅰ.(略) Ⅱ.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續2次評估中均符合同一指標（但若為plamacytoma 體積增加，或是新產生的bone	9.108. Isatuximab(如Sarclisa)：(113/4/1、114/9/1) 1.(略) 2.須經事前審查核准後使用：(113/4/1、114/9/1) (1)首次申請為10次輸注，且需同時符合下列Ⅰ.、Ⅱ.與Ⅲ.的條件： Ⅰ.(略) Ⅱ.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續2次評估中均符合同一指標（但若為plamacytoma 體積增加，或是新產生的bone

lesion(s)或新plasmacytoma，則僅需1次評估)： i.若前一線治療中M component 最低值≧5 g/dL，血清M蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中M component最低值＜5 g/dL，血清M蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.對於無法測得血清與尿液M蛋白的病人，需要比較「受影響」、「未受影響」serum free light chain (FLC:κ或λ)濃度之間的差值(dFLC)，此差值需增加>10 mg/dL，且需較前一線治療中的最低差值(dFLC)增加≧25%。(可以測得M蛋白者以M蛋白變化為準)。(115/12/1) iv.在non-secretary myeloma 病患，骨髓漿細胞 (plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 v.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 vi.Plasmacytoma體積增加≧50%。	lesion(s)或新plasmacytoma，則僅需1次評估)： i.若前一線治療中M component 最低值≧5 g/dL，血清M蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中M component最低值＜5 g/dL，血清M蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.在non-secretary myeloma 病患，骨髓漿細胞 (plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iv.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 v.Plasmacytoma體積增加≧50%。

vii.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅲ.(略) (2)(略) 3.~5.(略)	vi.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅲ.(略) (2)(略) 3.~5.(略)
9.111.Elotuzumab(如 Empliciti)： (113/9/1、115/12/1) 1.與 pomalidomide 及 dexamethasone 併用，治療之前曾接受過至少兩種療法（包括 lenalidomide 和蛋白酶體抑制劑）的多發性骨髓瘤成年病人，且完全符合下列條件： (1)~(2)(略) 2.需經事前審查核准後使用（113/9/1、115/12/1）： (1)初次申請以 3 個療程為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件： Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病人開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標(但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)： ⅰ.若前一線治療中 M component 最低值≧5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值＜5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧0.5g/dL。 ⅱ.Urine M-protein 需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 ⅲ.對於無法測得血清與尿液 M 蛋白的病人，需要比較「受影	9.111.Elotuzumab(如 Empliciti)： (113/9/1) 1.與 pomalidomide 及 dexamethasone 併用，治療之前曾接受過至少兩種療法（包括 lenalidomide 和蛋白酶體抑制劑）的多發性骨髓瘤成年病人，且完全符合下列條件： (1)~(2)(略) 2.需經事前審查核准後使用： (1)初次申請以 3 個療程為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件： Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病人開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標(但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)： ⅰ.若前一線治療中 M component 最低值≧5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值＜5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧0.5g/dL。 ⅱ.Urine M-protein 需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。

響」、「未受影響」serum free light chain (FLC:κ 或 λ)濃度之間的差值(dFLC)，此差值需增加>10 mg/dL，且需較前一線治療中的最低差值(dFLC)增加≧25%。(可以測得M蛋白者以M蛋白變化為準)。(115/12/1) iv.在non-secretary myeloma病人，骨髓漿細胞 (plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 v.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 vi.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vii.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.出現下列任一臨床症狀：(略) (2)~(3)(略) 3.略	iii.在non-secretary myeloma病人，骨髓漿細胞 (plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iv.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 v.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vi.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 Ⅱ.出現下列任一臨床症狀：(略) (2)~(3)(略) 3.略
9.117.Selinexor(如Xpovio)： (114/3/1、115/12/1) 1.(略) 2.須經事前審查核准後使用： (114/3/1、115/12/1) (1)初次申請以4個療程(每療程為5週)為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件： I.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續2次評估中均符合同一指標(但若為plamacytoma體積增加，或是新產生的bone lesion(s)或新	9.117.Selinexor(如Xpovio)： (114/3/1) 1.(略) 2.須經事前審查核准後使用： (1)初次申請以4個療程(每療程為5週)為限，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件： I.具有下列任一疾病惡化的指標：病患開始治療前須在連續2次評估中均符合同一指標(但若為plamacytoma體積增加，或是新產生的bone lesion(s)或新

plasmacytoma，則僅需1次評估)： i.若前一線治療中M component最低值≧5g/dL，血清M蛋白需增加≧1g/dL；若前一線治療中M component最低值＜5g/dL，血清M蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein需增加≧0.2gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.對於無法測得血清與尿液M蛋白的病人，需要比較「受影響」、「未受影響」serum free light chain (FLC:κ或λ)濃度之間的差值(dFLC)，此差值需增加>10 mg/dL，且需較前一線治療中的最低差值(dFLC)增加≧25%。(可以測得M蛋白者以M蛋白變化為準)。(115/12/1) iv.在non-secretary myeloma病患，骨髓漿細胞(plasmacells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 v.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 vi.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vii.周邊血液中漿細胞比例≧	plasmacytoma，則僅需1次評估)： i.若前一線治療中M component最低值≧5g/dL，血清M蛋白需增加≧1g/dL；若前一線治療中M component最低值＜5g/dL，血清M蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein需增加≧0.2gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iii.在non-secretary myeloma病患，骨髓漿細胞(plasmacells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iv.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma；且須經病理切片證實。 v.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vi.周邊血液中漿細胞比例≧

20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 II.(略) (2)~(3)(略)	20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 II.(略) (2)~(3)(略)
9.118.Elranatamab (如 Elrexfio)： (114/5/1、114/8/1<u>、115/12/1</u>) 1.(略) 2.須經事前審查核准後使用： (114/5/1<u>、115/12/1</u>) (1)首次申請為 13 次輸注，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件： Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病人開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標（但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)： i.若前一線治療中 M component 最低值≧5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值＜5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein 需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 <u>iii.對於無法測得血清與尿液 M 蛋白的病人，需要比較「受影響」、「未受影響」serum free light chain (FLC:κ或λ)濃度之間的差值(dFLC)，此差值需增</u>	9.118.Elranatamab (如 Elrexfio)： (114/5/1、114/8/1) 1.(略) 2.須經事前審查核准後使用： (1)首次申請為 13 次輸注，且需同時符合下列Ⅰ.與Ⅱ.的條件： Ⅰ.具有下列任一疾病惡化的指標：病人開始治療前須在連續 2 次評估中均符合同一指標（但若為 plamacytoma 體積增加，或是新產生的 bone lesion(s)或新 plasmacytoma，則僅需 1 次評估)： i.若前一線治療中 M component 最低值≧5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧1 g/dL；若前一線治療中 M component 最低值＜5 g/dL，血清 M 蛋白需增加≧0.5g/dL。 ii.Urine M-protein 需增加≧0.2 gm/24Hr，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。

加>10 mg/dL，且需較前一線治療中的最低差值(dFLC)增加≧25%。(可以測得M蛋白者以M蛋白變化為準)。(115/12/1) iv.在non-secretary myeloma病人，骨髓漿細胞(plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 v.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma，且須經病理切片證實。 vi.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vii.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 II.(略) (2)(略) 3.~5.(略)	iii.在non-secretary myeloma病人，骨髓漿細胞(plasma cells)之比例絕對值增加≧10%，且需較前一線治療中的最低值增加≧25%。 iv.新產生的bone lesion(s)或plasmacytoma，且須經病理切片證實。 v.Plasmacytoma體積增加≧50%。 vi.周邊血液中漿細胞比例≧20%或漿細胞絕對值≧2000 cells/μL。 II.(略) (2)(略) 3.~5.(略)

備註：劃線部份為新修訂規定