

第 15 節 婦科製劑 Gynecological preparations

15.1. Prostaglandin E 栓劑 (如 Prostin E VT) :

限產科引產時使用。

15.2. Atosiban(如 Betosiban、Tractocile)(111/9/1)

1. 限用於延遲妊娠婦女迫切的早產，並符合下列所有條件者：

- (1) 18 歲以上之婦女且妊娠週數在 24 週至 33 週。
- (2) 規律宮縮至少持續 30 秒，頻率大於等於每 30 分鐘 4 次。
- (3) 子宮頸擴張 1 至 3 公分 (初產婦 0 至 3 公分) 和子宮頸展平(cervical effacement) $\geq 50\%$ 。
- (4) 胎兒心律正常。

(5) 經使用 ritodrine 療效不彰及無法耐受其副作用、或是屬易出現嚴重副作用的高危險群孕婦，無安胎禁忌症者。「易出現嚴重副作用的高危險群孕婦」，指符合下列任 1 項高風險條件者：

- I. 多胞胎妊娠。
- II. 心血管疾病(如心臟衰竭、缺血性心臟病、心律不整、心搏過速)。
- III. 高血壓疾患(如慢性高血壓、妊娠高血壓、子癲前症)。
- IV. 糖尿病與需藥物治療的妊娠糖尿病。
- V. 甲狀腺功能異常。
- VI. 肺部功能異常、或氣喘。
- VII. 腎功能異常($eGFR < 60 \text{ mL/min/1.73m}^2$)。
- VIII. 自體免疫疾病。
- IX. 孕前肥胖($BMI \geq 30$)。
- X. 電解質失調(包含低血鉀：血漿鉀離子濃度低於 $< 3.5 \text{ mEq/L}$ 、低血鎂：血漿鎂離子濃度低於 $< 1.7 \text{ mEq/L}$)。

2. 療程劑量：

- (1) 一次療程時間以 48 小時為上限，總劑量上限為 330mg。
- (2) 每次懷孕以一次療程為限。