

106 年
醫院總額整體性醫療品質資訊公開報告
專業版



衛生福利部
中央健康保險署
107 年 07 月

目錄

壹、前言	3
貳、醫院總額整體性醫療品質資訊公開指標項目及定義	4
參、指標值監測結果	28
指標 1. 門診注射劑使用率	28
指標 2. 門診抗生素使用率	30
指標 3-1. 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）	32
指標 3-2. 同醫院同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）	34
指標 3-3. 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖	36
指標 3-4. 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症	38
指標 3-5. 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症	40
指標 3-6. 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜	42
指標 3-7. 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）	44
指標 3-8. 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）	46
指標 3-9. 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖	48
指標 3-10. 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症	50
指標 3-11. 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症	52
指標 3-12. 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜	54
指標 4. 慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	56
指標 5. 每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率	58
指標 6. 十八歲以下氣喘病人急診率	60
指標 7. 糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率	62
指標 8. 就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率	64
指標 9. 門診上呼吸道感染病人就診後未滿七日因同疾病再次就診率	66
指標 10. 急性病床住院案件住院日數超過三十日比率	68
指標 11. 非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率	70
指標 12. 住院案件出院後三日以內急診率	72
指標 13-1. 剖腹產率-整體	74

指標 13-2. 剖腹產率-自行要求	76
指標 13-3. 剖腹產率-具適應症	78
指標 13-4. 剖腹產率-初次具適應症	80
指標 14. 清淨手術術後使用抗生素超過三日比率	82
指標 15. 接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用 ESWL 之次數	84
指標 16. 子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率	86
指標 17. 人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率	88
指標 18. 手術傷口感染率	90
指標 19. 急性心肌梗塞死亡率	92
肆、結論	964
附 錄	96
表 1、醫院總額專業醫療服務品質指標彙整表	96
表 2、106 年全年指標值較前一年(105 年)升降比較表	98

壹、前言

● 緣起：

本報告係依 105 年 12 月 15 日衛部保字第 1051260719 號令訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目呈現，利用健保特約醫療機構申報之醫療費用申報資料，進行各指標之趨勢統計。本報告區分「民眾版」與「專業版」。「民眾版」係供一般民眾使用，介紹各指標名稱主要意涵、為什麼要建立這項指標及整體趨勢統計；「專業版」則提供醫療與健康服務領域人員使用，呈現各指標之操作型定義、整體與 6 個健保分區業務組¹及各醫院層級之監測統計。

● 意義：

本報告指標項目依其特性區分為正向指標、負向指標、及非絕對正向或負向指標。對正向指標之監測目的，在於期待指標數值呈上升或平穩但維持高於某一數值之趨勢，若呈現明顯下降趨勢，則需進一步瞭解原因；反之，對負向指標，則期待指標數值呈下降或平穩但維持低於某一數值之趨勢，若呈現明顯上升趨勢，則需進一步瞭解原因；對於非絕對正向或負向指標之監測目的，在於期待指標數值呈平穩趨勢，若呈現巨幅變動，則需進一步瞭解原因。

● 特別聲明：

指標計算係以健保醫療費用申報資料，考量健保申報資料欄位有限，無法反映完整醫療過程與結果，因此，指標數字的表現可能為多重原因造成，醫療適當性仍需就病人情形由醫療專業認定，不應直接認定反映品質，請使用者審慎解讀。

註 1；健保署 6 個分區業務組，係指中央健康保險署臺北、北區、中區、南區、高屏及東區等六個服務範圍。

貳、醫院總額整體性醫療品質資訊公開指標項目及定義

指標1：門診注射劑使用率(1150.01)

一、定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件。

(二) 公式說明：

分子：醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」案件數，但排除必要注射藥物案件。

分母：給藥案件數。

給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種。

針劑藥品：醫令代碼為10碼，且第8碼為2，但排除因病情需要，經醫師指導使用方法由病人持回注射之藥品(附表略)、門診化療注射劑、急診注射劑及流感疫苗。

門診化療注射劑：醫令代碼為37005B，37031B~37041B或癌症用藥(其藥品成分ATC碼前3碼L01)。

急診注射劑：案件分類代碼為02，醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」案件。

流感疫苗：案件分類代碼為D2。

外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑，TETANUS TOXOID ATC碼：J07AM01。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區值平均值 $\times (1+15\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 3.49\%$ 。

指標2：門診抗生素使用率(1140.01)

一、定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診給藥案件。

(二) 公式說明：

分子：門診給藥案件之開立抗生素藥品案件數。

分母：門診給藥總案件數。

抗生素藥品：ATC 碼前三碼為 J01 (ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE)。

二、 指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區值平均值 $\times (1+15\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 7.01\%$ 。

 **指標3:同(跨)醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)、降血脂 (口服)、降血糖、抗思覺失調症、抗憂鬱症、安眠鎮靜：**

用藥日數重疊率指標，自100年起定義調整「允許慢性病連續處方箋提早拿藥」，即同病人ID、同院所給藥日數 ≥ 21 天，且該筆給藥產生重疊的原因是與另一筆給藥日數 ≥ 21 天的用藥比對所產生，則在此原因下，該筆用藥允許7天的空間不計入重疊日數，另，民國 101 年 11 月 06 日「全民健康保險醫療辦法」修正第24條「保險對象持慢性病連續處方箋調劑者，須俟上次給藥期間屆滿前10日內，始得憑原處方箋再次調劑，配合前述辦法，修正慢箋不納入重複日數計算之案件，101年11月起由7天修訂為10天。

「給藥日數」擷取該藥品醫令 之「醫令檔給藥日份欄位」。

3-1 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服) (1710)

一、定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫醫院之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

(二) 公式說明：

分子：同院所同病人ID不同處方之血壓藥物(口服)開始用藥日期與結束

用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數總和。

降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02AC、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.15\%$ 。

3-2 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)(1711)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血脂藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同院所同病人ID不同處方之降血脂藥物(口服)開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數總和。

降血脂藥物(口服)：ATC前5碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.09\%$ 。

3-3 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血糖藥物給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同院所同病人ID不同處方之降血糖藥物(不分口服及注射)開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數總和。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前5碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.10\%$ 。

3-4 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症 (1726)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之抗思覺失調症藥物給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同院所同病人ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：抗思覺失調症藥物之給藥日數總和。

抗思覺失調症藥物：ATC前5碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.26\%$ 。

3-5 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症 (1727)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之抗憂鬱症藥物給藥案件（藥費不為0，或給

藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同院所同病人ID不同處方憂鬱症藥物之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：抗憂鬱症藥物之給藥日數總和。

抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.17\%$ 。

3-6 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜 (1728)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之安眠鎮靜藥物給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同院所同病人ID不同處方之開始用藥日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數總和。

安眠鎮靜藥物：(不含抗焦慮藥物)：前5碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.25\%$ 。

3-7 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服) (1713)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或

給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同病人ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數總和。

降血壓藥物(口服)：ATC前3碼為C07(排除C07AA05)或ATC前5碼為C02AC、C02DB、C02DC、C02DD、C03AA、C03BA、C03CA、C03DA、C08CA(排除C08CA06)、C08DA、C08DB、C09AA、C09CA，且醫令代碼第8碼為1。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.56\%$ 。

3-8 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服) (1714)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血脂藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同病人ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數總和。

降血脂藥物(口服)：ATC前5碼=C10AA、C10AB、C10AC、C10AD、C10AX，且醫令代碼第8碼為1。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.32\%$ 。

3-9 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之降血糖藥物給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同病人ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數總和。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前5碼=A10AB、A10AC、A10AD、A10AE、A10BA、A10BB、A10BF、A10BG、A10BX、A10BH、A10BJ。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.35\%$ 。

3-10 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之抗思覺失調症藥物給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同病人ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：抗思覺失調症藥物之給藥日數總和。

抗思覺失調症藥物：ATC前5碼=N05AA、N05AB、N05AD、N05AE、N05AF、N05AH、N05AL、N05AN(排除N05AN01)、N05AX。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.76\%$ 。

3-11 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症 (1730)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之憂鬱症藥物給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同病人ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數。

分母：抗憂鬱症藥物之給藥日數總和。

抗憂鬱症藥物：ATC前5碼為N06AA(排除N06AA02、N06AA12)、N06AB、N06AG。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 0.63\%$ 。

3-12 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜 (1731)

一、定義：

(一)資料範圍：限定為西醫醫院之安眠鎮靜藥物給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

(二)公式說明：

分子：同病人ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數總和。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數。

安眠鎮靜藥物(不含抗焦慮藥物)：ATC前5碼為N05CC、N05CD、N05CF、N05CM，且醫令代碼第8碼為1。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 1.73\%$ 。

指標4：慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(1318)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件。

(二)公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋案件數。

分母：慢性病給藥案件數。

開立慢性病連續處方箋的案件：(診察費項目代碼為慢箋)或(案件分類=E1且慢性病連續處方箋有效期間處方日份 > 給藥天數且慢性病連續處方箋有效日份為給藥天數的倍數)。

診察費項目代碼為慢箋：00155A、00157A、00170A、00171A、00131B、00132B、00172B、00173B、00135B、00136B、00174B、00175B、00137B、00138B、00176B、00177B、00139C、00140C、00158C、00159C、00141C、00142C、00160C、00161C、00143C、00144C、00162C、00163C、00145C、00146C、00164C、00165C、00147C、00148C、00166C、00167C、00149C、00150C、00168C、00169C、00178B、00179B、00180B、00181B、00182C、00183C、00184C、00185C、00187C、00189C、00190C、00191C。

慢性病給藥案件：案件分類=04、E1。

排除條件：

- 1、婦產科專科醫院：醫院型態別為專科醫院(03)，且門診就醫科別婦產科(05)之申請點數占率為各就醫科別中最高者。
- 2、小兒專科醫院：醫院型態別為專科醫院(03)，且門診就醫科別小兒科(04)之申請點數占率為各就醫科別中最高者。
- 3、呼吸照護病房(有申報醫令P1011C或P1012C之案件)申請點數占全院申請點數80%(含)以上之醫院。

二、指標解讀：屬非絕對正向或負向指標，參考值以最近3年全區值平均值

x(1-15%)作為下限值，106年為 $\geq 37.91\%$ 。

指標5：每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率(1749)

一、定義：

(一) 資料範圍：醫院總額之門診給藥案件數。

(二) 公式說明：

分子：分母案件中藥品品項數 ≥ 10 項之案件數。

分母：給藥案件數（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

藥品品項：醫令類別1或4，且醫令代碼為10碼。

二、指標解讀：屬負向指標，為105年新增訂指標，參考值以最近3年全區平均值 $\times (1+10\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 1.08\%$ 。

指標6：十八歲以下氣喘病人急診率(1315、1317)

一、定義：

(一) 資料範圍：醫院總額。

(二) 公式說明：

分子：急診氣喘人數(跨院)：分母病人中因氣喘而急診就醫者，其急診就醫日期大於(跨院勾稽)視為氣喘病患之日期的人數。

分母：18歲以下氣喘病患人數(統計期間，符合下列A、B、C任一項條件者視為氣喘病患)：

1、統計期間有1次(含)以上因氣喘急診就醫。

2、統計期間有1次(含)以上因氣喘住院。

3、統計期間有因氣喘之門診就醫，且前一年全國跨院勾稽有4次(含)以上之因氣喘門診就醫，且其中有2次(含)以上有使用

任一項氣喘用藥者。

18歲以下： $(費用年 - 出生年) \leq 18$ 。

氣喘：主診斷ICD10-CM前3碼為J45。

前一年：依月往前一年(含當月，若為9801則觀察9702~9801這段期間)。

氣喘用藥：ATC藥品分類碼7為R03AC02、R03AC03、R03AC12、R03AC13、R03BA01、R03BA02、R03BA05、R03AK06、R03AK07、H02AB06、H02AB07、R03DC03、R03DC01、R03DA05、R03AC04、R03AC06、R03AC16、R03AC18、R03BA08。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 18.10\%$ 。

指標7：糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率(109.01、 110.01)

一、定義：

(一)資料範圍：醫院總額。

(二)公式說明：

分子：分母病人ID中，在統計期間於門診有執行糖化血紅素(HbA1c)檢驗人數。

分母：門診主次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥之病人數。

糖尿病：任一主、次診斷之ICD-10-CM前3碼為E08-E13之門診案件。

糖尿病用藥：指ATC前3碼為A10。

糖化血紅素(HbA1c)案件：係指申報醫令代碼前5碼為09006之案件。

計算符合分母條件之病人ID時，主、次診斷為糖尿病且使用糖尿病用藥這兩個條件限定要發生在同處方案件。

計算符合分子之病人ID時，從分母的病人ID繼續觀察，只要該病人ID於統計期間有執行糖化血紅素(HbA1c)檢驗即成立。

二、指標解讀：屬正向指標，參考值以最近3年全區值平均值 $\times(1-20\%)$ 作為下限

值，106年為 $\geq 73.08\%$ 。

指標8：就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率(1322)

一、定義：

(一)資料範圍：醫院總額(排除診察費為0之案件)。

(二)公式說明：

分子：同一費用年月、同一就醫日期、同一院所、同一疾病(主診斷前3碼相同)、同一人(身分證號)就診2次(含)以上，按身分證號歸戶之門診人數。

分母：同一費用年月、同一院所，按身分證號歸戶之門診人數。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區值平均值 $\times (1+20\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 1.12\%$ 。

指標9：門診上呼吸道感染病人就診後未滿七日因同疾病再次就診率(106.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診案件，程式會以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算。

(二)公式說明：

分子：按院所、病人ID、總額部門歸戶，計算因上呼吸道感染（以下簡稱URI）於同一院所同一總額部門別，二次就醫日期小於7日之人數。

分母：按院所、病人ID、總額部門歸戶，計算URI人數。

URI：主診斷ICD-10-CM前3碼為J00、J02、J06、J09-J11。

二、指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區值平均值 $\times (1+10\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 8.47\%$ 。

指標10：急性病床住院案件住院日數超過三十日比率(892.01)

一、 定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二) 公式說明：

分子：分母案件中住院超過30日的案件數。

分母：出院案件數(急性床案件，不含急慢性床混合案件)。

出院案件：出院日在資料範圍內之案件，按[院所，病人ID，生日，住院日]歸戶，因作帳之緣故，可能有多個出院日，以最晚之出院日為準。

住院超過30日的案件：以出院案件為範圍，按[院所，病人ID，生日，住院日]歸戶，找出住院日距離出院日超過30日的案件。

排除條件：

1.排除呼吸照護個案，主、次診斷ICD-10-CM碼J960、J969、J961、J962、P28.5或主、次處置ICD-10-PCS碼5A1935Z、5A1945Z、5A1955Z、5A09357、5A09457、5A09557。

2.排除精神病案件，精神科就醫科別代碼13。

3.排除乳癌試辦計劃案件：案件類別為「4：試辦計劃」及病患來源為”N”或”C”或”R“。

4.排除早產兒案件：主、次診斷ICD-10-CM前3碼為 P05、P07。

5.安寧照護(給付類別A)。

6. 提升急性後期照護品質試辦計劃案件(住院案件分類4 + 試辦計畫代碼1 腦中風、2燒燙傷)。

二、 指標解讀：屬負向指標，參考值以最近3年全區值平均值 $\times(1+20\%)$ 作為上限值，106年參考值為 $\leq 1.84\%$ 。

指標11：非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率(1077.01、 1809)

一、 定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二) 公式說明：

分子：病人14日內再住院人數。

分母：當季出院人數。

分母分子均排除下列計畫性再住院案件後進行統計：(1)精神科個案(就醫科別=13)。(2)乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)。(3) 癌症、性態未明腫瘤治療(主、次診斷ICD-10-CM 前3碼為C00-C96(排除C94.4、C94.6)、D37-D48，全碼Z51.0、Z51.11、Z51.12、Z08)。(4)早產安胎個案(TW-DRG 37901、37902、37903、38301、38302、384)。(5)罕見疾病—黏多醣症(主診斷ICD-10-CM E760-E763)。(6)轉院案件(轉歸代碼5、6或7)。(7)新生兒未領卡(部份負擔註記903)。(8)血友病(主診斷ICD-10-CM D66、D67、D681、D682)。(9)執行心導管後再執行心血管繞道手術或瓣膜置換術或支架置放術。(10)器官移植。(11)提升急性後期照護品質試辦計劃案件(住院案件分類4 + 試辦計畫代碼1 腦中風、2燒燙傷)。(12)安寧照護(給付類別A)。

心導管：醫令代碼前5碼為18020、18021、97501、97502、97503、97506、97507、97508。

心血管繞道手術：以冠狀動脈繞道手術為主，主、次處置代碼(手術代碼)為ICD-10-PCS 0210593、02100Z3、02100K3、02100J3、02105Z3、0210093、02105A3、02105J3、02105K3、02100A3、02105AW、021059W、02100KW、02100JW、02100AW、021009W、02105JW、02105KW、021109W、02110AW、02114KW、02114JW、02114AW、021149W、02110KW、02110JW、021209W、02124JW、02124AW、021249W、02120KW、02120JW、02120AW、02124KW、

02134JW、02134KW、021309W、02130AW、02130JW、
02130KW、021349W、02134AW、0210098、02105ZC、
021009C、02100A8、02100A9、02100AC、02100J8、
02100J9、02100JC、02100K8、02100K9、02100KC、
02100Z8、02100Z9、02100ZC、0210598、0210599、
021059C、02105A8、02105A9、02105AC、02105J8、
02105J9、02105JC、02105K8、02105K9、02105KC、
02105Z8、02105Z9、0210099、02120ZC、021249C、
02124AC、02124JC、02124KC、02124ZC、021309C、
02130AC、02130JC、02130KC、02130ZC、021349C、
02134AC、02134JC、02134KC、02134ZC、0211098、
0211099、021109C、02110A8、02110A9、02110AC、
02110J8、02110J9、02110JC、02110K8、02110K9、
02110KC、02110Z8、02110Z9、02110ZC、0211498、
0211499、021149C、02114A8、02114A9、02114AC、
02114J8、02114J9、02114JC、02114K8、02114K9、
02114KC、02114Z8、02114Z9、02114ZC、021209C、
02120AC、02120JC、02120KC、02100ZF、02100KF、
021059F、02105AF、02105JF、02105KF、02105ZF、
021009F、02100AF、02100JF且醫令代碼前5碼為68023或
68024或68025。

辨膜置換術：醫令代碼前5碼為68016、68017、68018且主診斷為
ICD-10-CM 前3碼 I00-I99且主處置代碼(手術代碼)為
ICD-10-PCS 02RF07Z、02RF37H、02RF37Z、02RF38H、
02RF38Z、02RF3KH、02RF3KZ、02RF4KZ、02RF48Z、02RF47Z、
02RF08Z、02RF0KZ、02RF4JZ、02RF0JZ、02RG47Z、02RG3KZ、
02RG48Z、02RG4KZ、02RG38Z、02RG07Z、02RG08Z、
02RG37Z、02RG0KZ、02RG3JZ、02RG0JZ、02RG4JZ、02RH07Z、
02RH08Z、02RH0KZ、02RH37H、02RH37Z、02RH38H、

02RH38Z、02RH3KH、02RH3KZ、02RH47Z、02RH48Z、
02RH4KZ、02RH0JZ、02RH4JZ、02RJ07Z、02RJ08Z、02RJ0KZ、
02RJ47Z、02RJ48Z、02RJ4KZ、02RJ0JZ、02RJ4JZ。

支架置放術：同時申報「經皮冠狀動脈擴張術（PTCA）」及放置血管支架之案件。

「經皮冠狀動脈擴張術（PTCA）」：

主、次處置代碼(手術代碼)為ICD-10-PCS 02703ZZ、02704ZZ、
3E07317、02713ZZ、02714ZZ、02723ZZ、02724ZZ、02733ZZ、
02734ZZ且醫令代碼前5碼為33076、33077、33078。

放置血管支架：主、次處置代碼(手術代碼)為ICD-10-PCS
027034Z、02703DZ、027044Z、02704DZ、027134Z、02713DZ、
027144Z、02714DZ、027234Z、02723DZ、027244Z、02724DZ、
027334Z、02733DZ、027344Z、02734DZ、0270346、02703D6、
0270446、02704D6、0271346、02713D6、0271446、02714D6、
0272346、02723D6、0272446、02724D6、0273346、02733D6、
0273446、02734D6且特材代碼前7碼為CBP01A2、CBP01A5、
CBP01A6。

器官移植：醫令代碼前5碼：心臟移植為68035、肺臟移植為68037
（單肺）或68047（雙肺）、肝臟移植為75020、腎臟移植為
76020、胰臟移植為75418、角膜移植為85213。

二、指標解讀：屬負向指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+15\%)$ 作為上限值，
106年為 $\leq 8.63\%$ 。

指標12：住院案件出院後三日以內急診率(108.01)

一、定義：

（一）資料範圍：每季所有屬醫院總額之出院案件與急診案件。

（二）公式說明：

分子：3日內再急診案件數。

分母：出院案件數。

排除下列案件：

- 1、精神科個案(就醫科別=13)
- 2、乳癌試辦案件(案件分類4+病患來源N或R或C)
- 3、化學治療及放射線治療、來院接受抗腫瘤免疫療法(主、次診斷ICD-10-CM Z510、Z5111、Z51.12)
- 4、早產安胎個案(TW-DRG 37901、37902、37903、38301、38302、384)
- 5、罕見疾病—黏多醣症(主診斷ICD-10-CM E760-E763)
- 6、轉院案件(轉歸代碼5、6或7)
- 7、新生兒未領卡(部份負擔註記903)
- 8、血友病(主診斷ICD-10-CM D66、D67、D681、D682)
- 9、器官移植(醫令代碼前5碼)心臟移植：68035、肺臟移植：68037(單肺)、68047(雙肺)、肝臟移植：75020、腎臟移植：76020。
- 10、病患死亡或病危自動出院案件(轉歸代碼4或A)。

二、指標解讀：屬負向指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 2.85\%$ 。

指標13-1：剖腹產率-整體(1136.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：醫院剖腹產案件數。

分母：醫院總生產案件數。

總生產案件數＝自然產案件數+剖腹產案件數。

自然產案件：符合下列任一條件：

- 1、TW-DRG前3碼為372~375。
- 2、DRG_CODE為0373A、0373C。

3、需符合任一自然產醫令代碼：81017C、81018C、81019C、97004C、97005D、81024C、81025C、81026C、97934C、81034C。

剖腹產案件：符合下列任一條件：

1、TW-DRG前3碼為370、371、513。

2、DRG_CODE為0371A、0373B。

3、符合任一剖腹產醫令代碼：81004C、81028C、97009C、81005C、81029C、97014C。

二、指標解讀：屬負向指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 36.76\%$ 。

指標13-2：剖腹產率-自行要求(1137.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：醫院不具適應症之剖腹產案件。

分母：醫院總生產案件數。

不具適應症之剖腹產案件(自行要求剖腹產)，符合下列任一條件：醫令代碼為97014C、DRG_CODE為0373B、TW-DRG前3碼為513。

總生產案件數：同指標13-1。

二、指標解讀：屬負向指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 1.88\%$ 。

指標13-3：剖腹產率-具適應症 (1138.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：醫院具適應症之剖腹產案件數(不具適應症剖腹產之外的剖腹產案件；即指標13-1分子－指標13-2分子)。

分母：醫院總生產案件數。

總生產案件數：同指標13-1。

二、指標解讀：指標之正負向：合理範圍。以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 34.89\%$ 。

指標13-4：剖腹產率-初次具適應症 (1075.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：總生產案件數中屬初次非自願剖腹產具適應症之剖腹產案件數

分母：總生產案件數

初次非自願剖腹產案件：醫令代碼為81004C、81028C或主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2之案件，但需排除下列條件(符合1或2任一項)：

(1).DRG碼為0373B(自行要求剖腹產)。

(2).主處置代碼 (ICD-10-PCS手術代碼)為10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2且主次診斷碼前四碼為6542(前胎剖腹產生產)。

總生產案件數：＝同指標13-1

二、指標解讀：指標之正負向：合理範圍。以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 21.84\%$ 。

指標14：清淨手術術後使用抗生素超過三日比率(1155)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：手術後>3日使用抗生素案件數。

分母：清淨手術案件數

清淨手術案件數：案件分類為5且符合下列任一條件但排除主診斷 ICD-10-CM前3碼為C40、C41、D65-D68，全碼Z51.12或主診斷 ICD-10-CM 碼C7B03、C7951-C7952、R791或任一主、次診斷：中耳炎(ICD-10-CM前3碼為 H65-H67)、肺炎(ICD-10-CM 前3碼為 J12-J18)、UTI(ICD-10-CM前3碼 N30、N34，全碼N390)：

(1)主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為 0YQ50ZZ、0YQ53ZZ、0YQ54ZZ、0YQ60ZZ、0YQ63ZZ、0YQ64ZZ、0YQ70ZZ、0YQ73ZZ、0YQ74ZZ、0YQ80ZZ、0YQ83ZZ、0YQ84ZZ、0YQA0ZZ、0YQA3ZZ、0YQA4ZZ、0YQE0ZZ、0YQE3ZZ、0YQE4ZZ。

(2)主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為 0GBG0ZZ、0GBG3ZZ、0GBG4ZZ、0GBH0ZZ、0GBH3ZZ、0GBH4ZZ、0GTG0ZZ、0GTG4ZZ、0GTH0ZZ、0GTH4ZZ、0GTK0ZZ、0GTK4ZZ且主診斷ICD-10-CM碼前3碼為E00-E07、E35，全碼E89.0。

(3)主處置代碼(ICD-10-PCS手術代碼)為0SR9019、0SR901A、0SR901Z、0SR9029、0SR902A、0SR902Z、0SR9039、0SR903A、0SR903Z、0SR9049、0SR934A、0SR904Z、0SR90J9、0SR90JA、0SR90JZ、0SRB019、0SRB01A、0SRB01Z、0SRB029、0SRB902A、0SRB02Z、0SRB039、0SRB03A、0SRB03Z、0SRB049、0SRB04A、0SRB04Z、0SRB0J9、0SRB0JA、0SRB0JZ、0SRD0JZ、0SRW07Z、0SRC0KZ、0SRC0JZ、0SRC07Z、0SRW0KZ、0SRW0JZ、0SRD0KZ、0SRT07Z、0SRT0JZ、0SRT0KZ、0SRU07Z、0SRU0JZ、0SRU0KZ、0SRV07Z、0SRV0JZ、0SRV0KZ、

0SRD07Z。

抗生素ATC碼前三碼為J01（ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE）。

二、指標解讀：屬負向指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 9.97\%$ 。

指標15：接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數(20.01、 1804)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之ESWL案件。

(二)公式說明：

分子：ESWL使用次數。

分母：ESWL使用人數。

ESWL案件：醫令代碼50023A、50024A、50025A、50026A、50023B、50024B、50025B、50026B。

二、指標解讀：屬負向指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 ≤ 1.50 次。

指標16：子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率(473.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額案件。

(二)公式說明：

分子：分母案件出院14日內因該手術相關診斷再住院人次數。

分母：申報子宮肌瘤診斷(排除癌症診斷)且有施行子宮肌瘤摘除或子宮切除手術治療住院人次數。

子宮肌瘤診斷：住診案件任一主、次診斷之ICD-10-CM前3碼為D25。

癌症診斷：門、住診案件任一主、次診斷ICD-10-CM前3碼為

C00-C96(但排除C944、C946)、D37-D48，全碼Z51.12、J84.81。

子宮肌瘤摘除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97010K、97011A、97012B、97013B、80402C、80420C、80415B、80415C、80425C、97013C。

子宮切除術：住診案件，醫令類別2且醫令代碼97025K、97026A、97027B、97020K、97021A、97022B、97035K、97036A、97037B、80403B、80404B、80421B、80416B、80412B、80404C、97027C。

相關診斷：住診案件，任一主、次診斷ICD-10-CM前3碼 N70-N85。

14日內再住院率勾稽方式：住診案件(再次住院入院日－手術當次住院出院日)≤ 14(跨院)。子宮肌瘤診斷與手術(子宮肌瘤摘除或子宮切除手術)需限定發生在同一清單案件(同案件分類、流水號)。

二、指標解讀：屬負向指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 0.36\%$ 。

指標17：人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率(353.01)

一、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：分母案件中，人工膝關節置換後90天內發生置換物感染之案件數。

分母：當季內醫院人工膝關節置換術執行案件數。

人工膝關節置換執行案件數：醫令代碼為64164B且醫令類別為 2或醫令代碼為97805K、97806A、97807B 之住院案件。

置換物感染：跨院勾稽西醫醫院之住診案件中，以手術醫令執行起日往後推算90天，有執行64053B、64004C、64198B 任一醫令之案件。

二、指標解讀：屬負向指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106

年為 $\leq 0.28\%$ 。

指標18：手術傷口感染率(1658、 1666)

三、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之住院案件。

(二)公式說明：

分子：分母案件中，手術傷口感染病人數。

分母：當季內所有住院手術病人數。

手術：醫令代碼全長6碼且前2碼為62-88及97者。

傷口感染：依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之任一次診斷ICD-10-CM碼為D78.01、D78.02、D78.21、D78.22、E36.01、E36.02、G97.31、G97.32、G97.51、G97.52、H59.111、H59.112、H59.113、H59.119、H59.121、H59.122、H59.123、H59.129、H59.311、H59.312、H59.313、H59.319、H59.321、H59.322、H59.323、H59.329、H95.21、H95.22、H95.41、H95.42、I97.410、I97.411、I97.418、I97.42、I97.610、I97.611、I97.618、I97.62、J95.61、J95.62、J95.830、J95.831、K68.11、K91.61、K91.62、K91.840、K91.841、L76.01、L76.02、L76.21、L76.22、M96.810、M96.811、M96.830、M96.831、N99.61、N99.62、N99.820、N99.821、R50.84、T80.211A、T80.212A、T80.218A、T80.219A、T80.22XA、T81.30XA、T81.31XA、T81.32XA、T81.33XA、T81.4XXA、T82.6XXA、T82.7XXA、T83.51XA、T83.59XA、T83.6XXA、T84.50XA、T84.51XA、T84.52XA、T84.53XA、T84.54XA、T84.59XA、T84.60XA、T84.610A、T84.611A、T84.612A、T84.613A、T84.614A、T84.615A、T84.619A、T84.620A、T84.621A、T84.622A、T84.623A、T84.624A、T84.625A、T84.629A、T84.63XA、T84.69XA、T84.7XXA、T85.71XA、T85.72XA、T85.79XA、T86.842、T88.8XXA，則將納入計算。

四、指標解讀：屬負向指標，為105年新增訂指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 1.51\%$ 。

指標19：急性心肌梗塞死亡率(1662、1668)

五、定義：

(一)資料範圍：每季所有屬醫院總額之門診、住院案件。

(二)公式說明：

分子：分母案件中，病患死亡個案數。

分母：當季18歲以上且主診斷為急性心肌梗塞之病患數。

急性心肌梗塞：主診斷ICD-10-CM碼前3碼為I21-I22。

死亡：門住診勾稽承保資料保險對象資訊檔(V_DWU_BASINS_INF)註記為死亡者；此外，住院再依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之轉歸代碼(TRAN_CODE)為4(死亡)、A(病危自動出院)，也視為死亡。

分母、分子需排除轉院個案。轉院：門診之病患是否轉出(PAT_TRAN_OUT)為Y；住院依[院所、ID、生日、住院日]歸戶下有任一件之轉歸代碼(TRAN_CODE)為6(轉院)，則整件排除。


六、指標解讀：屬負向指標，為105年新增訂指標，以最近3年全區值平均值 $\times(1+10\%)$ 作為上限值，106年為 $\leq 11.46\%$ 。

參、指標值監測結果


以下為醫院總額專業醫療服務品質指標 106 年各指標值監測結果，分別以整體趨勢變化、分區別比較、層級別比較來呈現。

指標 1.門診注射劑使用率

一、整體趨勢變化：門診注射劑使用率，106 年全年統計值 3.22%，與 105 年之 3.13%相較，呈上升趨勢，持續觀測。




二、分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，皆呈現上升趨勢。中區業務組統計值高於參考值(3.49%)，持續觀測。



年度	臺北 業務組	北區 業務組	中區 業務組	南區 業務組	高屏 業務組	東區 業務組	合計
105 年	2.85%	2.96%	3.50%	3.19%	2.97%	3.07%	3.07%
105 年	2.94%	3.00%	3.54%	3.22%	3.04%	3.16%	3.13%
106 年	3.08%	3.13%	3.56%	3.28%	3.07%	3.46%	3.22%


三、層級別比較：106 年各層級門診注射劑使用率與 105 年相較，地區醫院呈現降低趨勢，惟仍高於參考值；醫學中心與區域醫院則呈上升趨勢，持續觀測。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	2.98%	2.76%	3.64%
105 年	3.15%	2.79%	3.63%
106 年	3.32%	2.90%	3.62%

指標 2.門診抗生素使用率

一、 整體趨勢變化：門診抗生素使用率，106 年全年統計值 5.88%與 105 年之 6.06%相較，呈現下降趨勢。




二、分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，皆呈現下降趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
105 年	6.20%	6.22%	6.22%	5.93%	5.59%	5.85%	6.06%
105 年	6.21%	6.22%	6.20%	5.96%	5.61%	5.66%	6.06%
106 年	6.00%	6.09%	6.12%	5.67%	5.40%	5.37%	5.88%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，皆呈現下降趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	5.04%	5.82%	7.46%
105 年	5.03%	5.91%	7.37%
106 年	4.82%	5.76%	7.16%

指標 3-1.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）

- 一、 整體趨勢變化：同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服），106 年全年統計值 0.07%與 105 年之 0.07%相較，呈現持平趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，其他分區均呈現下降或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.14%	0.12%	0.11%	0.13%	0.10%	0.15%	0.12%
105 年	0.07%	0.07%	0.06%	0.08%	0.06%	0.07%	0.07%
106 年	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.08%	0.06%	0.07%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現持平趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.12%	0.13%	0.13%
105 年	0.06%	0.07%	0.08%
106 年	0.06%	0.07%	0.08%

指標 3-2.同醫院同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）

- 一、 整體趨勢變化：同醫院同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服），106 年全年統計值 0.04%與 105 年之 0.04%相較，呈現持平趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，均呈現下降或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.09%	0.08%	0.07%	0.08%	0.06%	0.08%	0.08%
105 年	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
106 年	0.04%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現下降或持平趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.08%	0.08%	0.08%
105 年	0.04%	0.04%	0.05%
106 年	0.04%	0.03%	0.05%

指標 3-3.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

- 一、 整體趨勢變化：同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖，106 年全年統計值 0.04%與 105 年之 0.04%相較，呈現持平趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，均呈現下降或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.09%	0.07%	0.08%	0.08%	0.07%	0.10%	0.08%
105 年	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%
106 年	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現降低趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.08%	0.08%	0.09%
105 年	0.04%	0.04%	0.06%
106 年	0.04%	0.03%	0.05%

指標 3-4. 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

- 一、 整體趨勢變化：同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症，106 年全年統計值 0.09%與 105 年之 0.10%相較，呈降低趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，均呈現降低或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.27%	0.16%	0.21%	0.21%	0.18%	0.13%	0.21%
105 年	0.10%	0.09%	0.09%	0.12%	0.07%	0.09%	0.10%
106 年	0.10%	0.09%	0.08%	0.12%	0.10%	0.05%	0.09%


三、層級別比較:106年各層級統計值與105年相較,區預醫院略呈上升,其他層級則呈現降低趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.22%	0.20%	0.22%
105 年	0.10%	0.08%	0.12%
106 年	0.09%	0.09%	0.11%

指標 3-5.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

- 一、 整體趨勢變化：同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症，106 年全年統計值 0.07%與 105 年之 0.07%相較，呈現持平趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，均呈現降低或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.16%	0.12%	0.13%	0.14%	0.11%	0.09%	0.14%
105 年	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.06%	0.04%	0.07%
106 年	0.06%	0.07%	0.06%	0.08%	0.07%	0.03%	0.07%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現持平趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.14%	0.13%	0.14%
105 年	0.06%	0.07%	0.08%
106 年	0.06%	0.07%	0.08%

指標 3-6.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

- 一、 整體趨勢變化：同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜，106 年全年統計值 0.10%與 105 年之 0.10%相較，呈現持平趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除北 區、高屏業務組外，均呈現降低或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.23%	0.15%	0.18%	0.25%	0.15%	0.19%	0.20%
105 年	0.10%	0.08%	0.09%	0.16%	0.09%	0.10%	0.10%
106 年	0.10%	0.09%	0.08%	0.14%	0.10%	0.06%	0.10%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現下降或持平趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.20%	0.20%	0.19%
105 年	0.09%	0.11%	0.11%
106 年	0.08%	0.10%	0.11%

指標 3-7.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）

- 一、 整體趨勢變化:跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服），
106 年全年統計值 0.28%與 105 年之 0.32%相較，呈現下降趨勢。




- 二、 分區別比較:106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，
均呈現下降趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.49%	0.48%	0.47%	0.50%	0.47%	0.56%	0.48%
105 年	0.31%	0.34%	0.31%	0.33%	0.34%	0.40%	0.32%
106 年	0.25%	0.28%	0.26%	0.29%	0.35%	0.39%	0.28%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現下降趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.46%	0.48%	0.52%
105 年	0.30%	0.32%	0.36%
106 年	0.25%	0.28%	0.32%

指標 3-8.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）

- 一、 整體趨勢變化:跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服），
106 年全年統計值 0.16%與 105 年之 0.18%相較，呈現下降趨勢。




- 二、 分區別比較:106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，
均呈現下降或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.28%	0.26%	0.27%	0.26%	0.26%	0.33%	0.27%
105 年	0.18%	0.17%	0.17%	0.16%	0.19%	0.25%	0.18%
106 年	0.14%	0.15%	0.14%	0.16%	0.20%	0.21%	0.16%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現降低趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.28%	0.26%	0.29%
105 年	0.17%	0.18%	0.19%
106 年	0.15%	0.16%	0.17%

指標 3-9.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

- 一、 整體趨勢變化：跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖，106 年全年統計值 0.15%與 105 年之 0.18%相較，呈降低趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，均呈現降低或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.30%	0.29%	0.29%	0.31%	0.29%	0.34%	0.30%
105 年	0.18%	0.19%	0.17%	0.18%	0.18%	0.25%	0.18%
106 年	0.13%	0.15%	0.13%	0.16%	0.18%	0.22%	0.15%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現降低趨勢。




年度	醫學 中心	區域 醫院	地區 醫院
104 年	0.29%	0.29%	0.33%
105 年	0.17%	0.18%	0.20%
106 年	0.14%	0.14%	0.17%

指標 3-10.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

- 一、 整體趨勢變化：跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症，106 年全年統計值 0.33%與 105 年之 0.38%相較，呈下降趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，均呈現下降趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.73%	0.54%	0.71%	0.58%	0.57%	0.37%	0.64%
105 年	0.42%	0.36%	0.39%	0.41%	0.31%	0.23%	0.38%
106 年	0.34%	0.32%	0.32%	0.34%	0.36%	0.19%	0.33%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現下降趨勢。




年度	醫學 中心	區域 醫院	地區 醫院
104 年	0.65%	0.61%	0.70%
105 年	0.40%	0.35%	0.41%
106 年	0.31%	0.31%	0.39%

指標 3-11.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

- 一、 整體趨勢變化：跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症，106 年全年統計值 0.29%與 105 年之 0.34%相較，呈降低趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏業務組外，均呈現下降趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.54%	0.49%	0.54%	0.56%	0.48%	0.50%	0.53%
105 年	0.33%	0.34%	0.36%	0.39%	0.29%	0.35%	0.34%
106 年	0.26%	0.30%	0.30%	0.33%	0.33%	0.20%	0.29%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現降低趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.51%	0.51%	0.59%
105 年	0.33%	0.33%	0.39%
106 年	0.29%	0.27%	0.34%

指標 3-12.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜

- 一、 整體趨勢變化：跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜，106 年全年統計值 0.75%與 105 年之 0.96%相較，呈降低趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，均呈現下降趨勢。。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	1.62%	1.23%	1.51%	1.59%	1.12%	1.29%	1.47%
105 年	1.02%	0.85%	0.97%	1.10%	0.74%	0.94%	0.96%
106 年	0.76%	0.69%	0.71%	0.86%	0.70%	0.69%	0.75%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現下降趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	1.41%	1.44%	1.60%
105 年	0.89%	0.95%	1.07%
106 年	0.68%	0.74%	0.83%

指標 4.慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(非絕對正向或負向指標)

- 一、 整體趨勢變化：慢性病開立慢性病連續處方箋百分比，106 年全年統計值 45.05%與 105 年之 44.43%相較，呈上升趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區別統計值與 105 年相較，除中區業務組呈現微幅下降，其他分區則呈現上升趨勢，符合觀測趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	47.10%	46.25%	44.86%	43.17%	43.49%	40.85%	45.31%
105 年	46.52%	44.62%	43.63%	41.88%	43.12%	41.27%	44.43%
106 年	47.55%	45.54%	43.13%	42.60%	43.69%	42.72%	45.05%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，皆呈現上升趨勢。




年度	醫學 中心	區域 醫院	地區 醫院
104 年	49.57%	48.28%	33.39%
105 年	48.55%	46.51%	34.08%
106 年	49.28%	47.17%	34.77%

指標 5.每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率

- 一、 整體趨勢變化：平均每張處方箋開藥品項數大於十項之比率，106 年全年統計值 1.01%與 105 年之 0.96%相較，呈上升趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除東區業務組下降外，其他業務組皆呈現略微上升。高屏與東區之統計值高於參考值(1.08%)，持續觀測。



年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	合計
104 年	0.91%	0.91%	0.84%	0.94%	1.07%	1.16%	0.94%
105 年	0.91%	0.94%	0.85%	1.00%	1.10%	1.18%	0.96%
106 年	0.97%	1.00%	0.88%	1.04%	1.16%	1.17%	1.01%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，各層級均呈現略微上升。醫學中心之統計值高於參考值(1.08%)。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	1.47%	0.82%	0.57%
105 年	1.48%	0.84%	0.59%
106 年	1.54%	0.87%	0.63%

指標 6.十八歲以下氣喘病人急診率

- 一、 整體趨勢變化：十八歲以下氣喘病人急診率，106 年全年統計值 14.51%與 105 年相之 13.96%相較，呈現上升。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除高屏與東區業務組下降外，其他業務組皆為上升，持續觀測。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	14.80%	14.50%	14.00%	17.10%	15.47%	17.20%	15.10%
105 年	14.15%	13.53%	11.44%	14.18%	15.32%	17.10%	13.96%
106 年	14.96%	14.54%	11.89%	15.07%	14.77%	15.17%	14.51%


三、層級別比較：106年各層級統計值與105年相較，地區醫院呈現下降，其他層級醫院呈現上升，持續觀察。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	12.64%	18.01%	10.50%
105 年	11.90%	16.65%	9.39%
106 年	13.12%	16.93%	8.35%

指標 7.糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率(正向指標)

- 一、 整體趨勢變化：糖尿病病人糖化血紅素（HbA1c）執行率，106 年全年統計值 93.01%與 105 年之 91.70%相較，呈現上升，符合觀測趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，各分區皆呈現上升趨勢。



年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	合計
104 年	92.32%	91.12%	90.03%	90.55%	89.38%	88.41%	91.51%
105 年	92.76%	91.78%	89.20%	91.19%	89.72%	88.85%	91.70%
106 年	93.30%	92.37%	92.51%	92.09%	91.69%	89.29%	93.01%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，各層級呈現上升趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	91.07%	88.35%	88.23%
105 年	90.71%	89.23%	88.71%
106 年	92.33%	90.67%	89.84%

指標 8.就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率

- 一、 整體趨勢變化：就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率，106 年全年統計值 0.94%與 105 年之 0.92%相較，略微上升，持續觀測。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，東區業務組呈現下降，其他分區均微幅上升，持續觀測。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.98%	0.83%	1.06%	0.97%	0.78%	0.84%	0.94%
105 年	0.96%	0.80%	1.04%	0.96%	0.76%	0.75%	0.92%
106 年	0.99%	0.81%	1.06%	0.97%	0.82%	0.70%	0.94%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現微幅上升。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	1.24%	1.03%	0.49%
105 年	1.20%	1.00%	0.48%
106 年	1.22%	1.03%	0.52%

指標 9.門診上呼吸道感染病人就診後未滿七日因同疾病再次就診率

一、 整體趨勢變化：門診上呼吸道感染病人就診後未滿 7 日因同疾病再次就診率，106 年全年統計值 7.58%與 105 年之 8.44%相較，呈現下降。




二、 分區別比較： 106 年各分區統計值與 105 年相較，均呈現下降，惟中區業務組之統計值高於參考值(8.47%)，持續觀測。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	6.73%	6.36%	8.46%	6.98%	8.71%	5.93%	7.39%
105 年	7.74%	7.51%	9.49%	8.07%	9.75%	6.46%	8.44%
106 年	7.16%	6.83%	8.71%	8.03%	7.54%	6.17%	7.58%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現下降趨勢。
地區醫院統計值高於參考值(8.47%)。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	5.95%	6.31%	8.55%
105 年	6.86%	7.96%	9.33%
106 年	6.09%	6.92%	8.49%

指標 10.急性病床住院案件住院日數超過三十日比率

- 一、 整體趨勢變化：急性病床住院案件住院日數超過三十日比率，106 年全年統計值 1.49%與 105 年之 1.54%相較，呈現下降。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，各分區皆微幅下降。
台北業務組之統計值略高於參考值(1.84%)，持續觀測。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	1.83%	1.46%	1.08%	1.32%	1.59%	1.63%	1.50%
105 年	1.88%	1.46%	1.05%	1.47%	1.63%	1.66%	1.54%
106 年	1.85%	1.39%	1.02%	1.38%	1.59%	1.58%	1.49%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現微幅下降。
醫學中心統計值高於參考值(1.84%)，持續觀測。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	2.17%	1.25%	0.76%
105 年	2.20%	1.29%	0.84%
106 年	2.11%	1.27%	0.77%

指標 11.非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率

- 一、 整體趨勢變化：本指標排除條件之「化學治療及放射線治療」部分，於 106 年 10 月 27 日公告修訂擴大為「癌症、性態未明腫瘤治療」，106 年全年統計值 5.83%與 105 年之 7.5%相較為下降。106 年前 3 季之統計值分別為 6.82%、6.97%、6.89%，與 105 年之 6.87%、7.13%、7.10%相較，呈現下降。




- 二、 分區別比較：106 年前 3 季各分區統計值，與 105 年相較，中區業務組呈現微幅上升，其他分區呈現下降趨勢。



年(季)度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	7.48%	5.89%	6.92%	8.21%	6.24%	7.83%	7.46%

105 年	7.42%	5.92%	7.09%	8.11%	6.55%	7.80%	7.50%
106 年	5.39%	4.87%	5.93%	6.40%	4.98%	6.27%	5.83%
105 年 1 季	6.90%	5.60%	6.18%	7.38%	6.00%	7.56%	6.87%
105 年 2 季	7.11%	5.74%	6.84%	7.58%	6.17%	6.97%	7.13%
105 年 3 季	7.10%	5.63%	6.80%	7.58%	6.05%	7.20%	7.10%
106 年 1 季	6.61%	5.55%	6.86%	7.52%	5.56%	6.80%	6.82%
106 年 2 季	6.73%	5.61%	6.99%	7.73%	5.75%	6.98%	6.97%
106 年 3 季	6.71%	5.61%	6.92%	7.46%	5.67%	6.72%	6.89%


三、層級別比較：106 年前 3 季各層級統計值與 105 年相較，地區醫院為服上升，其他層級醫院呈現下降。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	7.21%	7.80%	7.72%
105 年	7.17%	7.89%	7.81%
106 年	4.94%	6.31%	6.97%
105 年 1 季	6.57%	7.14%	7.66%
105 年 2 季	6.57%	7.14%	7.66%
105 年 3 季	6.72%	7.53%	7.78%
106 年 1 季	6.18%	7.36%	7.62%
106 年 2 季	6.46%	7.39%	7.89%
106 年 3 季	6.40%	7.28%	7.80%

指標 12.住院案件出院後三日以內急診率

- 一、 整體趨勢變化：住院案件出院後三日以內急診率，106 年全年統計值 2.45%與 105 年之 2.53%相較，呈下降趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，各分區皆呈現下降或持平趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	2.84%	2.72%	2.50%	2.63%	2.39%	2.97%	2.65%
105 年	2.81%	2.67%	2.35%	2.50%	2.10%	3.02%	2.53%
106 年	2.70%	2.61%	2.35%	2.39%	2.03%	2.58%	2.45%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現下降趨勢。




年度	醫學 中心	區域 醫院	地區 醫院
104 年	2.40%	2.83%	2.66%
105 年	2.27%	2.71%	2.59%
106 年	2.23%	2.60%	2.51%

指標 13-1.剖腹產率-整體

- 一、 整體趨勢變化：剖腹產率-整體，106 年全年統計值 33.14%與 105 年之 33.25%相較，呈下降趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，有 2 分區微幅上升趨勢，其他分區呈現下降趨勢。高屏業務組統計值高於參考值 (36.76%)。



年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	合計
104 年	33.12%	30.87%	32.63%	35.21%	37.88%	30.04%	33.48%
105 年	32.20%	30.82%	32.61%	33.84%	38.73%	31.15%	33.25%
106 年	31.79%	31.43%	33.09%	32.61%	37.93%	30.71%	33.14%


三、層級別比較:106年各層級統計值與105年相較,醫學中呈現微幅上升,其他2層級醫院呈現下降趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	36.06%	31.76%	33.45%
105 年	35.74%	31.16%	33.61%
106 年	35.85%	30.94%	33.40%

指標 13-2.剖腹產率-自行要求

- 一、 整體趨勢變化：剖腹產率-自行要求，106 年全年統計值 1.36%與 105 年之 1.49%相較，呈下降趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除東區業務組為上升外，其他分區均呈現下降趨勢。臺北業務組統計值高於參考值 (1.88%)。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	2.57%	2.00%	1.08%	2.03%	1.00%	2.13%	1.79%
105 年	2.03%	1.76%	1.03%	1.44%	0.99%	1.29%	1.49%
106 年	1.96%	1.48%	0.99%	1.14%	0.89%	1.82%	1.36%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，均呈現下降趨勢。




年度	醫學 中心	區域 醫院	地區 醫院
104 年	1.99%	2.17%	1.26%
105 年	1.54%	1.84%	1.12%
106 年	1.39%	1.72%	1.00%

指標 13-3.剖腹產率-具適應症(合理範圍)

- 一、 整體趨勢變化：剖腹產率-具適應症，106 年全年統計值 31.78%與 105 年之 31.77%相較，微幅上升。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，有 2 分區微幅上升，其他分區呈現下降趨勢。高屏業務組統計值高於參考值(34.89%)。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	30.55%	28.87%	31.55%	33.18%	36.89%	27.90%	31.70%
105 年	30.17%	29.07%	31.58%	32.40%	37.73%	29.85%	31.77%
106 年	29.83%	29.95%	32.10%	31.47%	37.04%	28.89%	31.78%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，區域醫院呈現微幅下降，其他 2 層級呈現上升趨勢。




年度	醫學 中心	區域 醫院	地區 醫院
104 年	34.07%	29.58%	32.19%
105 年	34.20%	29.32%	32.49%
106 年	34.46%	29.22%	32.39%

指標 13-4.剖腹產率-初次具適應症(合理範圍)

- 一、 整體趨勢變化：剖腹產率-初次具適應症，106 年全年統計值 19.89%與 105 年之 19.71%相較，呈現微幅上升。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較， 2 分區微幅上升，其他 4 分區呈現下降趨勢。高屏業務組統計值高於參考值(21.84%)。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	20.86%	18.86%	19.60%	20.72%	22.02%	17.68%	20.26%
105 年	19.23%	18.96%	19.19%	19.35%	22.63%	17.49%	19.71%
106 年	19.04%	19.50%	19.95%	19.35%	22.17%	17.46%	19.89%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，區域醫院呈現微幅下降，其他 2 層級醫院呈現上升趨勢。醫學中心統計值高於參考值。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	23.58%	18.81%	19.44%
105 年	22.25%	18.20%	19.50%
106 年	22.83%	18.16%	19.58%

指標 14.清淨手術術後使用抗生素超過三日比率

- 一、 整體趨勢變化：清淨手術術後使用抗生素超過三日比率，106 年全年統計值 8.93%與 105 年之 9.36%相較，呈現下降。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，除中區業務組上升外，其他分區呈現下降趨勢。高屏、台北、等 2 分區之統計值高於參考值(9.97%)。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	11.41%	6.12%	6.62%	7.55%	11.31%	5.94%	8.77%
105 年	10.86%	6.84%	7.83%	9.38%	11.63%	5.90%	9.36%
106 年	10.51%	6.68%	9.20%	7.17%	10.05%	4.96%	8.93%


三、層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，地區醫院上升且高於參考值，其他 2 層級醫院呈現下降趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	6.09%	10.32%	10.09%
105 年	5.63%	13.46%	8.80%
106 年	5.62%	11.81%	9.33%

指標 15.接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用 ESWL 之次數

- 一、 整體趨勢變化:接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用 ESWL 之次數，106 年全年統計值 1.40 與 105 年之 1.37 相較，呈上升趨勢，持續觀測。




- 二、 分區別比較:106 年各分區統計值與 105 年相較，各分區呈現微幅上升趨勢。東區業務組統計值高於參考值(1.50)，持續觀測。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	1.39	1.35	1.29	1.29	1.45	1.45	1.36
105 年	1.40	1.37	1.29	1.30	1.41	1.49	1.37
106 年	1.42	1.40	1.31	1.33	1.45	1.55	1.40


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，各層級醫院皆微幅上升。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	1.23	1.35	1.40
105 年	1.22	1.35	1.42
106 年	1.24	1.37	1.45

指標 16.子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率

- 一、 整體趨勢變化：子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率，106 年全年統計值 0.26%與 105 年之 0.29%相較，呈現下降趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，2 分區業務組上升，其他分區皆呈現下降趨勢。北區業務組統計值高於參考值(0.36%)。



年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	合計
104 年	0.31%	0.43%	0.37%	0.44%	0.46%	0.60%	0.39%
105 年	0.28%	0.25%	0.31%	0.24%	0.29%	0.88%	0.29%
106 年	0.17%	0.51%	0.26%	0.31%	0.15%	0.29%	0.26%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，各層級醫院皆呈現下降趨勢。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.23%	0.50%	0.60%
105 年	0.23%	0.36%	0.26%
106 年	0.22%	0.34%	0.16%

指標 17.人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率

- 一、 整體趨勢變化:人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率，106 年全年統計值 0.32%與 105 年之 0.30%相較，略呈上升趨勢。




- 二、 分區別比較:106 年各分區統計值與 105 年相較，中區與高屏區為下降，其他 4 分區皆呈現上升。北區、中區、南區等 3 分區之統計值高於參考值(0.28%)，持續觀測。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	0.17%	0.17%	0.24%	0.35%	0.28%	0.15%	0.23%
105 年	0.20%	0.25%	0.41%	0.32%	0.40%	0.00%	0.30%
106 年	0.21%	0.41%	0.40%	0.45%	0.26%	0.15%	0.32%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，地區醫院下降，其他層級呈現上升趨勢，三層及統計值均高於參考值(0.28%)。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	0.19%	0.24%	0.28%
105 年	0.23%	0.29%	0.40%
106 年	0.35%	0.31%	0.30%

指標 18.手術傷口感染率

- 一、 整體趨勢變化：手術傷口感染率，106 年全年統計值 1.27%與 105 年之 1.32%相較，呈現下降趨勢。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，各分區皆呈下降趨勢。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	1.35%	1.33%	1.29%	1.71%	1.43%	1.66%	1.41%
105 年	1.30%	1.23%	1.15%	1.57%	1.38%	1.57%	1.32%
106 年	1.26%	1.18%	1.12%	1.50%	1.36%	1.29%	1.27%


三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，各層級醫院均呈現下降趨勢。




年度	醫學 中心	區域 醫院	地區 醫院
104 年	1.70%	1.40%	0.72%
105 年	1.65%	1.27%	0.63%
106 年	1.61%	1.21%	0.61%

指標 19.心肌梗塞死亡率

- 一、 整體趨勢變化：急性心肌梗塞死亡率，106 年全年統計值 9.79%與 105 年之 10.38%相較，呈現下降。




- 二、 分區別比較：106 年各分區統計值與 105 年相較，2 分區業務組上升，其他分區皆呈現下降。高屏業務組統計值高於參考值(11.46%)，持續觀測。



年度	臺 北 業務組	北 區 業務組	中 區 業務組	南 區 業務組	高 屏 業務組	東 區 業務組	合計
104 年	5.11%	11.08%	9.67%	11.77%	10.98%	10.85%	8.87%
105 年	9.13%	12.10%	9.69%	11.11%	11.45%	12.72%	10.38%
106 年	8.23%	10.79%	9.07%	11.28%	11.48%	10.57%	9.79%

三、 層級別比較：106 年各層級統計值與 105 年相較，皆呈現下降趨勢。地區醫院統計值高於參考值(11.46%)，持續觀測。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院
104 年	7.25%	9.62%	12.87%
105 年	8.62%	11.16%	15.46%
106 年	8.07%	10.68%	12.53%

肆、結 論

- 一、 本報告共33項整體性醫療品質資訊指標，其全區統計值有「人工膝關節置換手術後九十日以內置換物感染深部感染率」1項指標高於參考值，其他指標之全區統計值皆符合參考值範圍，整體專業醫療服務品質尚稱良好，各指標監測比較，如附錄之表1。
- 二、 各分區統計顯示，有13項指標(含剖腹產率4項)之部分分區統計值高於參考值，其餘符合參考值範圍：「門診注射劑使用率」與「門診上呼吸道感染病人就診後未滿七日因同疾病再次就診率」之中區、「急性病床住院案件住院日數超過三十日比率」之臺北區、「接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數」之東區、「子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率」之北區、「急性心肌梗塞死亡率」之高屏區；「每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率」之高屏與東區、「清淨手術術後使用抗生素超過3日比率」之台北與高屏區；「人工膝關節置換手術後九十日以內置換物感染深部感染率」之北區與中區、南區。另剖腹產率4項指標各1分區統計值高於參考值。
- 三、 全區統計值相較105年統計值：指標屬性為負向者，大部分呈下降(改善)趨勢，有6項指標之106年統計值呈現上升(「門診注射劑使用率」、「每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率」、「十八歲以下氣喘病人急診率」、「就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率」、「接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數」與「人工膝關節置換手術後九十日以內置換物感染深部感染率」)，待持續觀察。指標屬性為正向「糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)執行率」與為非絕對正負向「慢性病開立慢性病連續處方箋百分比」者呈上升(改善)趨勢。另剖腹產率指標部分，整體指標之統計值下降，尚稱穩定。
- 四、 各分區統計值相較105年統計值：指標屬性為負向者，「門診注射劑使用率」與「接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL之次數」各分區統計值皆微幅上升；「每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率」與「就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率」有5分區統計值微幅上升；十八歲以下氣喘病人急診率」與「人工膝關節置換手術後九十日以內置換物感染深部感染率」有4分區統計值微幅上升；另有13項指標之部分分區統計值上升，待持續觀察。。指標屬性為正向者，「糖尿病病患糖化血紅素(HbA1c)執行率」各分區皆呈

上升趨勢，而非絕對正向與負向之「慢性病開立慢性病連續處方箋百分比」有5分區呈上升，符合期待。另剖腹產率指標有部分分區統計值上升，尚稱穩定。

附 錄

表 1、醫院總額專業醫療服務品質指標彙整表

指標	指標名稱(編號)	屬性	參考值	統計值	檢討
1	門診注射劑使用率(1150.01)	負向	3.49%	104 年：3.07% 105 年：3.13% 106 年：3.22%	呈現略升，於參考值範圍內
2	門診抗生素使用率(1140.01)	負向	7.01%	104 年：6.06% 105 年：6.06% 106 年：5.88%	穩定下降，符合監測趨勢。
3-1	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1710)	負向	0.15%	104 年：0.12% 105 年：0.07% 106 年：0.07%	呈現穩定下降趨勢，符合期待。
3-2	同醫院同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1711)	負向	0.09%	104 年：0.08% 105 年：0.04% 106 年：0.04%	
3-3	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)	負向	0.10%	104 年：0.08% 105 年：0.04% 106 年：0.04%	
3-4	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)	負向	0.26%	104 年：0.21% 105 年：0.10% 106 年：0.09%	
3-5	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)	負向	0.17%	104 年：0.14% 105 年：0.07% 106 年：0.07%	
3-6	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1728)	負向	0.25%	104 年：0.20% 105 年：0.10% 106 年：0.10%	
3-7	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓（口服）(1713)	負向	0.56%	104 年：0.48% 105 年：0.32% 106 年：0.28%	呈穩定下降趨勢，符合期待。
3-8	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂（口服）(1714)	負向	0.32%	104 年：0.27% 105 年：0.18% 106 年：0.16%	
3-9	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)	負向	0.35%	104 年：0.30% 105 年：0.18% 106 年：0.15%	
3-10	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)	負向	0.76%	104 年：0.64% 105 年：0.38% 106 年：0.33%	
3-11	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症1730	負向	0.63%	104 年：0.53% 105 年：0.34% 106 年：0.29%	
3-12	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1731)	負向	1.73%	104 年：1.47% 105 年：0.96% 106 年：0.75%	
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(1318)	非絕對正負向	37.91%	104 年：45.31% 105 年：44.43% 106 年：45.05%	106 年呈現上升，符合監測趨勢。
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(1749)	負向	1.08%	104 年：0.94% 105 年：0.96% 106 年：1.01%	105 年新增指標，呈現微幅上升，持續觀察。
6	18 歲以下氣喘病人急診率(1315、1317)	負向	18.10%	104 年：15.10%	106 年呈現上

指標	指標名稱(編號)	屬性	參考值	統計值	檢討
				105 年：13.96% 106 年：14.51%	升趨勢，仍在參考值範圍。
7	糖尿病病患糖化血紅素 (HbA1c) 執行率(109.01 季、110.01 年)	正向	73.08%	104 年：91.51% 105 年：91.70% 106 年：93.01%	呈上升趨勢，符合期待。
8	就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率(1322)	負向	1.12%	104 年：0.94% 105 年：0.92% 106 年：0.94%	106 年微幅上升，仍在參考值範圍。
9	門診上呼吸道感染病人就診後未滿七日因同疾病再次就診率(106.01)	負向	8.47%	104 年：7.39% 105 年：8.44% 106 年：7.58%	106 年呈下降趨勢
10	急性病床住院案件住院日數超過三十日比率(892.01)	負向	1.84%	104 年：1.50% 105 年：1.54% 106 年：1.49%	106 年呈下降趨勢
11	非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率(1077.01、1809)	負向	8.63%	104 年：7.46% 105 年：7.50% 106 年：5.83%	106 年修定指標操作型定義，呈現下降。
12	住院案件出院後三日內急診率(108.01)	負向	2.85%	104 年：2.65% 105 年：2.53% 106 年：2.45%	106 年呈現下降趨勢，符合觀測趨勢。
13	(1)剖腹產率-整體(1136.01)	負向	36.76%	104 年：33.48% 105 年：33.25% 106 年：33.14%	呈現下降趨勢，尚稱穩定。
	(2)剖腹產率-自行要求 (1137.01)	負向	1.88%	104 年：1.79% 105 年：1.49% 106 年：1.36%	呈現下降趨勢。
	(3)剖腹產率-具適應症 (1138.01)	合理範圍	34.89%	104 年：31.70% 105 年：31.77% 106 年：31.78%	略呈現上升趨勢，尚稱穩定。
	(4)剖腹產率-初次具適應症(1075.01)	合理範圍	21.84%	104 年：20.26% 105 年：19.71% 106 年：19.89%	106 年呈現下降趨勢。
14	清淨手術術後使用抗生素超過 3 日比率(1155)	負向	9.97%	104 年：8.77% 105 年：9.36% 106 年：8.93%	106 年呈現下降趨勢。
15	接受體外震波術(ESWL)病人平均利用 ESWL 之次數(20.01、1804)	負向	1.50	104 年：1.36 105 年：1.37 106 年：1.40	106 年略呈上升趨勢，持續觀測。
16	子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率(473.01)	負向	0.36%	104 年：0.39% 105 年：0.29% 106 年：0.26%	106 年呈現下降趨勢。
17	人工膝關節置換手術後九十日以內置換物感染深部感染率(353.01)	負向	0.28%	104 年：0.23% 105 年：0.30% 106 年：0.32%	呈現上升趨勢大於參考值，持續觀察
18	手術傷口感染率(1658、1666)	負向	1.51%	104 年：1.41% 105 年：1.32% 106 年：1.27%	106 年呈現下降趨勢
19	急性心肌梗塞死亡率(1662、1668)	負向	11.46%	104 年：8.87% 105 年：10.38% 106 年：9.79%	106 年呈現下降趨勢。

表 2、106 年全年指標值較前一年(105 年)升降比較表

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
1	門診注射劑使用率(1150.01)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
2	門診抗生素使用率(1140.01)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
3-1	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)(1710)	↓	↔	↔	↓	↑	↓	↔
3-2	同醫院同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)(1711)	↔	↓	↓	↔	↑	↓	↔
3-3	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1712)	↓	↓	↔	↓	↑	↓	↔
3-4	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1726)	↔	↔	↓	↔	↑	↓	↓
3-5	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1727)	↔	↔	↓	↔	↑	↓	↔
3-6	同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1728)	↔	↑	↓	↓	↑	↓	↔
3-7	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓 (口服)(1713)	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓
3-8	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂 (口服)(1714)	↓	↓	↓	↔	↑	↓	↓
3-9	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖(1715)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
3-10	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症(1729)	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓
3-11	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症(1730)	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓
3-12	跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(1731)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
4	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比(1318) (非絕對正負向)	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑
5	每張處方箋開藥品項數大於十項之案件比率(1749)	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑
6	18 歲以下氣喘病人急診率(1315、1317)	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↑
7	糖尿病病患糖化血紅素 (HbA1c) 執行率(109.01 季 110.01 年) (正向)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
8	就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率(1322)	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑
9	門診上呼吸道感染病人就診後未滿七日因同疾病再次就診率(106.01)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
10	急性病床住院案件住院日數超過三十日比率(892.01)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
11	非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率(1077.01、1809)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
12	住院案件出院後三日內急診率(108.01)	↓	↓	↔	↓	↓	↓	↓

指標	指標名稱(編號)	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全局
13	(1)剖腹產率-整體 (1136.01)	↓	↑	↑	↓	↓	↓	↓
	(2)剖腹產率-自行要求 (1137.01)	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓
	(3)剖腹產率-具適應症 (1138.01) (合理範圍)	↓	↑	↑	↓	↓	↓	↑
	(4)剖腹產率-初次具適應症(1139.01) (合理範圍)	↓	↑	↑	↔	↓	↓	↑
14	清淨手術術後使用抗生素超過3日比率(1155)	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓
15	接受體外震波術(ESWL)病人平均利用 ESWL 之次數(20.01、1804)	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
16	子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率(473.01)	↓	↑	↓	↑	↓	↓	↓
17	人工膝關節置換手術後九十日以內置換物感染深部感染率(353.01)	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↑
18	手術傷口感染率(1658、1666)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
19	急性心肌梗塞死亡率(1662、1668)	↓	↓	↓	↑	↑	↓	↓

說明： ↔表示與前一年平穩 ↓表示較前一年下降 ↑表示較前一年上升