

98 年
西醫基層總額專業醫療服務品質報告



行政院衛生署
中央健康保險局

99 年 7 月

目錄

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義-----	2
貳、指標值監測結果-----	8
參、98 年結論-----	26
肆、98 年問題回顧及各分區業務組採行對策-----	27

附表

指標 2.1 各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率-----	52
指標 2.2.1 各區跨院所降血壓藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率-----	53
指標 2.2.2 各區跨院所降血脂藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率-----	54
指標 2.2.3 各區跨院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率-----	55
指標 2.2.4 各區跨院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率-----	56
指標 2.2.5 各區跨院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率-----	57
指標 2.2.6 各區跨院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率-----	58
指標 2.2.7 各區同院所降血壓藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率-----	59
指標 2.2.8 各區同院所降血脂藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率-----	60
指標 2.2.9 各區同院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率-----	61
指標 2.2.10 各區同院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率-----	62
指標 2.2.11 各區同院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率-----	63
指標 2.2.12 各區同院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率-----	64
指標 2.3 各區門診平均每張處方箋開藥天數-----	65
指標 2.4 各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比-----	66
指標 2.5 各區處方箋釋出率-----	67
指標 2.6 各區門診注射劑使用率-----	68
指標 2.7 各區門診抗生素使用率-----	69

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義

指標 2.1：各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率

一、定義：

(一) 資料範圍：每季，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染（主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487'）案件。

(二) 公式說明：

分子：按院所、ID 歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於 7 日之人次。

分母：按院所、ID 歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。

二、指標解讀：

(一) 屬負向指標。

(二) 監測值： $\leq 17.13\%$ 。

指標 2.2.1：各區跨院所降血壓藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率

一、定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：同 ID 降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數。

降血壓藥物(口服)：ATC 前三碼為 C02、C03、C07、C08、C09。

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 9.18\%$ 。

指標 2.2.2：各區跨院所降血脂藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率

一、定義：

(一) 資料範圍：限定西醫基層之降血脂藥物(口服)給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：同 ID 降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數。

降血脂藥物(口服)：ATC 前三碼為 C10。

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 3.17\%$ 。

指標 2.2.3：各區跨院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率

一、定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之降血糖藥物(不分口服及注射)給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：同 ID 降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC 前三碼為 A10。

二、 指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 6.03\%$ 。

指標 2.2.4：各區跨院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率

一、 定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之精神分裂藥物給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：同 ID 精神分裂藥物重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：精神分裂藥物之給藥日數。

精神分裂藥物：ATC 前四碼為 N05A。

二、 指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 4.33\%$ 。

指標 2.2.5：各區跨院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率

一、 定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之憂鬱症藥物給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：同 ID 憂鬱症藥物重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：憂鬱症藥物之給藥日數。

憂鬱症藥物：ATC 前四碼為 N06A。

二、 指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 8.44\%$ 。

指標 2.2.6：各區跨院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率

一、 定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之安眠鎮靜藥物給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：同 ID 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數。

安眠鎮靜藥物：ATC 前四碼為 N05B、N05C。

二、 指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 14.96\%$ 。

指標 2.2.7：各區同院所降血壓藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率

一、 定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥

費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種)。

(二) 公式說明：

分子：同院所、同 ID 降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數。

降血壓藥物(口服)：ATC 前三碼為 C02、C03、C07、C08、C09。

二、 指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 9.18\%$ 。

指標 2.2.8：各區同院所降血脂藥物(口服)-不同處方用藥日數重複率

一、 定義：

(一) 資料範圍：限定西醫基層之降血脂藥物(口服)給藥案件(藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種)。

(二) 公式說明：

分子：同院所、同 ID 降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數。

降血脂藥物(口服)：ATC 前三碼為 C10。

二、 指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 3.17\%$ 。

指標 2.2.9：各區同院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率

一、 定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之降血糖藥物(不分口服及注射)給藥案件(藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種)。

(二) 公式說明：

分子：同院所、同 ID 降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數。

降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC 前三碼為 A10。

二、 指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 6.03\%$ 。

指標 2.2.10：各區同院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率

一、 定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之精神分裂藥物給藥案件(藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種)。

(二) 公式說明：

分子：同院所、同 ID 精神分裂藥物重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：精神分裂藥物之給藥日數。

精神分裂藥物：ATC 前四碼為 N05A。

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 4.33\%$ 。

指標 2.2.11：各區同院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率

一、定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之憂鬱症藥物給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：同院所、同 ID 憂鬱症藥物重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：憂鬱症藥物之給藥日數。

憂鬱症藥物：ATC 前四碼為 N06A。

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 8.44\%$ 。

指標 2.2.12：各區同院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率

一、定義：

(一) 資料範圍：限定為西醫基層之安眠鎮靜藥物給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：同院所、同 ID 安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除 08 案件)。

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數。

安眠鎮靜藥物：ATC 前四碼為 N05B、N05C。

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 14.96\%$ 。

指標 2.3：各區門診平均每張處方箋開藥天數

一、定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：給藥案件之給藥日份加總。

分母：給藥案件數。

二、指標解讀：屬正向指標，監測值 ≥ 4.46 。

指標 2.4：各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

一、定義：

(一) 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋（案件分類=02、04、08 且給藥日份 ≥ 21 ）的案件數。

分母：慢性病給藥案件數（案件分類=02、04、08）。

二、指標解讀：屬正向指標，監測值 $\geq 61.60\%$

指標 2.5：各區處方箋釋出率

一、定義：

（一）資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

（二）公式說明：

分子：處方調劑方式「1」的案件數。

分母：給藥案件數。

二、指標解讀：屬正向指標，監測值 $\geq 25\%$ 。

指標 2.6：各區門診注射劑使用率

一、定義：

（一）資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

（二）公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為 10 碼，且第 8 碼為「2」）案件數。

分母：給藥案件數。

針劑藥品—（醫令代碼為 10 碼，且第 8 碼為「2」）案件數，但排除門診化療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑（排除門診化療：醫令代碼為 37005B,37031B~37041B；急診：案件分類代碼為 02 碼；流感疫苗：案件分類代碼為 D2 碼）。

二、指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 6\%$ 。

指標 2.7：各區門診抗生素使用率

一、定義：

（一）資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。

(二) 公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為 10 碼，且藥理分類前 4 碼 0812）案件數。

分母：給藥案件數。


二、指標解讀：屬負向指標，監測值 $\leq 16\%$ 。

貳、指標值監測結果

指標 2.1：各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率

一、整體趨勢變化：

上呼吸道感染 7 日內複診率，受 H1N1 疫情影響：98 年全年 16.25%，較 97 年 14.00% 微幅上升，但 98 年全年仍低於監測值（17.13%）。




二、分區別比較：

98 年受 H1N1 疫情影響，各分區複診率較 97 年略為上升。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	14.81%	11.55%	15.30%	13.73%	12.76%	13.38%	13.94%
97 年	14.79%	11.80%	15.38%	13.91%	12.74%	14.24%	14.00%
98 年	16.88%	15.74%	18.21%	15.48%	13.71%	16.42%	16.25%

指標 2.2.1：各區跨院所降血壓藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 3.79%，較 97 年 4.08% 低，持續呈現下降趨勢。98 年全年低於監測值（9.18%）。


**二、分區別比較：**

98 年全年各區皆低於監測值且較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	4.24%	4.62%	4.84%	4.70%	4.56%	5.14%	4.59%
97 年	3.78%	3.93%	4.35%	4.10%	4.14%	4.70%	4.08%
98 年	3.57%	3.73%	3.94%	3.79%	3.82%	4.59%	3.79%

指標 2.2.2：各區跨院所降血脂藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 1.26%，較 97 年 1.34% 為低，本指標自 94 年列入監控後，呈平穩下降趨勢。98 年全年低於監測值（3.17%）。


**二、分區別比較：**

98 年全年各區皆低於監測值，除了東區（2.00%）之外，其餘 5 區較 97 年呈平穩或下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	1.71%	1.44%	1.64%	1.34%	1.36%	2.06%	1.55%
97 年	1.44%	1.23%	1.45%	1.22%	1.19%	1.79%	1.34%
98 年	1.35%	1.23%	1.27%	1.17%	1.12%	2.00%	1.26%

指標 2.2.3：各區跨院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 2.41% ，較 97 年 2.56% 為低，本項指標持續呈下降趨勢。98 年全年低於監測值（6.03% ）。

**二、分區別比較：**


98 年全年各區皆低於監測值；且除東區（3.55% ）外，另 5 區呈下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	2.99%	3.09%	2.88%	2.95%	2.80%	3.83%	2.96%
97 年	2.60%	2.61%	2.57%	2.45%	2.45%	3.45%	2.56%
98 年	2.45%	2.59%	2.35%	2.27%	2.27%	3.55%	2.41%

指標 2.2.4：各區跨院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率

一、整體趨勢變化：

98 年全年 3.90% 低於監測值(4.33%)。



二、分區別比較：


98 年全年除臺北區（4.58%）高於監測值外，另 5 區低於監測值。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	3.81%	3.70%	3.93%	4.24%	3.41%	3.48%	3.81%
97 年	3.98%	3.69%	4.06%	3.67%	3.40%	3.37%	3.76%
98 年	4.58%	3.88%	4.13%	3.55%	3.30%	3.96%	3.90%

指標 2.2.5：各區跨院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率

一、整體趨勢變化：

98 年全年 5.01%，較 97 年 5.03%略低，本項指標整體而言趨勢穩定。98 年全年低於監測值（8.44%）。




二、分區別比較：

98 年全年各區皆低於監測值，且其中北區、南區、高屏區呈現下降或平穩趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	5.23%	5.42%	5.62%	4.62%	4.50%	5.29%	5.07%
97 年	5.29%	5.31%	5.76%	4.24%	4.44%	5.27%	5.03%
98 年	5.59%	4.97%	5.77%	4.24%	4.16%	6.07%	5.01%

指標 2.2.6：各區跨院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 10.43%，較 97 年 10.75%略低，本項指標自 94 年開始監控後，整體趨勢變化不大。98 年全年低於監測值（14.96%）。


**二、分區別比較：**

98 年全年各區皆低於監測值；北區、南區、高屏區、東區較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	10.66%	10.86%	11.02%	9.69%	10.27%	11.71%	10.59%
97 年	10.84%	10.86%	10.37%	9.63%	10.47%	11.84%	10.75%
98 年	11.29%	9.67%	11.40%	9.26%	9.26%	11.43%	10.43%

指標 2.2.7：各區同院所降血壓藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 1.41%，較 97 年 1.52% 為低，本項指標整體而言持續呈下降趨勢。98 年全年低於監測值（9.18%）。


**二、分區別比較：**

98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	1.96%	1.70%	1.83%	1.72%	1.61%	1.73%	1.78%
97 年	1.71%	1.30%	1.58%	1.46%	1.41%	1.52%	1.52%
98 年	1.58%	1.29%	1.40%	1.36%	1.30%	1.51%	1.41%

指標 2.2.8：各區同院所降血脂藥物（口服）-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 0.85%，較 97 年 0.91% 為低，本指標自 94 年列入監控後，已較有明顯下降趨勢。98 年全年低於監測值（3.17%）。


**二、分區別比較：**

98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降或平穩趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	1.27%	0.99%	1.14%	0.93%	0.91%	1.27%	1.09%
97 年	1.03%	0.77%	0.99%	0.84%	0.79%	1.11%	0.91%
98 年	0.93%	0.78%	0.87%	0.79%	0.72%	1.18%	0.85%

指標 2.2.9：各區同院所降血糖藥物-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 1.30%，較 97 年 1.39% 為低，本項指標自 94 年起呈下降趨勢。
98 年全年低於監測值（6.03%）。


**二、分區別比較：**

98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降或平穩趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	1.84%	1.61%	1.59%	1.61%	1.36%	1.79%	1.61%
97 年	1.56%	1.27%	1.40%	1.40%	1.21%	1.62%	1.39%
98 年	1.45%	1.33%	1.27%	1.30%	1.12%	1.61%	1.30%

指標 2.2.10：各區同院所抗精神分裂藥物-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 1.67% ，與 97 年相當。98 年全年低於監測值（4.33% ）。

**二、分區別比較：**


98 年全年各區皆低於監測值，且中區、高屏業務組皆較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	1.93%	2.01%	1.91%	2.05%	1.41%	1.84%	1.83%
97 年	1.92%	1.77%	1.88%	1.56%	1.23%	1.63%	1.66%
98 年	1.96%	1.83%	1.86%	1.57%	1.20%	1.74%	1.67%

指標 2.2.11：各區同院所抗憂鬱症藥物-不同處方用藥日數重複率

一、整體趨勢變化：

98 年全年 1.86%，與 97 年 1.86%持平，本指標自 94 年列入監控後，整體呈現下降趨勢。98 年全年低於監測值（8.44%）。




二、分區別比較：

98 年全年各區皆低於監測值；中區、南區業務組皆較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	2.24%	2.27%	2.42%	2.31%	1.19%	2.16%	2.05%
97 年	2.27%	1.78%	2.27%	1.82%	1.11%	2.09%	1.86%
98 年	2.32%	1.84%	2.24%	1.68%	1.14%	2.27%	1.86%

指標 2.2.12：各區同院所安眠鎮靜藥物-不同處方用藥日數重複率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 2.26%，較 97 年 2.47% 低，本指標自 94 年起，整體及各分區均呈現下降趨勢。98 年全年低於監測值（14.96%）。

**二、分區別比較：**


98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	2.90%	2.63%	3.02%	2.76%	2.24%	2.91%	2.75%
97 年	2.72%	2.13%	2.77%	2.43%	2.03%	2.50%	2.47%
98 年	2.58%	2.09%	2.40%	2.22%	1.77%	2.28%	2.26%

指標 2.3：各區門診平均每張處方箋開藥天數

一、整體趨勢變化：

98 年全年 5.7 天，較 97 年 5.65 天為高，本項指標全區皆呈現上升趨勢。
98 年全年高於監測值（4.46 天）。



二、分區別比較：


98 年全年各區皆高於監測值，且較 97 年呈現上升趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	5.31	5.52	5.31	5.51	5.65	6.22	5.45
97 年	5.50	5.71	5.53	5.68	5.85	6.46	5.65
98 年	5.54	5.80	5.59	5.69	5.91	6.51	5.70

指標 2.4：各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

一、整體趨勢變化：

98 年全年 69.62%，較 97 年 68.07% 高，本項指標較 94 年監測初期，呈持續微幅上升趨勢。98 年全年高於監測值（61.6%）。



二、分區別比較：


98 年全年各區皆高於監測值，且較 97 年呈現上升趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	64.47%	62.78%	66.76%	63.52%	72.57%	59.40%	65.83%
97 年	66.59%	64.63%	69.65%	65.90%	74.52%	61.30%	68.07%
98 年	67.94%	66.51%	72.03%	66.95%	75.57%	63.52%	69.62%

指標 2.5：各區處方箋釋出率

一、整體趨勢變化：

98 年全年 30.22%，較 97 年 30.73% 低，但仍高於監測值(25%)。本項監控指標整體趨勢雖尚屬穩定，但全區及各分區業務組均有持續微幅下降情形。




二、分區別比較：

98 年全年除臺北、北區、南區及東區業務組高於監測值範圍外，中區及高屏區低於監測值；另各分區皆較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	36.28%	49.52%	22.93%	35.19%	14.87%	63.35%	31.94%
97 年	34.64%	47.88%	22.35%	33.15%	14.69%	60.79%	30.73%
98 年	34.21%	47.31%	21.80%	32.13%	14.27%	60.46%	30.22%

指標 2.6：各區門診注射劑使用率**一、整體趨勢變化：**

98 年全年 0.87%，較 97 年 0.93% 低，本項指標全區及各分區業務組均持續下降情形。98 年全年低於監測值（6%）。

**二、分區別比較：**


98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	0.90%	1.21%	0.95%	1.01%	1.03%	1.31%	1.01%
97 年	0.88%	1.14%	0.89%	0.93%	0.93%	0.73%	0.93%
98 年	0.80%	1.07%	0.88%	0.85%	0.87%	0.61%	0.87%

指標 2.7：門診抗生素使用率

一、整體趨勢變化：

98 年全年 10.83%，較 97 年 11.01% 低，本項指標整體呈下降或持平趨勢。
98 年全年低於監測值（16%）。



二、分區別比較：

98 年全年各區皆低於監測值，且臺北、中區、高屏區較 97 年呈現下降趨勢。

年度	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組	全局
96 年	12.53%	11.24%	11.20%	10.80%	10.40%	10.72%	11.36%
97 年	11.74%	10.36%	11.19%	10.79%	10.42%	10.34%	11.01%
98 年	11.58%	10.37%	10.78%	10.83%	10.08%	10.36%	10.83%

參、98 年結論

- 一、各區跨院所降血壓藥物（口服）（指標 2.2.1）、降血脂藥物（口服）（指標 2.2.2）、降血糖藥物（口服及注射）（指標 2.2.3）等三項不同處方用藥日數重複率；同院所之降血壓藥物（口服）（指標 2.2.7）、各區跨院所安眠鎮靜藥物（指標 2.2.6）、降血脂藥物（口服）（指標 2.2.8）、降血糖藥物（口服及注射）（指標 2.2.9）、安眠鎮靜藥物（指標 2.2.12）等四項不同處方用藥日數重複率及各區門診注射劑使用率（指標 2.6）等，全區皆低於監測值範圍。
- 二、各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率（指標 2.1）負向指標較 97 年略有上升，但是仍低於監測值範圍；抗精神分裂藥物（指標 2.2.4）負向指標除臺北業務組高於監測值範圍外，其餘仍低於監測值範圍；抗憂鬱症藥物（指標 2.2.5）負向指標全區皆低於監測值範圍。
- 三、各區處方箋釋出率（指標 2.5）正向指標，全區皆高於監測值。
- 四、各區門診平均每張處方箋開藥天數（指標 2.3）、各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比（指標 2.4）正向指標，較 97 年全區皆高於監測值。

98 年全年指標值較前一年升降比較表

指標編號	指標名稱	全局	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組
2.1	各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
2.2.1	各區跨院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2.2.2	各區跨院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	↓	↓	↔	↓	↓	↓	↑
2.2.3	各區跨院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑
2.2.4	各區跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	↑	↑	↑	↑	↓	↓	↑
2.2.5	各區跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	↓	↑	↓	↑	↔	↓	↑
2.2.6	各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	↓	↑	↓	↑	↓	↓	↓
2.2.7	各區同院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2.2.8	各區同院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↑
2.2.9	各區同院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↑
2.2.10	各區同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	↑	↑	↑	↓	↑	↓	↑
2.2.11	各區同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	↔	↑	↑	↓	↓	↑	↑
2.2.12	各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2.3	門診平均每張處方箋開藥天數	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
2.4	各區處方箋釋出率	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
2.5	各區處方箋釋出率	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2.6	各區門診注射劑使用率	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2.7	門診抗生素使用率	↓	↓	↑	↓	↑	↓	↑

【註 1】：↔表示與前期相當，↑表示較前期上升，↓表示較前期下降

98 年全年指標值較監測值比較表

指標編號	指標名稱	全局	臺北業務組	北區業務組	中區業務組	南區業務組	高屏業務組	東區業務組
2.1	各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率	<	<	<	>	<	<	<
2.2.1	各區跨院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.2	各區跨院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.3	各區跨院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.4	各區跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	<	>	<	<	<	<	<
2.2.5	各區跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.6	各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.7	各區同院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.8	各區同院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.9	各區同院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.10	各區同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.11	各區同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.2.12	各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	<	<	<	<	<	<	<
2.3	門診平均每張處方箋開藥天數	>	>	>	>	>	>	>
2.4	各區處方箋釋出率	>	>	>	>	>	>	>
2.5	各區處方箋釋出率	>	>	>	>	>	>	>
2.6	各區門診注射劑使用率	<	<	<	<	<	<	<
2.7	門診抗生素使用率	<	<	<	<	<	<	<

【註】：○表示在監測值範圍，>表示高於監測值範圍，<表示低於監測值範圍

肆、98 年問題分析及各分區業務組採行對策

一、98 年全年監測結果：

指標名稱	指標 正負向	變化 趨勢	相關說明
各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率（指標 2.1）	負向	上升 △	98 年受 H1N1 疫情影響，各分區複診率較 97 年略為上升，但整體仍低於監測值。
各區跨院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.1）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值且較 97 年呈現下降趨勢。
各區跨院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.2）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值，除了東區之外，其餘 5 區較 97 年呈平穩或下降趨勢。
各區跨院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.3）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值；且除東區（3.55%）外，另 5 區呈下降趨勢。
各區跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.4）	負向	上升 △	98 年全年除臺北區略高於監測值外，另 5 區低於監測值，但整體仍低於監測值。
各區跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.5）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值，且其中北區、南區、高屏區呈現下降或平穩趨勢。
各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.6）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值；臺北區、中區、高屏區、東區較 97 年呈現下降趨

指標名稱	指標 正負向	變化 趨勢	相關說明
			勢。
各區同院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.7）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。
各區同院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.8）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。
各區同院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.9）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。
各區同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.10）	負向	持平 ○	98 年全年各區皆低於監測值，且中區、高屏業務組皆較 97 年呈現下降趨勢。
各區同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.11）	負向	持平 ○	98 年全年各區皆低於監測值；中區、南區業務組皆較 97 年呈現下降趨勢。
各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率（指標 2.2.12）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。
門診平均每張處方箋開藥天數（指標 2.3）	正向	上升 ○	98 年全年各區皆高於監測值，且較 97 年呈現上升趨勢。
各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比（指標 2.4）	正向	上升 ○	98 年全年各區皆高於監測值，且較 97 年呈現上升趨勢。
各區處方箋釋出率（指標 2.5）	正向	下降 △	98 年全年除臺北、北區、南區及東區業務組高於監測值外，東

指標名稱	指標 正負向	變化 趨勢	相關說明
			區及高屏區低於監測值；且較 97 年呈現下降趨勢。
各區門診注射劑使用率（指標 2.6）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。
門診抗生素使用率（指標 2.7）	負向	下降 ○	98 年全年各區皆低於監測值，且較 97 年呈現下降趨勢。

註：「○」表該項專業醫療服務品質提升

「●」表該項專業醫療服務品質下降

「△」表該項專業醫療服務品質，整體而言符合監測範圍，但有部分分區未符合監測範圍。

二、 各分區業務組採行對策

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.1：各區同院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率	中區業務組： 對策： 1.每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於 VPN 分科管理專區供參。 2.加強宣導經由 VPN 查詢醫療品質指標之操作，持續透過 VPN 回饋院所上呼吸道感染病人 7 日內複診率資訊，促請診所自我管理。 3.函請品質指標值高於科別 85 百分位(含) 之診所改善，並持續追蹤未改善者予以加強審查與資訊回饋。 成效：本項指標值由 97 年 15.38%至 98 年第 3 季降為 13.62%已有改善，惟 98 年第 4 季受 H1N1 疫情影響，以致複診率增加。 東區業務組： 對策：提東區西醫基層共管會議報告，持續注意。 成效：98 年 q4 受 H1N1 疫情影響，指標 20.79%，高於監測值，但年度指標 16.42%仍低於監測值。 北區業務組： 對策： 1.設定 $\leq 17.13\%$ 為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3.專業醫療服務品質與她區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 成效：98 年指標值 15.74%較監測值(17.13%)低，且

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.1： 各區跨院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	較全局平均值(16.25%)低。 中區業務組： 對策： 1.每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於 VPN 分科管理專區供參。 2.用藥日數重複率係以「同院所」指標為輔導標的，「跨院所」部份則加強宣導健保 IC 卡第二階段存放內容之登錄上傳作業，以減少跨院重複領藥之情況。 3.持續透過 VPN 回饋院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率資訊，促請診所自我管理。 成效：本項指標值由 97 年 4.35%至 98 年降為 3.94% 已有改善。 東區業務組： 對策：提東區西醫基層共管會議報告，加強同院所用藥日數重複之管控。 成效：1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 2.00%，較 97 年 3.45%，略增 0.21%。 北區業務組： 對策： 1.設定$\leq 9.18\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.2： 各區跨院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	3.專業醫療服務品質與她區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 成效：98 年指標值 3.73%較監測值 9.18%低，較 97 年指標值(3.93%)下降 0.2%。 中區業務組： 對策： 1.每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於 VPN 分科管理專區供參。 2.用藥日數重複率係以「同院所」指標為輔導標的，「跨院所」部份則加強宣導健保 IC 卡第二階段存放內容之登錄上傳作業，以減少跨院重複領藥之情況。 3.持續透過 VPN 回饋院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率資訊，促請診所自我管理。 成效：本項指標值由 97 年 1.45%至 98 年降為 1.27%已有改善。 東區業務組： 對策：提東區西醫基層共管會議報告，加強同院所用藥日數重複之管控。 成效：1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 2.00%，較 97 年 1.79%，降低 0.11% 北區業務組： 對策：

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.3： 各區跨院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率	1.設定$\leq 3.17\%$為監測值。 2. 持續透過VPN電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3.專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 成效：98 年指標值 1.23%較監測值(3.17%)低，較 97 年指標值(1.23%)持平 中區業務組： 對策： 1.每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於VPN分科管理專區供參。 2.用藥日數重複率係以「同院所」指標為輔導標的，「跨院所」部份則加強宣導健保IC卡第二階段存放內容之登錄上傳作業，以減少跨院重複領藥之情況。 3.持續透過VPN回饋院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率資訊，促請診所自我管理。 成效：本項指標值由 97 年 2.57%至 98 年降為 2.35%已有改善，且低於全局平均值（2.41%）。 東區業務組： 對策：提東區西醫基層共管會議報告，加強同院所用藥日數重複之管控。 成效：

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.4： 各區抗精神分裂藥物 不同處方用藥日數重 複率	1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 3.55%，較 97 年 3.45%，略增 0.10%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq 6.03\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3.專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 成效：98 年指標值 2.59%較監測值(3.06%)低，較 97 年指標值(2.61%)下降 0.02%。 臺北業務組： 對策： 1.發函回饋98年全年抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複偏高個案名單(25 名)就醫院所，請院所依專業判斷，協助輔導病患正確就醫，避免重複用藥，確保用藥安全。 2.續追蹤「各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率」偏高院所申報狀況。 中區業務組： 對策： 1.每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於 VPN 分科管理專區供參。

指標名稱	各分局採行對策
	2.用藥日數重複率係以「同院所」指標為輔導標的，「跨院所」部份則加強宣導健保 IC 卡第二階段存放內容之登錄上傳作業，以減少跨院重複領藥之情況。 3.持續透過 VPN 回饋院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率資訊，促請診所自我管理。 成效： 本項監控指標已逐季下降，且符合監測值標準(監測值 4.33%，本業務組 4.13%)。 東區業務組： 對策：提東區西醫基層共管會議報告，加強同院所用藥日數重複之管控。 成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 3.96%，較 97 年 3.37%，略增 0.59%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq 4.33\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3.專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 成效：98 年指標值 3.88%較監測值(4.33%)低，較全局指標值(3.90%)低。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.5： 各區跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	中區業務組： 對策： 1.每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於 VPN 分科管理專區供參。 2.用藥日數重複率係以「同院所」指標為輔導標的，「跨院所」部份則加強宣導健保 IC 卡第二階段存放內容之登錄上傳作業，以減少跨院重複領藥之情況。 3.持續透過 VPN 回饋院所憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率資訊，促請診所自我管理。 成效： 本項監控指標已逐季下降，且符合監測值標準（監測值 8.44%，本業務組 5.77%）。 東區業務組： 對策：提東區西醫基層共管會議報告，加強同院所用藥日數重複之管控。 成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 6.07%，較 97 年 5.27%，增加 0.8%。 北區業務組： 對策： 1. 設定 $\leq 8.44\%$ 為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3.專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.6： 各區跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	成效：98 年指標值 4.97%較監測值(8.44%)低，較全局指標值(5.31%)下降 0.34%。 中區業務組： 對策： 1.每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於 VPN 分科管理專區供參。 2.用藥日數重複率係以「同院所」指標為輔導標的，「跨院所」部份則加強宣導健保 IC 卡第二階段存放內容之登錄上傳作業，以減少跨院重複領藥之情況。 3.持續透過 VPN 回饋院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率資訊，促請診所自我管理。 成效： 本項監控指標已符合監測值標準(監測值 14.96%，業務組 11.40%)。 東區業務組： 對策：提東區西醫基層共管會議報告，加強同院所用藥日數重複之管控。 成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 11.43%，較 97 年 11.84%，降低 0.41%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq 14.96\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.7： 各區同院所降血壓藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3.專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 成效：98 年指標值 9.67%較監測值(14.96%)低，較全局指標值(10.86%)下降 1.19%。 中區業務組： 對策： 1.每月定期寄發「基層總額醫療專業服務品質指標回饋單」予指標表現異常診所，提供高於中區同儕 85 百分位之院所名單予科召集人，請予以瞭解並協助輔導。 2.對於用藥日數重複率$\geq$p90 之診所，立意抽審重複用藥個案。 成效： 1.本項指標值由 97 年 1.58%至 98 年降為 1.40%已有改善。 2.輔導家次 118 家，改善家次 118 家，改善率 100%。 東區業務組： 對策：1.提東區西醫基層共管會議報告，指標前 10 名，請東區委員會協助院所輔導。 2.抽審院所指標項目，加強抽審。 成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 1.18%，較 97 年 1.52%，略增 0.07%。 北區業務組： 對策：

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.8： 各區同院所降血脂藥物（口服）不同處方用藥日數重複率	1. 設定$\leq 9.18\%$為監測值。 2. 持續透過VPN電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 1.29%較監測值(9.18%)低，較全局指標值(1.30%)下降 0.01%。 中區業務組： 對策： 1. 每月定期寄發「基層總額醫療專業服務品質指標回饋單」予指標表現異常診所，提供高於中區同儕 85 百分位之院所名單予科召集人，請予以瞭解並協助輔導。 2. 對於用藥日數重複率$\geq p90$之診所，立意抽審重複用藥個案。 成效： 1. 本項指標值由 97 年 0.99%至 98 年降為 0.87%已有改善。 2. 輔導家次 13 家，改善家次 13 家，改善率 100%。 東區業務組： 對策：1. 提東區西醫基層共管會議報告，指標前 10 名，請東區委員會協助院所輔導。 2. 抽審院所指標項目，加強抽審。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.9： 各區同院所降血糖藥物（口服及注射）不同處方用藥日數重複率	成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 1.51%，較 97 年 1.11%，略增 0.07%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq 3.17\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3.專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 0.78%較監測值(3.17%)低，較全局指標值(0.85%)低。 中區業務組： 對策： 1.每月定期寄發「基層總額醫療專業服務品質指標回饋單」予指標表現異常診所，提供高於中區同儕 85 百分位之院所名單予科召集人，請予以瞭解並協助輔導。 2.對於用藥日數重複率$\geq p90$之診所，立意抽審重複用藥個案。 成效： 1.本項指標值由 97 年 1.40%至 98 年降為 1.27%已有改善，且低於全局平均值（1.30%）。 2.輔導家次 27 家，改善家次 27 家，改善率 100%。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.10： 各區同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	東區業務組： 對策：1.提東區西醫基層共管會議報告，指標前 10 名，請東區委員會協助院所輔導。 2.抽審院所指標項目，加強抽審。 成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 1.61%，較 97 年 1.62%，略降 0.01%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq 6.03\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3.專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 1.33%較監測值(6.03%)低。 中區業務組： 對策： 1.每月定期寄發「基層總額醫療專業服務品質指標回饋單」予指標表現異常診所，提供高於中區同儕 85 百分位之院所名單予科召集人，請予以瞭解並協助輔導。 2.對於用藥日數重複率$\geq p90$之診所，立意抽審重複用藥個案。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.11： 各區同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	成效： 1.本項指標值由 97 年 1.88%至 98 年降為 1.86% 已有改善。 2.輔導家次 9 家，改善家次 9 家，改善率 100%。 東區業務組： 對策：1.提東區西醫基層共管會議報告，指標前 10 名，請東區委員會協助院所輔導。 2.抽審院所指標項目，加強抽審。 成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 1.74%，較 97 年 1.63%，略增 0.11%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq 4.33\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 1.83%較監測值(4.33%)低。 中區業務組： 對策： 1.每月定期寄發「基層總額醫療專業服務品質指標回饋單」予指標表現異常診所，提供高於中區同儕 85 百分位之院所名單予科召集人，請

指標名稱	各分局採行對策
	予以瞭解並協助輔導。 2.對於用藥日數重複率$\geq$p90 之診所，立意抽審重複用藥個案。 成效： 1.本項指標值由 97 年 2.27%至 98 年降為 2.24% 已有改善。 2.輔導家次 16 家，改善家次 16 家，改善率 100%。 東區業務組： 對策：1.提東區西醫基層共管會議報告，指標前 10 名，請東區委員會協助院所輔導。 2.抽審院所指標項目，加強抽審。 成效： 1.98 年各季均在指標值範圍內。 2.98 年度指標 2.27%，較 97 年 2.09%，略增 0.18%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq$8.44%為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 1.84%較監測值(8.44%)低，較全局平均值 1.86%低。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.2.12： 各區同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	中區業務組： 對策： 1.每月定期寄發「基層總額醫療專業服務品質指標回饋單」予指標表現異常診所，提供高於中區同儕 85 百分位之院所名單予科召集人，請予以瞭解並協助輔導。 2.對於用藥日數重複率$\geq$p90 之診所，立意抽審重複用藥個案。 成效： 1.本項指標值由 97 年 2.77%至 98 年降為 2.40% 已有改善。 2.輔導家次 121 家，改善家次 121 家，改善率 100%。 東區業務組： 對策：1.提東區西醫基層共管會議報告，指標前 10 名，請東區委員會協助院所輔導。 2.抽審院所指標項目，加強抽審。 成效： 1.98 年各季均在指標值範圍內。 2.98 年度指標 2.28%，較 97 年 2.50%，下降 0.22%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq$14.96%為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.3： 平均每張處方箋開藥 天數	4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 2.09%較監測值(14.96%)低，較 97 年指標值(2.13%)下降 0.04%。 中區業務組： 對策： 每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於 VPN 分科管理專區供參。 成效：本項指標值由 97 年 5.53 天至 98 年增為 5.59 天。 東區業務組： 對策：提東區西醫基層共管會議報告。 成效： 1.98 年各季均全局最高，且逐季逐年成長。 2.98 年度指標 6.51，較 97 年 6.46，增加 0.05 天。 北區業務組： 對策： 1. 設定 4.46%為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 成效：98 年指標值 5.80 較監測值(4.46)高，較 97 年指標值(5.71)上升 0.09。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.4： 開立慢性病連續處方箋百分比	中區業務組： 1.請中區委員會共同宣導，另提供彰化縣衛生局 97 年第 3、4 季及 98 年第 1 季各衛生所慢性病開立慢性病連續處方箋百分比數值，協助督促提升各衛生所慢性病連續處方箋。 2.配合本分局文宣活動時加發文宣單張予保險對象，以及在網頁上宣導使用慢性病連續處方箋的好處。 成效： 本項指標值由 97 年 69.65%至 98 年增為 72.03%已有改善，且高於全局平均值（67.94%）。 東區業務組： 對策：1.提東區西醫基層共管會議報告，請東區委員會協助院所輔導。 2.藉各種宣導場合，向民眾宣導慢性病連續處方箋。 成效： 1.98 年各季均較 97 年各季成長，且逐季逐年成長。 2.98 年度指標 63.52%，較 97 年 61.30%，增加 2.22%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\geq 61.6\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.5： 處方箋釋出率	4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 66.51%較監測值(61.6%)高，較 97 年指標值(64.63%)上升 1.88%。 中區業務組： 對策： 1.每月監測品質指標相關資料，定期於西醫基層總額共管會議提報分析結果，並公布於 VPN 分科管理專區供參。 2.針對申報醫師親自調劑比率 > 10%、緊急調劑比率偏高之診所函請改善，並移請中區委員會協助輔導正確申報。 成效： 輔導家次 4 家，改善家次 4 家，改善率 100%，惟因診所自聘藥事人員比率漸增(9801 為 59.1% 至 9812 增為 65.7%)，對策成效較難彰顯。 東區業務組： 成效： 1.98 年各季均為全局最高。 2.98 年度指標 60.46%，較 97 年 60.79%，降低 0.33%。 北區業務組： 對策： 1. 設定 $\geq 25\%$ 為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.6： 各區門診注射劑使用率	局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 47.31%較監測值(25%)高，較全局平均值(30.22%)高。 高屏業務組： 對策： 本業務組西醫基層處方箋釋出率歷年來均較其他分區低，主因為西醫診所交付調劑屬門診藥局者，前因其支付金額較高，故嚴控該型態之處方交付。近年來，本分區開立慢箋數量持續增加(98 年較 97 年增加 78106 件)，成長率達 12.4%，該類處方係由患者自行決定其第 2、3 次調劑處所，合理上亦應將該類案件計入處方箋釋出率。 為達本項品質指標監測值，98 年本業務組執行數項策略如下： 一、 針對醫師兼具藥師資格申報親自調劑者，輔導交付處方。 二、 不定期進行藥事人員在班訪查，輔導院所於藥事人員不在班時段應交付處方。 三、 每月監測澎湖馬公地區診所處方釋出率(目前協商釋出率為 30%)。 中區業務組： 對策： 1.持續透過 VPN 回饋院所注射劑使用率資訊，促請診所自我管理。 2.函請品質指標值指標值之診所改善，並持續追蹤未改善者予以加強審查。 成效： 1.本項監控指標已逐季下降，指標值由 97 年 0.89%

指標名稱	各分局採行對策
指標 2.7： 各區門診抗生素使用率	至 98 年降為 0.88%。 2.輔導家次 55 家，改善家次 55 家，改善率 100%。 東區業務組： 對策：1.提東區西醫基層共管會議報告，指標前 10 名，請東區委員會協助院所輔導。 2.每月前二名，列入抽審院所條件，加強抽審。 成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 0.61%，較 97 年 0.73%，降低 0.12%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq 6\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 1.07%較監測值(6%)高，較 97 年指標值(1.14%)下降 0.07%。 中區業務組： 對策： 1.持續透過 VPN 回饋院所抗生素使用率資訊，促請診所自我管理。 2.函請品質指標值指標值之診所改善，並持續追蹤未改善者予以加強審查。 成效：

指標名稱	各分局採行對策
	1.本項監控指標已逐季下降，指標值由 97 年 11.19%至 98 年降為 10.78%，且低於全局平均值（10.83%）。 2.輔導家次 108 家，改善家次 108 家，改善率 100%。 東區業務組： 對策：1.提東區西醫基層共管會議報告，指標前 10 名，請東區委員會協助院所輔導。 2.每月前二名，列入抽審院所條件，加強抽審。 成效： 1.98 年各季均在監測值範圍內。 2.98 年度指標 10.36%，較 97 年 10.34%，增加 0.02%。 北區業務組： 對策： 1. 設定$\leq 16\%$為監測值。 2. 持續透過 VPN 電子資料交換區回饋品質報告卡資訊，針對診所「監測值」、「全局平均值」及「分局平均值」實績不佳之項目予以標記，請診所加強自我管理。 3. 專業醫療服務品質與他區比較結果，於北區分局西醫基層總額聯繫會議中報告，請各縣市代表與醫師公會協助宣導。 4. 開發西醫基層總額同院所不同處方用藥日數重複率重點審查表及標記樣本輔導專業審查。 成效：98 年指標值 10.37%較監測值(16%)高，較 97 年指標值(10.36%)下降 0.01%。

附 表

指標2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
97年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	116,751	38,346	77,414	52,450	53,449	8,378	346,788
	上呼吸道感染人次	833,694	345,674	513,653	386,400	434,212	63,914	2,577,547
	上呼吸道感染病人7日內複診率	14.00%	11.09%	15.07%	13.57%	12.31%	13.11%	13.45%
97年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	86,711	27,687	47,673	32,461	33,089	6,149	233,770
	上呼吸道感染人次	589,780	242,103	325,084	244,996	273,450	43,664	1,719,077
	上呼吸道感染病人7日內複診率	14.70%	11.44%	14.66%	13.25%	12.10%	14.08%	13.60%
97年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	71,182	23,139	37,995	27,737	31,997	4,983	197,033
	上呼吸道感染人次	520,966	217,135	284,276	225,685	276,798	37,305	1,562,165
	上呼吸道感染病人7日內複診率	13.66%	10.66%	13.37%	12.29%	11.56%	13.36%	12.61%
97年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	166,581	56,982	100,783	70,405	71,900	11,340	477,991
	上呼吸道感染人次	1,039,396	434,033	592,372	458,454	510,603	71,716	3,106,574
	上呼吸道感染病人7日內複診率	16.03%	13.13%	17.01%	15.36%	14.08%	15.81%	15.39%
97年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	441,225	146,154	263,865	183,053	190,435	30,850	1,255,582
	上呼吸道感染人次	2,983,836	1,238,945	1,715,385	1,315,535	1,495,063	216,599	8,965,363
	上呼吸道感染病人7日內複診率	14.79%	11.80%	15.38%	13.91%	12.74%	14.24%	14.00%
98年第1季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	128,673	45,939	79,222	54,039	53,517	9,837	371,227
	上呼吸道感染人次	816,941	352,063	477,894	367,130	400,814	63,886	2,478,128
	上呼吸道感染病人7日內複診率	15.76%	13.05%	16.58%	14.72%	13.35%	15.40%	14.88%
98年第2季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	131,557	45,385	69,258	49,602	47,327	9,507	352,636
	上呼吸道感染人次	861,182	363,047	453,713	355,532	373,780	63,872	2,471,126
	上呼吸道感染病人7日內複診率	15.28%	12.50%	15.26%	13.95%	12.66%	14.88%	14.27%
98年第3季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	76,390	26,366	41,434	29,695	30,451	4,624	208,960
	上呼吸道感染人次	549,502	229,999	304,325	233,118	267,030	36,197	1,620,171
	上呼吸道感染病人7日內複診率	13.90%	11.46%	13.62%	12.74%	11.40%	12.77%	12.90%
98年第4季	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	195,237	97,195	142,329	81,530	76,628	14,037	606,956
	上呼吸道感染人次	922,901	420,417	588,311	432,079	474,780	67,509	2,905,997
	上呼吸道感染病人7日內複診率	21.15%	23.12%	24.18%	18.87%	16.14%	20.79%	20.89%
98年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	531,857	214,885	332,243	214,866	207,923	38,005	1,539,779
	上呼吸道感染人次	3,149,926	1,365,526	1,824,243	1,387,859	1,516,404	231,464	9,475,422
	上呼吸道感染病人7日內複診率	16.88%	15.74%	18.21%	15.48%	13.71%	16.42%	16.25%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層門診案件，以龍款取得一個費用年月為資料範圍計算之。

上呼吸道感染（主診斷前三碼為'460','462','465','487'）案件。

3.公式說明：

分子：該院所、同院所。計算同上呼吸道感染於同一院所、二次就醫日期小於7日之人次。

分母：該院所、同院所。計算院所上呼吸道感染人次。

4.資料編製日期：98年04月28日

5.製表單位：醫審及藥材組

指標 2.2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	基隆	中區	南區	高雄	東區	小計
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	658,744	343,238	606,481	492,241	580,926	99,169	2,780,799
	降血壓(口服)之給藥日數	15,580,667	7,986,458	12,430,642	10,647,955	12,665,931	1,967,527	61,279,180
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.23%	4.30%	4.88%	4.62%	4.58%	5.04%	4.54%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	569,768	304,719	523,318	416,879	509,632	91,533	2,415,849
	降血壓(口服)之給藥日數	15,305,597	7,869,163	12,180,198	10,351,114	12,482,615	1,928,417	60,117,104
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.72%	3.87%	4.30%	4.03%	4.08%	4.75%	4.02%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	531,753	288,646	495,209	395,887	492,199	84,302	2,287,996
	降血壓(口服)之給藥日數	15,268,830	7,882,880	12,211,619	10,403,058	12,677,862	1,908,487	60,352,736
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.48%	3.66%	4.06%	3.81%	3.88%	4.42%	3.79%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	607,119	335,358	546,547	434,996	534,588	95,228	2,553,836
	降血壓(口服)之給藥日數	16,397,729	8,623,053	13,072,458	11,039,007	13,372,312	2,067,618	64,572,177
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.70%	3.89%	4.18%	3.94%	4.00%	4.61%	3.96%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	2,367,384	1,271,961	2,171,555	1,740,003	2,117,345	370,232	10,038,480
	降血壓(口服)之給藥日數	62,552,823	32,361,554	49,894,917	42,441,134	51,198,720	7,872,049	245,321,197
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.78%	3.93%	4.35%	4.10%	4.14%	4.70%	4.08%
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	647,853	357,474	570,935	463,211	559,562	100,246	2,699,281
	降血壓(口服)之給藥日數	16,250,815	8,667,607	13,082,227	10,972,119	13,371,958	2,061,252	64,405,878
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.99%	4.12%	4.36%	4.22%	4.18%	4.86%	4.19%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	569,944	329,518	508,674	407,659	504,528	96,884	2,417,307
	降血壓(口服)之給藥日數	16,364,120	8,753,748	13,215,275	11,030,674	13,632,632	2,077,500	65,073,849
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.48%	3.76%	3.85%	3.70%	3.70%	4.67%	3.71%
98年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	540,307	300,512	485,019	393,809	497,553	88,306	2,305,506
	降血壓(口服)之給藥日數	16,344,858	8,766,152	13,289,880	11,102,611	13,908,202	2,029,647	65,441,450
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.31%	3.43%	3.65%	3.55%	3.58%	4.35%	3.52%
98年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	604,166	337,169	552,469	436,540	556,815	96,193	2,583,352
	降血壓(口服)之給藥日數	17,195,721	9,286,319	14,208,180	11,743,398	14,599,539	2,148,184	69,181,341
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.51%	3.63%	3.89%	3.72%	3.81%	4.48%	3.73%
98年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	2,362,270	1,324,673	2,117,097	1,701,219	2,118,458	381,729	10,005,446
	降血壓(口服)之給藥日數	66,155,814	35,473,826	53,795,562	44,848,802	55,512,331	8,316,583	264,102,718
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.57%	3.73%	3.94%	3.79%	3.82%	4.58%	3.79%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種)。

3.公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)×(排除不同處方之給藥日期與給藥日數間有重複之給藥日數)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前二碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

4.資料匯取日期：98年04月28日

5.製表單位：醫藥及藥材組。

指標 2.2.2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	基隆	中區	南區	高雄	東區	小計
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	47,979	17,640	27,956	29,488	22,822	5,072	141,957
	降血脂(口服)之給藥日數	2,932,093	1,334,233	1,623,818	1,548,315	1,667,223	280,739	9,386,421
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.64%	1.32%	1.72%	1.92%	1.37%	1.81%	1.51%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	42,799	17,209	24,978	19,897	20,714	5,817	131,414
	降血脂(口服)之給藥日數	3,027,252	1,458,472	1,780,144	1,592,855	1,783,524	322,315	9,964,582
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.41%	1.18%	1.40%	1.25%	1.16%	1.80%	1.32%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	45,141	18,237	26,789	19,559	21,477	5,274	136,477
	降血脂(口服)之給藥日數	3,238,647	1,530,930	1,909,502	1,681,026	1,884,067	306,425	10,550,597
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.19%	1.40%	1.16%	1.14%	1.72%	1.29%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	46,226	20,425	26,085	20,689	22,299	5,933	141,657
	降血脂(口服)之給藥日數	3,448,593	1,651,813	1,975,198	1,768,690	1,982,994	328,328	11,155,616
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.24%	1.32%	1.17%	1.12%	1.81%	1.27%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	182,145	73,511	105,808	80,633	87,312	22,096	551,505
	降血脂(口服)之給藥日數	12,646,585	5,975,448	7,288,662	6,590,886	7,317,808	1,237,807	41,057,196
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.23%	1.45%	1.22%	1.19%	1.79%	1.34%
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	52,718	23,419	27,733	23,219	25,838	6,366	159,293
	降血脂(口服)之給藥日數	3,452,819	1,656,397	1,915,328	1,787,512	2,026,282	332,837	11,171,175
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.41%	1.45%	1.30%	1.28%	1.91%	1.43%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	47,688	21,214	25,744	22,261	22,589	7,755	147,251
	降血脂(口服)之給藥日數	3,675,316	1,776,334	2,064,582	1,954,190	2,180,383	379,598	12,030,403
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.19%	1.25%	1.14%	1.04%	2.04%	1.22%
98年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	49,551	21,612	25,208	22,303	23,654	7,205	149,533
	降血脂(口服)之給藥日數	3,806,084	1,786,893	2,147,635	2,008,132	2,252,271	366,056	12,367,071
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.30%	1.21%	1.17%	1.11%	1.05%	1.97%	1.21%
98年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	50,134	20,257	28,457	23,965	27,335	7,647	157,795
	降血脂(口服)之給藥日數	3,930,027	1,838,378	2,279,075	2,114,906	2,445,320	368,733	12,976,439
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.28%	1.10%	1.25%	1.13%	1.12%	2.07%	1.22%
98年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	200,091	86,502	107,142	91,748	99,416	28,973	613,872
	降血脂(口服)之給藥日數	14,854,246	7,058,002	8,406,620	7,864,740	8,904,256	1,447,224	48,545,088
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.35%	1.23%	1.27%	1.17%	1.12%	2.00%	1.26%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方

調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重複之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前二碼=C10)

4. 資料匯取日期：98年04月28日

5. 製表單位：醫事及藥材組

指標2.2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	136,705	68,546	114,252	103,990	117,277	25,124	565,894
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,711,202	2,447,372	4,002,376	3,826,883	4,340,102	684,022	20,011,957
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.90%	2.80%	2.85%	2.72%	2.70%	3.67%	2.83%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	123,837	65,646	103,090	94,602	108,201	23,370	518,746
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,793,117	2,521,516	4,108,739	3,872,954	4,406,436	685,852	20,388,614
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.58%	2.60%	2.51%	2.44%	2.46%	3.41%	2.54%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	122,118	65,723	105,018	92,949	105,453	22,791	514,052
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,850,000	2,635,687	4,238,501	3,963,365	4,522,762	689,367	20,999,682
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.47%	2.49%	2.48%	2.35%	2.33%	3.31%	2.45%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	126,917	71,781	106,920	93,210	108,784	24,826	532,438
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,162,943	2,804,552	4,364,975	4,048,159	4,685,009	726,660	21,772,298
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.46%	2.56%	2.45%	2.30%	2.33%	3.42%	2.45%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	509,577	271,696	429,280	394,751	439,715	96,111	2,131,130
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,617,262	10,409,127	16,714,591	15,711,361	17,934,309	2,785,901	83,172,551
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.60%	2.61%	2.57%	2.45%	2.45%	3.45%	2.56%
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	138,267	80,140	112,472	99,582	116,106	25,757	572,324
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,027,177	2,758,802	4,281,500	3,949,809	4,582,114	712,505	21,311,907
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.75%	2.90%	2.63%	2.52%	2.53%	3.61%	2.69%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	126,924	76,982	104,803	92,831	106,949	26,072	534,561
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,235,775	2,891,038	4,454,833	4,106,134	4,791,277	737,088	22,216,145
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.42%	2.66%	2.35%	2.26%	2.23%	3.54%	2.41%
98年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	124,151	71,903	101,488	92,360	105,329	26,159	521,390
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,347,262	2,992,390	4,588,014	4,192,673	4,927,866	731,597	22,779,802
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.32%	2.40%	2.21%	2.20%	2.14%	3.58%	2.29%
98年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	126,244	73,392	104,400	89,689	111,420	25,947	531,092
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,442,628	3,041,322	4,685,943	4,264,825	5,039,760	750,284	23,224,762
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.32%	2.41%	2.23%	2.10%	2.21%	3.46%	2.29%
98年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)	515,588	302,417	423,163	374,462	439,804	103,935	2,159,367
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	21,052,842	11,683,552	18,010,290	16,513,441	19,341,017	2,931,474	89,532,616
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.45%	2.59%	2.35%	2.27%	2.27%	3.55%	2.41%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有西醫基層總額之門診給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、0其中一種)。

3.公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(抽08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重複之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前二碼=A10)

4.資料擷取日期：98年04月29日

5.製表單位：醫事及藥材組

指標 2.2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	21,789	11,295	28,161	21,124	23,082	1,465	106,896
	精神分裂藥物之給藥日數	554,711	323,532	726,626	536,002	689,045	47,599	2,877,515
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.93%	3.49%	3.88%	3.94%	3.35%	3.08%	3.71%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	19,628	12,529	28,329	17,477	21,425	1,502	100,890
	精神分裂藥物之給藥日數	491,332	328,116	685,824	478,977	639,215	44,478	2,667,942
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.99%	3.82%	4.13%	3.65%	3.35%	3.38%	3.78%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	19,423	12,281	29,304	16,876	22,985	1,636	102,505
	精神分裂藥物之給藥日數	500,485	337,255	702,970	486,148	675,400	42,540	2,744,798
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.88%	3.64%	4.17%	3.47%	3.40%	3.85%	3.73%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	22,726	13,619	30,323	17,753	24,281	1,304	110,006
	精神分裂藥物之給藥日數	550,750	359,862	745,509	494,770	697,781	40,743	2,889,415
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.13%	3.78%	4.07%	3.59%	3.48%	3.20%	3.81%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	83,566	49,724	116,117	73,230	91,753	5,907	420,297
	精神分裂藥物之給藥日數	2,097,278	1,348,765	2,860,929	1,995,897	2,701,441	175,360	11,179,670
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.98%	3.69%	4.06%	3.67%	3.40%	3.37%	3.78%
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	25,381	14,440	32,818	18,007	23,998	1,920	116,564
	精神分裂藥物之給藥日數	593,428	380,309	770,971	495,393	716,300	43,635	3,000,036
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.28%	3.80%	4.26%	3.63%	3.35%	4.40%	3.89%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	24,687	14,932	31,006	17,849	23,766	1,730	113,970
	精神分裂藥物之給藥日數	594,372	387,583	753,759	492,603	726,774	42,041	2,997,132
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.15%	3.85%	4.11%	3.62%	3.27%	4.12%	3.80%
98年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	28,864	16,284	31,030	17,509	23,888	1,587	119,142
	精神分裂藥物之給藥日數	620,736	401,685	756,256	497,908	734,831	42,774	3,054,190
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.65%	4.05%	4.10%	3.52%	3.25%	3.71%	3.90%
98年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	34,664	16,248	32,942	18,315	24,487	1,770	128,426
	精神分裂藥物之給藥日數	669,950	424,491	810,544	534,242	732,081	48,302	3,219,610
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	5.17%	3.83%	4.06%	3.43%	3.34%	3.66%	3.99%
98年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	113,596	61,904	127,796	71,680	96,119	7,007	478,102
	精神分裂藥物之給藥日數	2,478,486	1,594,068	3,091,530	2,020,146	2,909,986	176,752	12,270,968
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.58%	3.88%	4.13%	3.55%	3.30%	3.96%	3.90%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（無費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、5其中一種）。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重複之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=005A)

4. 資料擷取日期：98年04月28日

5. 製表單位：醫管及藥材組

指標2.2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	基隆	中區	南區	高雄	東區	小計
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	57,612	28,438	73,340	40,264	56,330	5,205	261,189
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,102,765	530,330	1,257,002	904,181	1,220,008	111,066	5,125,352
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.22%	5.36%	5.83%	4.45%	4.62%	4.69%	5.10%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	60,008	31,194	76,656	34,864	55,317	5,731	263,770
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,141,482	585,886	1,301,120	876,749	1,258,187	112,150	5,275,574
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.26%	5.32%	5.89%	3.98%	4.40%	5.11%	5.00%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	64,698	33,094	76,182	39,960	57,634	5,607	277,175
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,218,709	630,378	1,345,972	937,406	1,312,818	109,212	5,554,495
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.31%	5.25%	5.66%	4.26%	4.39%	5.13%	4.99%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	71,377	36,598	80,865	42,649	60,320	7,309	299,118
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,328,391	690,670	1,429,188	997,706	1,377,420	120,129	5,943,504
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.37%	5.30%	5.66%	4.27%	4.38%	6.08%	5.03%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	253,695	129,324	307,043	157,737	229,601	23,852	1,101,252
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,791,347	2,437,264	5,333,282	3,716,042	5,168,433	452,557	21,898,925
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	5.31%	5.76%	4.24%	4.44%	5.27%	5.03%
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	73,290	35,281	83,114	44,243	61,988	8,817	306,733
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,330,524	694,049	1,392,237	963,794	1,374,723	123,131	5,878,452
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.51%	5.08%	5.97%	4.59%	4.51%	7.16%	5.22%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	77,551	35,956	84,861	44,415	62,211	7,640	312,634
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,405,460	732,841	1,478,318	1,039,301	1,465,327	124,187	6,245,434
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.52%	4.91%	5.74%	4.27%	4.25%	6.15%	5.01%
98年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	82,980	39,422	85,741	43,085	60,883	7,240	319,351
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,482,902	789,899	1,504,012	1,062,010	1,525,996	125,192	6,490,011
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.60%	4.99%	5.70%	4.06%	3.99%	5.78%	4.92%
98年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	89,952	41,115	89,474	46,358	63,167	7,068	337,134
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,575,409	834,951	1,574,715	1,138,066	1,606,343	134,257	6,863,741
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.71%	4.92%	5.68%	4.07%	3.93%	5.26%	4.91%
98年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	323,773	151,774	343,190	178,101	248,249	30,765	1,275,852
	憂鬱症藥物之給藥日數	5,794,295	3,051,734	5,949,282	4,203,171	5,972,389	506,767	25,477,639
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.59%	4.97%	5.77%	4.24%	4.16%	6.07%	5.01%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：為本市所有西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、5其中一種）。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)/(同ID不同處方之就醫日期與給藥日期間有重複之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=V08A)

4. 資料匯取日期：10年04月28日

5. 製表單位：醫管及藥材組

指標2.2.6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	820,880	448,063	770,389	420,781	534,000	85,900	3,079,993
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,637,903	4,096,408	8,715,503	4,343,424	5,044,385	739,349	28,578,973
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.75%	10.94%	11.47%	9.68%	10.59%	11.62%	10.78%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	832,985	468,952	782,751	407,127	527,491	86,908	3,106,194
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,742,970	4,251,697	8,756,881	4,282,997	5,034,575	727,792	28,796,912
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.76%	11.03%	11.56%	9.51%	10.48%	11.94%	10.79%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	848,778	474,154	781,423	406,773	540,525	84,798	3,134,450
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,838,403	4,326,092	8,865,027	4,270,288	5,187,394	722,690	29,209,892
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.80%	10.96%	11.38%	9.53%	10.42%	11.73%	10.73%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	922,547	470,969	796,479	434,192	557,826	93,146	3,275,159
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,372,139	4,472,402	7,188,914	4,433,094	5,369,070	772,068	30,607,687
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.02%	10.53%	11.08%	9.79%	10.39%	12.05%	10.70%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	3,423,150	1,862,138	3,131,042	1,668,873	2,150,843	350,750	12,595,796
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	31,591,415	17,146,599	27,526,325	17,329,801	20,635,425	2,961,899	117,191,464
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.84%	10.86%	11.37%	9.63%	10.47%	11.84%	10.75%
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	947,417	435,051	808,618	445,555	557,037	96,060	3,289,738
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,296,113	4,358,836	7,157,801	4,508,519	5,332,168	772,667	30,426,104
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.42%	9.98%	11.30%	9.88%	10.45%	12.43%	10.81%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	937,533	412,928	810,691	428,650	538,604	92,142	3,220,548
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,386,276	4,426,751	7,221,247	4,504,274	5,397,059	762,004	30,707,911
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.17%	9.33%	11.23%	9.52%	9.98%	12.09%	10.49%
98年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	865,091	357,330	747,324	377,879	471,757	75,621	2,895,002
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,678,887	3,747,079	6,641,083	4,091,532	5,117,874	659,805	27,936,240
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.27%	9.54%	11.25%	9.24%	9.22%	11.48%	10.36%
98年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	902,945	380,201	810,650	398,770	492,975	79,177	3,064,719
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,979,857	3,883,246	7,022,149	4,299,484	5,299,424	694,971	29,179,131
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.32%	9.79%	11.54%	9.27%	9.30%	11.39%	10.50%
98年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	1,768,036	737,531	1,557,974	776,649	964,733	154,798	5,959,721
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	15,658,724	7,630,325	13,663,232	8,391,016	10,417,298	1,354,776	57,115,371
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.29%	9.67%	11.40%	9.28%	9.26%	11.43%	10.43%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方開劑方式為1、0、6及十一種）。

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與處方用藥日期間有重複之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

4. 資料匯取日期：99年04月28日

5. 製表單位：醫事及藥材組

指標 2.2.7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	313,709	118,478	235,129	185,434	211,560	32,750	1,097,060
	降血壓(口服)之給藥日數	15,580,667	7,986,458	12,430,642	10,647,955	12,665,931	1,967,527	61,279,180
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.01%	1.48%	1.89%	1.74%	1.67%	1.66%	1.78%
97年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	252,526	97,926	184,884	145,498	169,904	28,781	879,519
	降血壓(口服)之給藥日數	15,395,597	7,869,163	12,180,198	10,351,114	12,482,615	1,928,417	60,117,104
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.65%	1.24%	1.52%	1.41%	1.38%	1.49%	1.46%
97年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	234,620	93,586	177,167	138,231	166,651	27,098	837,353
	降血壓(口服)之給藥日數	15,288,830	7,882,860	12,211,619	10,493,058	12,677,862	1,908,487	60,352,736
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.19%	1.45%	1.33%	1.31%	1.42%	1.39%
97年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	286,392	112,104	191,772	151,588	175,597	30,894	928,357
	降血壓(口服)之給藥日數	16,397,729	8,623,053	13,073,876	11,039,007	13,372,312	2,067,618	64,573,595
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.62%	1.30%	1.47%	1.37%	1.31%	1.49%	1.44%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	1,067,247	422,094	788,952	620,761	723,712	119,521	3,742,289
	降血壓(口服)之給藥日數	82,552,823	32,361,554	49,896,335	42,441,134	51,188,720	7,872,049	246,322,615
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.30%	1.58%	1.46%	1.41%	1.52%	1.52%
98年第1季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	308,298	133,344	218,069	176,943	204,671	35,252	1,076,577
	降血壓(口服)之給藥日數	16,250,815	8,667,607	13,062,227	10,972,119	13,371,958	2,061,252	64,405,978
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.90%	1.54%	1.67%	1.61%	1.53%	1.71%	1.67%
98年第2季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	243,974	110,683	175,090	142,140	165,468	30,900	868,253
	降血壓(口服)之給藥日數	16,384,120	8,753,748	13,215,275	11,030,674	13,632,632	2,077,500	65,073,949
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.49%	1.26%	1.32%	1.29%	1.21%	1.49%	1.33%
98年第3季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	228,567	100,376	167,924	138,811	164,909	28,762	829,349
	降血壓(口服)之給藥日數	16,333,188	8,767,190	13,289,880	11,102,611	13,908,202	2,029,647	65,430,718
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.40%	1.14%	1.26%	1.25%	1.19%	1.42%	1.27%
98年第4季	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	262,711	114,019	191,671	153,681	189,167	30,856	942,305
	降血壓(口服)之給藥日數	17,195,721	9,286,319	14,211,216	11,743,398	14,599,539	2,148,184	69,184,377
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.53%	1.23%	1.35%	1.31%	1.30%	1.44%	1.36%
98年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排除08案件)	1,043,550	458,422	752,754	611,775	724,213	125,770	3,716,484
	降血壓(口服)之給藥日數	86,143,844	35,474,864	53,798,598	44,848,802	55,512,331	8,316,583	264,095,022
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.58%	1.29%	1.40%	1.36%	1.30%	1.51%	1.41%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件(藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、5、6其十一種)。

3. 公式說明：

分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與給藥日期間有重複之給藥日數)

分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前二碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

4. 資料匯集日期：99年04月29日

5. 製表單位：醫事及藥材組

指標2.2.2西醫基層總額專業醫療服務品質指標-同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	36,019	11,495	19,778	14,948	15,925	3,181	101,346
	降血脂(口服)之給藥日數	2,932,093	1,334,233	1,623,818	1,548,315	1,667,223	289,739	9,386,421
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.23%	0.86%	1.22%	0.97%	0.96%	1.13%	1.08%
97年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	30,236	10,564	16,990	13,523	13,442	3,492	88,249
	降血脂(口服)之給藥日數	3,027,252	1,458,472	1,780,144	1,592,855	1,783,524	322,315	9,984,582
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.00%	0.72%	0.95%	0.85%	0.75%	1.08%	0.89%
97年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	31,189	11,116	17,424	13,399	13,796	3,203	90,127
	降血脂(口服)之給藥日數	3,238,647	1,530,930	1,909,502	1,681,026	1,884,067	306,425	10,550,597
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.73%	0.91%	0.80%	0.73%	1.05%	0.85%
97年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	33,068	12,657	17,748	13,740	14,498	3,837	95,548
	降血脂(口服)之給藥日數	3,448,593	1,651,813	1,975,463	1,768,690	1,982,994	328,328	11,155,881
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.96%	0.77%	0.90%	0.78%	0.73%	1.17%	0.86%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	130,514	45,832	71,940	55,610	57,661	13,713	375,270
	降血脂(口服)之給藥日數	12,646,585	5,975,448	7,288,927	6,590,886	7,317,808	1,237,807	41,057,461
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.77%	0.99%	0.84%	0.79%	1.11%	0.91%
98年第1季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	39,298	16,072	20,456	16,494	17,369	4,174	113,863
	降血脂(口服)之給藥日數	3,452,819	1,656,397	1,915,328	1,787,512	2,026,282	332,837	11,171,175
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.14%	0.97%	1.07%	0.92%	0.86%	1.25%	1.02%
98年第2季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	32,459	13,341	16,840	14,679	14,465	4,410	96,194
	降血脂(口服)之給藥日數	3,675,316	1,776,334	2,064,582	1,954,190	2,180,383	379,598	12,030,403
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.88%	0.75%	0.82%	0.75%	0.66%	1.16%	0.80%
98年第3季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	33,681	13,092	16,560	15,048	15,295	4,213	97,829
	降血脂(口服)之給藥日數	3,806,084	1,786,983	2,147,635	2,008,132	2,252,271	368,056	12,367,171
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.88%	0.73%	0.77%	0.75%	0.68%	1.15%	0.79%
98年第4季	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	33,262	12,709	18,954	15,934	17,314	4,289	102,462
	降血脂(口服)之給藥日數	3,930,027	1,838,378	2,279,615	2,114,906	2,445,329	368,733	12,976,979
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.85%	0.69%	0.83%	0.75%	0.71%	1.16%	0.79%
98年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排除08案件)	138,700	55,214	72,810	62,155	64,383	17,086	410,348
	降血脂(口服)之給藥日數	14,884,246	7,058,102	8,407,160	7,864,740	8,904,256	1,447,224	48,545,728
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	0.93%	0.78%	0.87%	0.79%	0.72%	1.18%	0.85%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（無費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、0其十一種）。

3.公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(可ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重複之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC有二碼-C09)

4.資料擷取日期：99年04月28日

5.數表單位：醫管處藥材組

指標 2.2.9 西醫基層總額專業醫療服務品質指標 - 同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	87,156	34,713	66,724	62,042	61,993	12,203	324,831
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,711,202	2,447,372	4,002,376	3,826,883	4,340,102	684,022	20,011,957
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.85%	1.42%	1.67%	1.62%	1.43%	1.78%	1.62%
97年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	73,668	31,519	54,567	53,098	52,286	10,279	275,416
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,793,117	2,521,516	4,198,739	3,872,954	4,406,436	685,852	20,388,614
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.25%	1.33%	1.37%	1.19%	1.50%	1.35%
97年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	71,456	31,385	56,070	52,534	50,976	10,594	273,125
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	4,950,000	2,635,687	4,238,501	3,963,365	4,522,762	689,367	20,999,682
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.19%	1.32%	1.33%	1.13%	1.55%	1.30%
97年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	73,118	34,956	56,465	52,393	51,617	12,018	280,567
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,162,943	2,804,552	4,365,285	4,048,159	4,665,009	726,669	21,772,608
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.42%	1.25%	1.29%	1.29%	1.11%	1.63%	1.29%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	305,398	132,583	233,826	220,067	216,872	45,193	1,153,939
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,617,282	10,409,127	16,714,901	15,711,361	17,934,309	2,785,901	83,172,861
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.56%	1.27%	1.40%	1.40%	1.21%	1.62%	1.39%
98年第1季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	87,355	43,428	65,261	60,318	60,182	12,583	329,107
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,027,177	2,758,802	4,281,500	3,949,809	4,582,114	712,505	21,311,907
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.74%	1.57%	1.52%	1.53%	1.31%	1.76%	1.54%
98年第2季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	72,690	36,086	54,835	52,535	50,084	11,722	279,952
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,235,775	2,891,038	4,454,833	4,106,134	4,791,277	737,088	22,216,145
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.39%	1.32%	1.23%	1.28%	1.05%	1.59%	1.26%
98年第3季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	71,597	36,678	52,666	50,973	51,065	11,721	274,700
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,347,282	2,992,975	4,588,014	4,192,673	4,927,886	731,597	22,780,387
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.34%	1.23%	1.15%	1.22%	1.04%	1.60%	1.21%
98年第4季	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	73,266	36,935	55,447	50,297	55,025	11,206	282,170
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	5,442,628	3,041,322	4,686,093	4,264,825	5,039,760	750,284	23,224,912
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.35%	1.21%	1.18%	1.18%	1.09%	1.49%	1.21%
98年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排除案件)	304,908	155,127	228,209	214,123	216,356	47,206	1,165,929
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	21,052,842	11,684,137	18,010,440	16,513,441	19,341,017	2,931,474	89,533,351
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.45%	1.33%	1.27%	1.30%	1.12%	1.61%	1.30%

備註：1. 資料來源：醫藥給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有西醫基層總額之門診給藥案件(無重不為0，或給藥天數不為0，或處方調整方式為1、0、0其中一種)。

3. 公式說明：

分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重複之給藥日數)。

分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前二碼=A10)

4. 資料匯聚日期：99年04月28日

5. 製表單位：醫藥及藥材組

指標 2.2.10 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	10,781	5,481	13,858	9,042	9,087	795	49,044
	精神分裂藥物之給藥日數	554,711	323,532	726,826	536,002	689,045	47,599	2,877,515
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.94%	1.69%	1.91%	1.69%	1.32%	1.67%	1.70%
97年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	9,743	6,121	12,375	7,630	7,300	779	43,948
	精神分裂藥物之給藥日數	491,332	328,116	685,824	478,977	639,215	44,478	2,667,942
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.98%	1.87%	1.80%	1.58%	1.14%	1.75%	1.85%
97年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	8,973	6,134	13,230	6,894	8,436	745	44,412
	精神分裂藥物之給藥日數	500,485	337,255	702,970	486,148	675,400	42,540	2,744,798
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.79%	1.82%	1.88%	1.42%	1.25%	1.75%	1.82%
97年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	10,825	6,189	14,281	7,666	8,493	540	47,984
	精神分裂藥物之給藥日數	550,750	359,862	745,586	494,770	697,781	40,743	2,889,492
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.97%	1.71%	1.92%	1.55%	1.22%	1.33%	1.66%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	40,322	23,905	53,754	31,232	33,316	2,859	185,388
	精神分裂藥物之給藥日數	2,087,278	1,348,765	2,861,006	1,995,897	2,701,441	175,360	11,179,747
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.92%	1.77%	1.88%	1.56%	1.23%	1.83%	1.66%
98年第1季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	12,165	7,527	16,189	8,331	8,666	852	53,730
	精神分裂藥物之給藥日數	593,428	380,309	770,971	495,393	716,300	43,635	3,000,036
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.98%	2.10%	1.68%	1.21%	1.95%	1.79%
98年第2季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	10,446	7,232	13,805	7,843	8,439	768	48,533
	精神分裂藥物之給藥日數	594,372	387,583	753,759	492,603	726,774	42,041	2,997,132
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.76%	1.87%	1.83%	1.58%	1.16%	1.83%	1.62%
98年第3季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	11,848	7,030	13,656	7,099	8,677	727	49,037
	精神分裂藥物之給藥日數	620,736	401,727	756,256	497,908	734,831	42,774	3,054,232
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.91%	1.75%	1.81%	1.43%	1.18%	1.70%	1.81%
98年第4季	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	14,221	7,318	13,752	8,492	9,005	728	53,518
	精神分裂藥物之給藥日數	669,950	424,491	810,544	534,242	732,681	48,302	3,219,610
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.12%	1.72%	1.70%	1.58%	1.23%	1.51%	1.66%
98年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)	48,680	29,107	57,402	31,765	34,787	3,075	204,816
	精神分裂藥物之給藥日數	2,478,486	1,594,110	3,091,530	2,020,146	2,909,986	176,752	12,271,010
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.96%	1.83%	1.86%	1.57%	1.20%	1.74%	1.67%

備註：1.資料來源：醫療給付體系分析系統。
2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6共十一種）。
3.公式說明：
分子：精神分裂藥物重複用藥日數(第08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=005A)
4.資料匯取日期：99年04月28日
5.製表單位：醫事及藥材組

指標2.2.11 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	基隆	中區	高雄	基隆	基隆	小計
97年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	25,212	10,333	31,186	19,306	14,628	2,317	102,882
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,102,765	530,330	1,257,002	904,181	1,220,008	111,066	5,125,352
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.25%	1.95%	2.48%	2.14%	1.20%	2.09%	2.01%
97年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	24,046	10,101	29,202	15,287	13,460	2,313	94,409
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,141,482	585,886	1,301,120	876,749	1,258,187	112,150	5,275,574
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.11%	1.72%	2.24%	1.74%	1.07%	2.06%	1.79%
97年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	27,737	10,930	29,177	16,189	14,418	2,221	100,672
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,218,709	630,378	1,345,972	937,406	1,312,818	109,212	5,554,495
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.28%	1.73%	2.17%	1.73%	1.10%	2.03%	1.81%
97年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	31,590	12,123	31,729	16,680	14,656	2,628	109,408
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,328,391	690,670	1,429,384	987,706	1,377,420	120,129	5,943,700
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.38%	1.76%	2.22%	1.67%	1.06%	2.19%	1.84%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	108,585	43,487	121,294	67,462	57,162	9,479	407,469
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,791,347	2,437,264	5,333,478	3,716,042	5,168,433	452,557	21,899,121
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.27%	1.78%	2.27%	1.82%	1.11%	2.09%	1.86%
98年第1季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	33,500	13,868	34,970	19,278	17,331	3,428	122,375
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,330,524	694,043	1,392,237	963,794	1,374,723	123,131	5,878,452
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.52%	2.00%	2.51%	2.00%	1.26%	2.78%	2.08%
98年第2季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	31,633	12,944	33,723	18,755	15,485	2,444	112,984
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,405,460	732,841	1,478,318	1,039,301	1,465,327	124,187	6,245,434
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.25%	1.77%	2.28%	1.81%	1.06%	1.97%	1.81%
98年第3季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	33,250	14,006	32,179	16,103	17,012	2,624	115,174
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,482,902	789,985	1,504,012	1,062,010	1,525,996	125,192	6,490,097
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.24%	1.77%	2.14%	1.52%	1.11%	2.10%	1.77%
98年第4季	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	35,922	15,309	32,449	18,673	18,031	2,993	123,377
	憂鬱症藥物之給藥日數	1,575,409	834,951	1,574,715	1,138,066	1,606,343	134,257	6,863,741
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.28%	1.83%	2.06%	1.64%	1.12%	2.23%	1.80%
98年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件)	134,305	56,127	133,321	70,809	67,859	11,489	473,910
	憂鬱症藥物之給藥日數	5,794,295	3,051,820	5,949,282	4,203,171	5,972,389	506,767	25,477,724
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.32%	1.84%	2.24%	1.68%	1.14%	2.27%	1.86%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：為所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥大數不為0，或處方

調劑方式為「0」或「6」其中一種）。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除案件) / (同10不同處方之就醫日期與給藥日期間有重複之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

4. 資料匯取日期：98年04月28日

5. 製表單位：醫管及藥材組

指標2.2.12 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	222,033	94,245	201,883	117,423	112,484	20,097	768,165
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,637,993	4,096,408	6,715,503	4,343,424	5,044,386	739,349	28,576,973
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.91%	2.30%	3.01%	2.70%	2.23%	2.72%	2.69%
97年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	205,967	87,664	186,842	101,050	100,703	18,673	700,899
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,742,970	4,251,687	6,756,881	4,282,997	5,034,575	727,792	28,796,912
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.66%	2.06%	2.73%	2.36%	2.00%	2.57%	2.43%
97年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	206,410	89,616	183,106	98,833	102,091	16,535	696,581
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,838,403	4,326,082	6,865,027	4,270,286	5,187,394	722,690	29,209,882
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.63%	2.07%	2.67%	2.31%	1.97%	2.29%	2.38%
97年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	223,462	93,174	190,300	104,579	104,061	18,697	734,273
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,372,139	4,472,402	7,189,927	4,433,094	5,369,070	772,068	30,608,700
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.67%	2.08%	2.65%	2.36%	1.94%	2.42%	2.40%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	857,872	364,699	762,131	421,885	419,339	74,002	2,899,928
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	31,591,415	17,146,599	27,527,338	17,329,801	20,635,425	2,861,899	117,192,477
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.72%	2.13%	2.73%	2.43%	2.03%	2.50%	2.47%
98年第1季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	244,028	99,145	202,035	115,775	113,920	21,030	795,033
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,296,113	4,358,836	7,157,801	4,508,519	5,332,168	772,667	30,426,104
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.94%	2.27%	2.82%	2.57%	2.12%	2.72%	2.61%
98年第2季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	217,845	90,488	181,189	102,463	100,572	18,750	711,307
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	8,398,278	4,426,751	7,221,247	4,504,274	5,397,059	762,304	30,707,911
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.59%	2.04%	2.51%	2.27%	1.85%	2.45%	2.32%
98年第3季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	183,932	75,295	156,984	88,864	89,252	14,681	618,988
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,678,867	3,747,079	6,641,083	4,091,532	5,117,874	658,805	27,836,240
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.39%	2.01%	2.36%	2.17%	1.74%	2.23%	2.22%
98年第4季	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	210,625	83,945	171,611	97,010	94,826	16,250	674,267
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	7,979,857	3,883,246	7,022,149	4,299,484	5,299,424	694,971	29,179,131
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.64%	2.16%	2.44%	2.26%	1.79%	2.34%	2.31%
98年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)	404,557	159,240	328,575	185,874	184,078	30,931	1,293,255
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	15,658,724	7,630,325	13,663,232	8,391,016	10,417,298	1,354,776	57,115,371
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.58%	2.09%	2.40%	2.22%	1.77%	2.28%	2.26%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其十一種）。

3.公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(門診不同處方之就醫日期與給藥日期間有重複之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

4.資料編製日期：99年04月28日

5.暫定單位：醫藥日數/日數

指標2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標—各區門診平均每張處方箋開藥天數

年季	資料	台北	基隆	中港	高雄	基隆	高雄	小計
97年第1季	給藥日份	66,494,724	33,855,029	48,791,444	40,091,505	44,505,550	6,170,151	240,918,403
	給藥案件數	12,589,932	6,189,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	平均每張處方箋開藥天數	5.28	5.46	5.28	5.48	5.62	6.25	5.42
97年第2季	給藥日份	63,203,880	32,746,968	46,773,834	37,586,726	41,319,879	6,037,420	227,668,707
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	平均每張處方箋開藥天數	5.55	5.74	5.63	5.79	6.02	6.45	5.73
97年第3季	給藥日份	60,139,653	31,389,269	44,935,925	36,620,955	41,231,369	5,686,739	220,003,910
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,638,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	平均每張處方箋開藥天數	5.82	6.03	5.88	5.99	6.12	6.80	5.97
97年第4季	給藥日份	69,089,007	36,094,529	51,253,183	40,693,547	45,270,865	6,321,771	248,722,882
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	平均每張處方箋開藥天數	5.42	5.67	5.41	5.52	5.71	6.39	5.54
97年小計	給藥日份	258,927,264	134,095,795	192,754,366	154,992,733	172,327,663	24,216,081	937,313,902
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	平均每張處方箋開藥天數	5.50	5.71	5.53	5.68	5.85	6.46	5.65
98年第1季	給藥日份	68,176,846	35,674,350	50,733,104	40,462,275	44,952,379	6,312,707	246,311,661
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	平均每張處方箋開藥天數	5.42	5.68	5.41	5.55	5.73	6.39	5.55
98年第2季	給藥日份	66,627,349	34,961,195	48,916,944	39,299,493	43,433,961	6,256,387	239,495,349
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	平均每張處方箋開藥天數	5.68	5.97	5.75	5.86	6.11	6.65	5.88
98年第3季	給藥日份	65,383,989	34,310,367	48,089,134	38,807,548	43,691,125	6,040,666	236,323,031
	給藥案件數	11,328,391	5,647,793	8,177,580	6,482,650	7,074,458	892,848	39,603,720
	平均每張處方箋開藥天數	5.77	6.08	5.88	5.99	6.18	6.77	5.97
98年第4季	給藥日份	72,428,924	38,360,316	53,672,016	42,780,157	48,014,937	6,517,601	261,794,151
	給藥案件數	13,533,633	6,920,823	9,994,037	7,860,522	8,429,604	1,039,309	47,777,928
	平均每張處方箋開藥天數	5.35	5.55	5.37	5.44	5.70	6.27	5.48
98年小計	給藥日份	272,617,108	143,326,228	201,411,198	161,349,473	180,082,422	25,127,763	983,924,192
	給藥案件數	49,166,616	24,706,846	36,060,625	28,342,733	30,462,188	3,860,781	172,599,789
	平均每張處方箋開藥天數	5.54	5.80	5.59	5.69	5.91	6.51	5.70

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、0其十一種）。

3.公式說明：

分子：給藥案件之給藥日份加總。

分母：給藥案件數。

4.資料編製日期：99年04月28日

5.製表單位：醫事及藥材組。

指標2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

年季	資料	台北	北港	中港	南港	高屏	東港	小計
97年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	832,352	423,353	621,733	531,313	633,552	90,087	3,132,390
	慢性處方箋案件數	1,241,404	649,874	895,698	806,438	853,424	147,450	4,594,296
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	67.05%	65.14%	69.41%	65.88%	74.24%	61.09%	68.18%
97年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	835,204	428,623	625,760	527,631	630,754	90,490	3,138,462
	慢性處方箋案件數	1,262,795	667,681	909,142	802,362	847,223	148,418	4,637,621
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	66.14%	64.20%	68.83%	65.76%	74.45%	60.97%	67.67%
97年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	844,541	434,595	638,126	537,498	643,180	89,411	3,187,351
	慢性處方箋案件數	1,265,904	673,779	911,152	814,853	860,023	145,216	4,670,927
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	66.71%	64.50%	70.04%	65.98%	74.78%	61.57%	68.24%
97年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	920,471	482,587	688,068	570,716	681,698	96,295	3,437,833
	慢性處方箋案件數	1,384,763	745,910	976,300	865,098	913,934	156,397	5,042,402
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	66.47%	64.70%	70.27%	65.97%	74.58%	61.57%	68.18%
97年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,432,568	1,769,158	2,571,687	2,167,158	2,589,182	366,283	12,896,036
	慢性處方箋案件數	5,154,886	2,737,244	3,692,292	3,288,749	3,474,604	597,491	18,945,246
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	66.59%	64.63%	69.65%	65.90%	74.52%	61.30%	68.07%
98年第1季	開立慢性病連續處方箋案件數	894,155	475,040	668,633	558,010	668,701	95,537	3,356,076
	慢性處方箋案件數	1,311,294	709,711	926,732	832,357	884,330	151,239	4,815,683
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	68.19%	66.93%	71.93%	66.80%	75.62%	63.17%	69.69%
98年第2季	開立慢性病連續處方箋案件數	910,623	483,037	682,260	565,129	681,358	97,291	3,419,698
	慢性處方箋案件數	1,350,999	731,796	953,134	851,848	904,288	153,975	4,948,040
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	67.40%	66.01%	71.58%	66.34%	75.35%	63.19%	69.14%
98年第3季	開立慢性病連續處方箋案件數	911,605	484,070	690,051	568,592	697,957	95,779	3,448,054
	慢性處方箋案件數	1,342,319	728,156	957,887	848,751	923,697	150,866	4,951,676
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	67.91%	66.48%	72.04%	66.99%	75.56%	63.49%	69.63%
98年第4季	開立慢性病連續處方箋案件數	957,948	514,629	731,571	597,418	724,652	100,097	3,626,313
	慢性處方箋案件數	1,403,619	772,304	1,008,594	883,229	956,525	155,852	5,180,114
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	68.25%	66.64%	72.53%	67.64%	75.76%	64.23%	70.00%
98年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,674,331	1,956,776	2,770,515	2,287,147	2,772,668	388,704	13,850,141
	慢性處方箋案件數	5,408,231	2,941,967	3,846,347	3,416,176	3,668,840	611,932	19,893,493
	慢性處方箋開立慢性處方箋處方箋百分比	67.94%	66.51%	72.03%	66.95%	75.57%	63.52%	69.62%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥次數不為0，或處方類別方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋(案件分類08，且給藥日份>21)的案件數。

分母：慢性處方箋案件數(案件分類=02、04、08)。

4.資料匯取日期：98年04月28日

5.製表單位：醫事及藥材組

指標2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標—各區處方箋釋出率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	交付調劑案件數	4,456,771	3,061,540	2,140,351	2,482,941	1,178,683	699,730	13,930,016
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,914,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	處方箋釋出率	35.40%	49.39%	22.68%	33.94%	14.89%	61.74%	31.34%
97年第2季	交付調劑案件數	3,952,283	2,737,022	1,862,012	2,165,471	1,012,148	573,024	12,301,960
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	處方箋釋出率	34.69%	48.00%	22.39%	33.34%	14.76%	61.24%	30.99%
97年第3季	交付調劑案件數	3,550,843	2,440,048	1,672,017	2,025,819	979,744	506,804	11,174,475
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	處方箋釋出率	34.36%	46.87%	21.89%	33.14%	14.53%	60.57%	30.31%
97年第4季	交付調劑案件數	4,343,203	2,999,645	2,117,493	2,374,431	1,154,989	589,965	13,579,726
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	處方箋釋出率	34.08%	47.15%	22.35%	32.22%	14.57%	59.61%	30.26%
97年小計	交付調劑案件數	16,302,300	11,238,255	7,791,873	9,048,662	4,325,564	2,279,523	50,986,177
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	處方箋釋出率	34.64%	47.88%	22.35%	33.15%	14.69%	60.79%	30.73%
98年第1季	交付調劑案件數	4,366,082	3,014,132	2,123,008	2,399,589	1,158,343	597,878	13,657,032
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	處方箋釋出率	34.74%	47.99%	22.64%	32.89%	14.74%	60.55%	30.79%
98年第2季	交付調劑案件數	4,033,761	2,773,397	1,875,455	2,177,332	1,006,028	567,364	12,433,337
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	處方箋釋出率	34.37%	47.35%	22.04%	32.48%	14.15%	60.28%	30.43%
98年第3季	交付調劑案件數	3,893,689	2,670,660	1,768,427	2,089,758	1,001,719	547,811	11,972,064
	給藥案件數	11,328,391	5,647,793	8,177,580	6,482,650	7,074,458	892,848	39,603,720
	處方箋釋出率	34.37%	47.29%	21.63%	32.24%	14.16%	61.36%	30.23%
98年第4季	交付調劑案件數	4,527,616	3,231,331	2,092,971	2,438,949	1,182,496	621,044	14,094,407
	給藥案件數	13,533,633	6,920,823	9,994,037	7,860,522	8,429,604	1,039,309	47,777,928
	處方箋釋出率	33.45%	46.69%	20.84%	31.03%	14.03%	59.76%	29.50%
98年小計	交付調劑案件數	16,821,148	11,689,520	7,859,861	9,105,628	4,346,586	2,334,097	52,156,840
	給藥案件數	49,166,616	24,706,846	36,060,625	28,342,733	30,462,188	3,860,781	172,599,789
	處方箋釋出率	34.21%	47.31%	21.80%	32.13%	14.27%	60.46%	30.22%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：處方調劑方式為「1」的案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料編製日期：109年04月28日

5. 製表單位：醫事及藥材組

指標2.6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標—各區門診注射劑使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高雄	東區	小計
97年第1季	針劑給藥案件數	103,252	66,297	74,942	67,112	69,652	7,667	388,922
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	注射劑使用率	0.82%	1.07%	0.79%	0.92%	0.88%	0.78%	0.87%
97年第2季	針劑給藥案件數	97,915	64,638	74,756	62,759	65,649	6,563	372,280
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	注射劑使用率	0.86%	1.13%	0.90%	0.97%	0.96%	0.70%	0.94%
97年第3季	針劑給藥案件數	98,589	65,968	76,088	58,995	64,000	8,032	369,672
	給藥案件數	10,331,522	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,817
	注射劑使用率	0.95%	1.27%	1.00%	0.96%	0.95%	0.72%	1.00%
97年第4季	針劑給藥案件數	113,377	69,548	85,852	64,266	74,861	7,131	415,035
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,476,286	7,370,377	7,928,466	989,779	44,873,028
	注射劑使用率	0.89%	1.09%	0.91%	0.87%	0.94%	0.72%	0.92%
97年小計	針劑給藥案件數	413,133	266,451	311,638	253,132	274,182	27,393	1,545,909
	給藥案件數	47,061,160	23,469,955	34,865,543	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,894,667
	針劑給藥案件數	0.88%	1.14%	0.89%	0.93%	0.93%	0.73%	0.93%
97年第1季	給藥案件數	99,283	64,759	84,115	61,272	67,793	5,625	382,847
	注射劑使用率	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,090	987,467	44,357,265
	注射劑使用率	0.79%	1.03%	0.90%	0.84%	0.86%	0.57%	0.86%
97年第2季	給藥案件數	96,981	64,808	79,817	60,386	63,558	5,337	370,887
	注射劑使用率	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,112,779	941,157	40,862,619
	注射劑使用率	0.83%	1.11%	0.94%	0.90%	0.89%	0.57%	0.91%
97年第3季	給藥案件數	98,090	65,491	76,849	58,449	63,865	5,970	368,714
	注射劑使用率	11,328,391	5,648,181	8,177,580	6,482,650	7,074,458	892,848	39,604,108
	注射劑使用率	0.87%	1.16%	0.94%	0.90%	0.90%	0.67%	0.93%
98年第4季	針劑給藥案件數	100,937	69,270	78,074	60,237	70,751	6,680	385,949
	給藥案件數	13,533,633	6,920,823	9,994,400	7,860,522	8,429,604	1,039,309	47,778,291
	注射劑使用率	0.75%	1.00%	0.78%	0.77%	0.84%	0.64%	0.81%
98年小計	針劑給藥案件數	395,291	264,328	318,655	240,344	265,967	23,612	1,508,397
	給藥案件數	49,166,616	24,707,234	36,060,988	28,342,733	30,463,931	3,860,781	172,602,283
	針劑給藥案件數	0.80%	1.07%	0.88%	0.85%	0.87%	0.61%	0.87%

備註：1.資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2.資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥次數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3.公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數。

分母：給藥案件數。

針劑藥品—（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，扣除門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定送則，經醫師指導使用之方法後，得由病人獲知注射之藥品，及介傷等處置使用之破傷風類毒素注射劑（扣除門診治療；醫令代碼為370058、370318- 370418；急診：案件分類代碼為02碼；流感疫苗：案件分類代碼為02碼）。

4.資料編製日期：98年04月28日

5.製表單位：醫事及藥材組

指標2.7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標—各區門診抗生素使用率

年季	資料	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	小計
97年第1季	抗生素給藥案件數	1,526,039	607,990	1,042,518	775,989	831,857	94,239	4,878,632
	給藥案件數	12,589,932	6,199,193	9,437,845	7,314,689	7,923,486	987,630	44,452,775
	抗生素使用率	12.12%	9.81%	11.05%	10.61%	10.50%	9.54%	10.97%
97年第2季	抗生素給藥案件數	1,303,036	587,586	931,028	702,800	710,228	96,391	4,331,069
	給藥案件數	11,394,082	5,702,425	8,314,491	6,495,926	6,859,426	935,697	39,702,047
	抗生素使用率	11.44%	10.30%	11.20%	10.82%	10.35%	10.30%	10.91%
97年第3季	抗生素給藥案件數	1,223,430	574,681	870,780	680,260	710,150	93,896	4,153,197
	給藥案件數	10,331,521	5,205,841	7,636,921	6,113,805	6,742,019	836,709	36,866,816
	抗生素使用率	11.84%	11.04%	11.40%	11.13%	10.53%	11.22%	11.27%
97年第4季	抗生素給藥案件數	1,473,613	662,274	1,058,240	786,402	816,416	103,315	4,900,260
	給藥案件數	12,745,624	6,362,496	9,475,327	7,370,377	7,928,466	989,779	44,872,069
	抗生素使用率	11.56%	10.41%	11.17%	10.67%	10.30%	10.44%	10.92%
97年小計	抗生素給藥案件數	5,526,118	2,432,531	3,902,566	2,945,451	3,068,651	387,841	18,263,158
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	抗生素使用率	11.74%	10.38%	11.19%	10.79%	10.42%	10.34%	11.01%
98年第1季	抗生素給藥案件數	1,444,827	652,155	1,058,563	801,540	798,843	99,382	4,855,310
	給藥案件數	12,567,295	6,280,891	9,378,785	7,295,737	7,847,990	987,467	44,357,265
	抗生素使用率	11.50%	10.38%	11.29%	10.99%	10.18%	10.06%	10.95%
98年第2季	抗生素給藥案件數	1,376,577	621,647	954,646	734,107	710,753	98,481	4,496,211
	給藥案件數	11,737,297	5,857,339	8,510,223	6,703,824	7,111,036	941,157	40,860,876
	抗生素使用率	11.73%	10.61%	11.22%	10.95%	10.00%	10.46%	11.00%
98年第3季	抗生素給藥案件數	1,351,127	617,845	893,489	727,223	729,556	102,373	4,421,613
	給藥案件數	11,328,391	5,647,793	8,177,589	6,482,650	7,074,458	892,848	39,603,720
	抗生素使用率	11.83%	10.94%	10.93%	11.22%	10.31%	11.47%	11.16%
98年第4季	抗生素給藥案件數	1,522,925	670,622	980,089	806,379	832,787	99,839	4,912,641
	給藥案件數	13,533,633	6,920,823	9,994,037	7,860,522	8,429,604	1,039,309	47,777,928
	抗生素使用率	11.25%	9.69%	9.81%	10.26%	9.88%	9.61%	10.28%
98年小計	抗生素給藥案件數	5,695,456	2,562,269	3,886,787	3,069,249	3,071,939	400,075	18,685,775
	給藥案件數	49,166,616	24,706,846	36,060,625	28,342,733	30,462,188	3,860,781	172,599,789
	抗生素使用率	11.58%	10.37%	10.78%	10.83%	10.08%	10.36%	10.83%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥次數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且藥理分類有 4 碼0812）案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料編製日期：99年04月28日

5. 製表單位：醫管及藥材組