

西醫基層總額專業醫療服務品質指標

97年第4季附表

指標2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區同院所上呼吸道感染病人7日內複診率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	472,408	143,531	293,500	206,830	200,914	31,466	1,348,649
	上呼吸道感染人次	3,110,350	1,214,581	1,892,595	1,434,149	1,577,004	235,707	9,464,386
	上呼吸道感染病人7日內複診率	15.19%	11.82%	15.51%	14.42%	12.74%	13.35%	14.25%
96年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	472,459	146,552	289,608	194,970	206,785	30,111	1,340,485
	上呼吸道感染人次	3,190,880	1,268,985	1,892,456	1,420,194	1,620,705	224,962	9,618,182
	上呼吸道感染病人7日內複診率	14.81%	11.55%	15.30%	13.73%	12.76%	13.38%	13.94%
97年小計	上呼吸道感染 7日內重複就診人次	441,225	146,154	263,865	183,053	190,435	30,850	1,255,582
	上呼吸道感染人次	2,983,836	1,238,945	1,715,385	1,315,535	1,495,063	216,599	8,965,363
	上呼吸道感染病人7日內複診率	14.79%	11.80%	15.38%	13.91%	12.74%	14.24%	14.00%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層門診案件，以亂數取得一個費用年月為資料範圍計算之上呼吸道感染（主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487'）案件。

3. 公式說明：

分子：按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次。

分母：按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.1 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,627,928	1,482,057	2,251,944	1,886,741	2,010,922	393,340	10,652,932
	降血壓(口服)之給藥日數	55,006,571	27,367,494	42,744,404	36,453,188	41,517,417	6,872,733	209,961,807
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.78%	5.42%	5.27%	5.18%	4.84%	5.72%	5.07%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,484,130	1,378,162	2,243,942	1,873,654	2,155,528	373,047	10,508,463
	降血壓(口服)之給藥日數	58,529,037	29,804,118	46,395,873	39,838,473	47,226,942	7,256,682	229,051,125
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	4.24%	4.62%	4.84%	4.70%	4.56%	5.14%	4.59%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	2,367,384	1,271,961	2,171,555	1,740,003	2,117,345	370,232	10,038,480
	降血壓(口服)之給藥日數	62,552,823	32,361,554	49,894,917	42,441,134	51,198,720	7,872,049	246,321,197
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	3.78%	3.93%	4.35%	4.10%	4.14%	4.70%	4.08%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.2 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	217,683	68,600	98,138	79,205	72,549	18,256	554,431
	降血脂(口服)之給藥日數	10,084,285	3,865,094	5,483,353	5,006,022	5,268,037	850,865	30,557,656
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	2.16%	1.77%	1.79%	1.58%	1.38%	2.15%	1.81%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	189,448	72,034	100,133	75,524	85,937	21,156	544,232
	降血脂(口服)之給藥日數	11,065,389	4,986,506	6,114,680	5,650,959	6,324,800	1,028,351	35,170,685
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.44%	1.64%	1.34%	1.36%	2.06%	1.55%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	182,145	73,511	105,808	80,633	87,312	22,096	551,505
	降血脂(口服)之給藥日數	12,646,585	5,975,448	7,288,662	6,590,886	7,317,808	1,237,807	41,057,196
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.44%	1.23%	1.45%	1.22%	1.19%	1.79%	1.34%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。
分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	586,060	302,081	459,516	451,988	447,700	102,992	2,350,337
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	16,678,448	8,343,881	14,167,401	13,774,533	14,435,365	2,457,666	69,857,294
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.51%	3.62%	3.24%	3.28%	3.10%	4.19%	3.36%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	541,117	290,257	441,162	438,817	468,083	99,390	2,278,826
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	18,095,358	9,408,275	15,329,657	14,886,190	16,730,403	2,593,102	77,042,985
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.99%	3.09%	2.88%	2.95%	2.80%	3.83%	2.96%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	509,577	271,696	429,280	384,751	439,715	96,111	2,131,130
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,617,262	10,409,127	16,714,591	15,711,361	17,934,309	2,785,901	83,172,551
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.60%	2.61%	2.57%	2.45%	2.45%	3.45%	2.56%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。
分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	69,709	37,103	98,715	82,553	84,456	4,815	377,351
	精神分裂藥物之給藥日數	1,858,337	1,063,561	2,537,490	1,920,183	2,341,810	158,356	9,879,737
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.75%	3.49%	3.89%	4.30%	3.61%	3.04%	3.82%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	74,542	41,740	103,584	78,895	84,891	5,249	388,901
	精神分裂藥物之給藥日數	1,954,558	1,128,310	2,632,951	1,859,561	2,492,499	150,716	10,218,595
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.81%	3.70%	3.93%	4.24%	3.41%	3.48%	3.81%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	83,566	49,724	116,117	73,230	91,753	5,907	420,297
	精神分裂藥物之給藥日數	2,097,278	1,348,765	2,860,929	1,995,897	2,701,441	175,360	11,179,670
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.98%	3.69%	4.06%	3.67%	3.40%	3.37%	3.76%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	187,161	85,199	246,585	130,979	174,961	15,603	840,488
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,380,461	1,560,329	4,088,091	3,102,337	3,744,850	313,248	16,189,316
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.54%	5.46%	6.03%	4.22%	4.67%	4.98%	5.19%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	205,611	97,254	258,926	148,919	197,032	19,036	926,778
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,932,877	1,793,862	4,607,695	3,225,764	4,377,777	359,542	18,297,517
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.23%	5.42%	5.62%	4.62%	4.50%	5.29%	5.07%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	253,695	129,324	307,043	157,737	229,601	23,852	1,101,252
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,791,347	2,437,264	5,333,282	3,716,042	5,168,433	452,557	21,898,925
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.29%	5.31%	5.76%	4.24%	4.44%	5.27%	5.03%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	3,158,739	1,452,476	2,512,725	1,427,794	1,755,980	303,166	10,610,880
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	28,548,816	13,708,061	23,497,940	15,245,252	17,490,869	2,816,682	101,307,620
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	11.06%	10.60%	10.69%	9.37%	10.04%	10.76%	10.47%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	3,164,665	1,672,008	2,807,512	1,599,048	1,989,105	341,592	11,573,930
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,677,191	15,396,138	25,479,572	16,496,430	19,370,552	2,917,979	109,337,862
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.66%	10.86%	11.02%	9.69%	10.27%	11.71%	10.59%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	3,423,150	1,862,138	3,131,042	1,668,873	2,159,843	350,750	12,595,796
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	31,591,415	17,146,599	27,526,325	17,329,801	20,635,425	2,961,899	117,191,464
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.84%	10.86%	11.37%	9.63%	10.47%	11.84%	10.75%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,270,066	604,285	880,566	749,597	730,409	134,345	4,369,268
	降血壓(口服)之給藥日數	55,365,992	27,927,773	42,933,129	36,810,907	42,012,228	6,906,223	211,956,252
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	2.29%	2.16%	2.05%	2.04%	1.74%	1.95%	2.06%
96年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,149,093	507,102	847,306	684,844	759,061	125,881	4,073,287
	降血壓(口服)之給藥日數	58,529,037	29,804,534	46,395,873	39,838,473	47,226,942	7,256,682	229,051,541
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.96%	1.70%	1.83%	1.72%	1.61%	1.73%	1.78%
97年小計	降血壓(口服)重複用藥日數(排08案件)	1,067,247	422,094	788,952	620,761	723,712	119,523	3,742,289
	降血壓(口服)之給藥日數	62,552,823	32,361,554	49,896,335	42,441,134	51,198,720	7,872,049	246,322,615
	降血壓(口服)不同處方用藥日數重複率	1.71%	1.30%	1.58%	1.46%	1.41%	1.52%	1.52%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：限定為西醫基層之降血壓藥物(口服)給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
分母：降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.8 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	170,235	53,704	75,445	59,275	55,641	12,490	426,790
	降血脂(口服)之給藥日數	10,426,671	4,139,580	5,676,946	5,136,428	5,774,631	859,904	32,014,160
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.63%	1.30%	1.33%	1.15%	0.96%	1.45%	1.33%
96年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	140,622	49,463	69,797	52,630	57,243	13,068	382,823
	降血脂(口服)之給藥日數	11,065,389	4,986,536	6,114,680	5,650,959	6,324,800	1,028,351	35,170,715
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.27%	0.99%	1.14%	0.93%	0.91%	1.27%	1.09%
97年小計	降血脂(口服)重複用藥日數(排08案件)	130,514	45,832	71,940	55,610	57,661	13,713	375,270
	降血脂(口服)之給藥日數	12,646,585	5,975,448	7,288,927	6,590,886	7,317,808	1,237,807	41,057,461
	降血脂(口服)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.77%	0.99%	0.84%	0.79%	1.11%	0.91%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。

分母：降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼= C10)

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.9 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	371,931	173,954	262,280	258,816	223,362	47,429	1,337,772
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	16,762,192	8,610,232	14,315,368	13,871,815	14,956,035	2,464,389	70,980,031
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.22%	2.02%	1.83%	1.87%	1.49%	1.92%	1.88%
96年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	332,329	151,748	243,624	239,954	227,798	46,500	1,241,953
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	18,095,358	9,408,363	15,329,657	14,886,190	16,730,403	2,593,102	77,043,073
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.84%	1.61%	1.59%	1.61%	1.36%	1.79%	1.61%
97年小計	降血糖(口服及注射)重複用藥日數(排08案件)	305,398	132,583	233,826	220,067	216,872	45,193	1,153,939
	降血糖(口服及注射)之給藥日數	19,617,262	10,409,127	16,714,901	15,711,361	17,934,309	2,785,901	83,172,861
	降血糖(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.56%	1.27%	1.40%	1.40%	1.21%	1.62%	1.39%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)。
分母：降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.10 西醫基層總額專業醫療服務品質指標- 同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	38,678	21,988	50,920	42,436	36,190	2,687	192,899
	精神分裂藥物之給藥日數	1,888,250	1,103,265	2,548,578	1,955,198	2,404,553	159,637	10,059,481
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.05%	1.99%	2.00%	2.17%	1.51%	1.68%	1.92%
96年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	37,628	22,700	50,222	38,070	35,115	2,779	186,514
	精神分裂藥物之給藥日數	1,954,579	1,128,310	2,632,951	1,859,561	2,492,499	150,716	10,218,616
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.93%	2.01%	1.91%	2.05%	1.41%	1.84%	1.83%
97年小計	精神分裂藥物重複用藥日數(排08案件)	40,322	23,905	53,754	31,232	33,316	2,859	185,388
	精神分裂藥物之給藥日數	2,097,278	1,348,765	2,861,006	1,995,897	2,701,441	175,360	11,179,747
	精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	1.92%	1.77%	1.88%	1.56%	1.23%	1.63%	1.66%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.11 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	91,288	42,055	130,065	67,596	53,747	7,558	392,309
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,407,313	1,612,870	4,109,563	3,104,462	3,779,372	314,817	16,328,397
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.68%	2.61%	3.16%	2.18%	1.42%	2.40%	2.40%
96年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	88,257	40,678	111,306	74,416	51,958	7,768	374,383
	憂鬱症藥物之給藥日數	3,932,877	1,793,862	4,607,695	3,225,764	4,377,777	359,542	18,297,517
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.24%	2.27%	2.42%	2.31%	1.19%	2.16%	2.05%
97年小計	憂鬱症藥物重複用藥日數(排08案件)	108,585	43,487	121,294	67,462	57,162	9,479	407,469
	憂鬱症藥物之給藥日數	4,791,347	2,437,264	5,333,478	3,716,042	5,168,433	452,557	21,899,121
	憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.27%	1.78%	2.27%	1.82%	1.11%	2.09%	1.86%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)

分母：憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.2.12 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	940,153	432,527	785,163	450,997	432,364	87,244	3,128,448
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	28,595,129	13,879,811	23,517,820	15,255,318	17,520,080	2,822,421	101,590,579
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.29%	3.12%	3.34%	2.96%	2.47%	3.09%	3.08%
96年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	861,233	404,612	770,538	455,665	433,844	84,919	3,010,811
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	29,677,191	15,396,166	25,479,572	16,496,430	19,370,977	2,917,979	109,338,315
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.90%	2.63%	3.02%	2.76%	2.24%	2.91%	2.75%
97年小計	安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排08案件)	857,872	364,699	762,131	421,885	419,339	74,002	2,899,928
	安眠鎮靜藥物之給藥日數	31,591,415	17,146,599	27,527,338	17,329,801	20,635,425	2,961,899	117,192,477
	安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	2.72%	2.13%	2.77%	2.43%	2.03%	2.50%	2.47%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
- 分子：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)
- 分母：安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.3 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區門診平均每張處方箋開藥天數

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	給藥日份	248,866,397	121,193,512	179,033,759	148,665,444	159,834,699	23,426,436	881,020,247
	給藥案件數	47,836,433	22,597,764	34,930,655	27,742,628	29,426,612	3,962,060	166,496,152
	平均每張處方箋開藥天數	5.20	5.36	5.13	5.36	5.43	5.91	5.29
96年小計	給藥日份	252,526,349	127,750,119	186,389,675	153,796,143	167,908,376	23,656,153	912,026,815
	給藥案件數	47,532,011	23,156,103	35,119,737	27,908,334	29,706,977	3,805,069	167,228,231
	平均每張處方箋開藥天數	5.31	5.52	5.31	5.51	5.65	6.22	5.45
97年小計	給藥日份	258,927,264	134,095,795	192,754,366	154,992,733	172,327,663	24,216,081	937,313,902
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	平均每張處方箋開藥天數	5.50	5.71	5.53	5.68	5.85	6.46	5.65

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：給藥案件之給藥日份加總。
分母：給藥案件數。
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.4 西醫基層總額專業醫療服務品質指標-各區慢性病開立慢性病連續處方箋百分比

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	2,900,803	1,430,046	2,050,873	1,731,383	2,084,655	303,171	10,500,931
	慢性病給藥案件數	4,806,208	2,366,848	3,344,779	2,906,850	3,059,985	562,599	17,047,269
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	60.36%	60.42%	61.32%	59.56%	68.13%	53.89%	61.60%
96年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,141,633	1,574,590	2,322,090	2,006,008	2,373,519	335,679	11,753,519
	慢性病給藥案件數	4,872,832	2,508,138	3,478,397	3,157,851	3,270,635	565,154	17,853,007
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	64.47%	62.78%	66.76%	63.52%	72.57%	59.40%	65.83%
97年小計	開立慢性病連續處方箋案件數	3,432,568	1,769,158	2,571,687	2,167,158	2,589,182	366,283	12,896,036
	慢性病給藥案件數	5,154,866	2,737,244	3,692,292	3,288,749	3,474,604	597,491	18,945,246
	慢性病開立慢性病連續處方箋百分比	66.59%	64.63%	69.65%	65.90%	74.52%	61.30%	68.07%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：開立慢性病連續處方箋(案件分類08，且給藥日份>=21)的案件數。

分母：慢性病給藥案件數(案件分類=02、04、08)

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.5 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區處方箋釋出率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	交付調劑案件數	18,902,583	11,525,443	8,482,101	10,757,915	5,048,278	2,571,048	57,287,368
	給藥案件數	47,836,433	22,597,764	34,930,655	27,742,628	29,426,612	3,962,060	166,496,152
	處方箋釋出率	39.52%	51.00%	24.28%	38.78%	17.16%	64.89%	34.41%
96年小計	交付調劑案件數	17,243,089	11,466,933	8,054,033	9,821,658	4,417,672	2,410,591	53,413,976
	給藥案件數	47,532,011	23,156,103	35,119,737	27,908,334	29,706,977	3,805,069	167,228,231
	處方箋釋出率	36.28%	49.52%	22.93%	35.19%	14.87%	63.35%	31.94%
97年小計	交付調劑案件數	16,302,300	11,238,255	7,791,873	9,048,662	4,325,564	2,279,523	50,986,177
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	處方箋釋出率	34.64%	47.88%	22.35%	33.15%	14.69%	60.79%	30.73%

- 備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。
2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。
3. 公式說明：
分子：處方調劑方式為「1」的案件數。
分母：給藥案件數。
4. 資料擷取日期：98年04月13日
5. 製表單位：醫審小組

指標2.6 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區門診注射劑使用率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	針劑給藥案件數	481,931	322,861	422,763	389,505	403,936	58,132	2,079,128
	給藥案件數	47,903,601	22,624,158	34,939,040	27,753,326	29,428,125	3,962,139	166,610,389
	注射劑使用率	1.01%	1.43%	1.21%	1.40%	1.37%	1.47%	1.25%
96年小計	針劑給藥案件數	429,560	280,270	335,272	281,658	305,835	49,668	1,682,263
	給藥案件數	47,532,011	23,156,103	35,119,737	27,908,334	29,708,229	3,805,069	167,229,483
	注射劑使用率	0.90%	1.21%	0.95%	1.01%	1.03%	1.31%	1.01%
97年小計	針劑給藥案件數	413,133	266,451	311,638	253,132	274,162	27,393	1,545,909
	給藥案件數	47,061,160	23,469,955	34,865,543	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,894,667
	注射劑使用率	0.88%	1.14%	0.89%	0.93%	0.93%	0.73%	0.93%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之針劑藥品(醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」)案件數。

分母：給藥案件數。

針劑藥品－（醫令代碼為10碼，且第8碼為「2」）案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民

健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素

注射劑(排除門診治療:醫令代碼為37005B, 37031B- 37041B；急診: 案件分類代碼為02碼；流感疫苗：案件分類代碼為D2碼)。

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組

指標2.7 西醫基層總額專業醫療服務品質指標－各區門診抗生素使用率

年季	資料	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	小計
95年小計	抗生素給藥案件數	6,194,277	2,637,812	3,944,768	3,139,807	3,001,049	464,935	19,382,648
	給藥案件數	47,836,433	22,597,764	34,930,655	27,742,628	29,426,612	3,962,060	166,496,152
	抗生素使用率	12.95%	11.67%	11.29%	11.32%	10.20%	11.73%	11.64%
96年小計	抗生素給藥案件數	5,956,638	2,601,672	3,933,885	3,013,316	3,088,791	407,925	19,002,227
	給藥案件數	47,532,011	23,156,103	35,119,737	27,908,334	29,706,977	3,805,069	167,228,231
	抗生素使用率	12.53%	11.24%	11.20%	10.80%	10.40%	10.72%	11.36%
97年小計	抗生素給藥案件數	5,526,118	2,432,531	3,902,566	2,945,451	3,068,651	387,841	18,263,158
	給藥案件數	47,061,159	23,469,955	34,864,584	27,294,797	29,453,397	3,749,815	165,893,707
	抗生素使用率	11.74%	10.36%	11.19%	10.79%	10.42%	10.34%	11.01%

備註：1. 資料來源：醫療給付檔案分析系統。

2. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一種）。

3. 公式說明：

分子：給藥案件之抗生素藥品（醫令代碼為10碼，且藥理分類前4碼0812）案件數。

分母：給藥案件數。

4. 資料擷取日期：98年04月13日

5. 製表單位：醫審小組