

110年

門診透析整體性醫療品質資訊公開報告



衛生福利部

中央健康保險署

111年7月

目 錄

壹、前言.....	1
貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義	2
參、指標值監測結果	15
一、血液透析.....	15
指標1：血液透析_血清白蛋白（Albumin）	15
指標2：血液透析_尿素氮透析效率-URR.....	19
指標3：血液透析_貧血檢查-Hb	22
指標4：血液透析_住院率（住院次數/每千人）	25
指標5：血液透析_死亡率（人數/每百人）	29
指標6：瘻管重建率（人次/每千人月）	32
指標7：血液透析_脫離率.....	34
指標8：血液透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陽率.....	37
指標9：血液透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率	39
指標10：55歲以下血液透析病人移植登錄率	41
指標11：血液透析_鈣磷乘積.....	43
指標12：血液透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率.....	46
指標13：血液透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率	48
二、腹膜透析：.....	49
指標1：腹膜透析_血清白蛋白（Albumin）	49
指標2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V.....	53
指標3：腹膜透析_貧血檢查-Hb	56
指標4：腹膜透析_住院率（住院次數/每千人）	59
指標5：腹膜透析_死亡率（人數/每百人）	63
指標6：腹膜透析_腹膜炎發生率（人次/每百人月）	66
指標7：腹膜透析_脫離率.....	68
指標8：腹膜透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陽率.....	71
指標9：腹膜透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率	73
指標10：腹膜透析_55歲以下腹膜透析病人移植登錄率	75
指標11：腹膜透析_鈣磷乘積.....	77
指標12：腹膜透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率.....	80
指標13：腹膜透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率	82
三、整體透析.....	83
指標1 醫療費用核減率.....	83
指標2 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率	84
指標3 HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率.....	84
肆、結論：.....	85

附錄- 表1、110年整體性監測結果表：	86
附錄- 表2、110年分區別指標監測結果彙整表	92

壹、前言

● 緣起：

本報告係依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」之門診透析整體性之醫療品質資訊公開項目暨「全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案」之專業醫療服務品質指標編列，以健保特約醫療機構之醫療費用申報資料及透析院所上傳至健保署 VPN 系統資料為主要資料來源，彙編各指標趨勢情形而成；主要分為血液透析及腹膜透析2大部分，呈現各指標之操作型定義、整體與健保署6個分區業務組¹及醫療院所各層級別之監測統計。

● 意義：

本報告指標項目依其屬性區分為正向指標、負向指標、參考指標及規定合理範圍指標。對正向指標之監測目的，在於期待指標數值呈上升或平穩但維持高於某一數值之趨勢，若呈現明顯下降趨勢，則需進一步瞭解原因；反之，對負向指標，則期待指標數值呈下降或平穩但維持低於某一數值之趨勢，若呈現明顯上升趨勢，則需進一步瞭解原因；對於參考指標及規定合理範圍指標之監測目的，在於期待指標數值呈平穩趨勢，若呈現巨幅變動，則需進一步瞭解原因。

● 特別聲明：

本報告資料無法反映完整醫療過程與結果，因此，指標數字的表現可能為多重原因造成，醫療適當性仍需就病人情形由醫療專業認定，不應直接認定反映品質，請使用者審慎解讀。

註：健保署6個分區係指中央健康保險署臺北、北區、中區、南區、高屏及東區等六個分區服務範圍。

貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義

第一部分：血液透析

指標1. 營養狀態-血清白蛋白 (Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) 人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法) 或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法) 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) BCG法或BCP法人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均值* (1 $\pm$ 10%) 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均值* (1-10%) 為下限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標2. 尿素氮透析效率-URR

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：分母病人檢驗URR人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值：

分子：申報URR檢驗值之總和。

分母：申報URR檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗URR $\geq$ 65%之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗URR人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\pm 10\%$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\pm 10\%$ 為下限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血（如地中海貧血）。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\pm 10\%$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\pm 10\%$ 為下限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標4. 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所之血液透析病人總住院次數。

分母：追蹤期間之血液透析病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*1000（住院次數/每千人）。

※ 病患歸屬於統計期間最多透析次數之院所，若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多之院所為歸屬。

二、參考值：本項為負向指標，依特約類別分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，以最近3年平均値*（1+10%）為上限。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

（一）透析時間<1年之死亡率

分子：追蹤期間血液透析小於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間血液透析小於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100（人數/每百人）。

（二）透析時間≥1年之死亡率

分子：追蹤期間血液透析大於等於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間血液透析大於等於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100（人數/每百人）。

二、參考值：

（一）透析時間<1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平

均值* (1+10%) 為上限。

(二) 透析時間 $\geq$ 1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均
均值* (1+10%) 為上限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標6. 瘻管重建率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有血液透析病人重新接受動靜脈瘻管或
人工血管手術前90天申報資料計算歸屬院所之總次
數。

分母：追蹤期間之血液透析病患歸屬原則總病人月數。

計算：〔分子/分母〕*1000（人次/每千人月）。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值* (1+10%)
為上限。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一) 脫離率 (I) - 腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受
透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二) 脫離率 (II) - 因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值：本項列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標8. B型肝炎表面抗原 (HBsAg) 轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性（新感染）之病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值*（1+10%）為上限。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間anti-HCV由陰性轉為陽性（新感染）之人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值*（1+10%）為上限。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下血液透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下血液透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下血液透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均值*（1-10%）為下限。

三、監測頻率：每年。

指標11. 鈣磷乘積

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：分母病人測量鈣磷乘積人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 合格率

分子：分母病人測量鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\times (1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\times (1-10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標12. B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報HBsAg檢驗病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\times (1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

指標13. C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報anti-HCV檢驗病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\times (1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

二、監測頻率：每年。

第二部分：腹膜透析

指標1. 營養狀態-血清白蛋白 (Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) 人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法) 或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法) 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) BCG法或BCP法人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均值* (1 $\pm$ 10%) 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均值* (1-10%) 為下限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標2. 尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Weekly Kt/V檢驗值之總和。

分母：申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。

（三）合格率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Weekly Kt/V人數。

二、參考值：

（一）受檢率：最近3年平均值*（1 $\pm$ 10%）為規定合理範圍。

（二）合格率：本項為正向指標，最近3年平均值*（1-10%）為下限。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

（二）全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血（如地中海貧血）。

（三）合格率

分子：分母病人檢驗Hb $>$ 8.5g/dL之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值：本項為正向指標。

（一）受檢率：最近3年平均值*（1 $\pm$ 10%）為規定合理範圍。

（二）合格率：本項為正向指標，以最近3年平均值*（1-10%）為下限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標4. 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所之腹膜透析病人總住院次數。

分母：追蹤期間之腹膜透析病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*1000（住院次數/每千人）。

※ 病患歸屬於統計期間最多透析次數之院所，若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多之院所為歸屬。

二、參考值：本項為負向指標，依特約類別分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，以最近3年平均値*（1+10%）為上限。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

（一）透析時間<1年之死亡率

分子：追蹤期間腹膜透析小於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間腹膜透析小於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100（人數/每百人）。

（二）透析時間≥1年之死亡率

分子：追蹤期間腹膜透析大於等於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間腹膜透析大於等於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100（人數/每百人）。

二、參考值：

(一) 透析時間<1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均值* (1+10%) 為上限。

(二) 透析時間≥1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均值* (1+10%) 為上限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標6. 腹膜炎發生率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人發生腹膜炎前90天申報資料計算歸屬院所之發生腹膜炎總次數。

分母：追蹤期間之病患歸屬原則總病人月數。

計算：〔分子/分母〕*100（人次/每百人月）。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值* (1+10%) 為上限。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一) 脫離率 (I) -腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二) 脫離率 (II) -因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值：本項列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標8. B型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性（新感染）之病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值*（1+10%）為上限。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間anti-HCV由陰性轉為陽性（新感染）之人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值*（1+10%）為上限。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下腹膜透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下腹膜透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下腹膜透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均值*（1-10%）為下限。

三、監測頻率：每年。

指標11. 鈣磷乘積

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人測量鈣磷乘積人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 合格率

分子：分母病人測量鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。

二、參考值：本項為正向指標。

(一) 受檢率：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\text{值} \times (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標12. B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報HBsAg檢驗病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

指標13. C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報anti-HCV檢驗病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

第三部分：整體透析

指標1：醫療費用核減率

一、公式說明：

分子：申請點數扣除核定點數之初核核減點數。

分母：申請點數加總部分負擔之醫療費用點數。

二、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標2：C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率

一、公式說明：

分子：統計期間及追蹤統計期前3年申報HCV RNA檢查或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數。

分母：慢性透析病人C型肝炎抗體（anti-HCV）陽性人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均值*（1-10%）為下限。（此項指標為110年新增項目）

三、監測頻率：每年。

指標3：HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率

一、公式說明：

分子：C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數（排除最末次收案治療失敗、復發與再感染者）。

分母：於統計期間及追蹤統計期前3年慢性透析病人HCV RNA陽性或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均值*（1-10%）為下限。（此項指標為110年新增項目）

三、監測頻率：每年。

參、指標值監測結果

一、血液透析

指標1：血液透析_營養狀態-血清白蛋白（Albumin）

（一）參考值：

1. 受檢率：最近3年平均 $\bar{x}$ *（1±10%）為規定合理範圍，110年為88.52%~100.00%。

2. 合格率：

(1) 血清白蛋白（Albumin） $\geq 3.5\text{gm/dl}$ （BCG法）之百分比：最近3年平均 $\bar{x}$ *（1-10%）為下限，110年為 $\geq 84.78\%$ 。

(2) 血清白蛋白（Albumin） $\geq 3.0\text{gm/dl}$ （BCP法）之百分比：最近3年平均 $\bar{x}$ *（1-10%）為下限，110年為 $\geq 85.45\%$ 。

（二）整體監測結果：

1. 110年血清白蛋白（Albumin）受檢率為98.24%，於參考值範圍，較109年之98.33%微幅下降，持續觀測。


2. 110年血清白蛋白平均值（BCG法）平均值為3.91 gm/dl，其中 $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比為94.38%，於參考值範圍，且較109年之94.32%上升，符合觀測趨勢。

3. 110年血清白蛋白平均值（BCP法）平均值為3.61 gm/dl，其中 $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比為96.15%，於參考值範圍，且較109年之95.74%上升，符合觀測趨勢。

(三) 分區別：

Albumin受檢率：110年各分區統計值皆於參考值範圍。


血液透析_Albumin-受檢率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	97.71%	98.19%	98.35%	98.46%	98.37%	96.88%	98.37%
109年	97.87%	98.33%	98.15%	98.49%	98.20%	96.86%	98.33%
110年	98.14%	98.34%	97.70%	98.31%	98.06%	97.68%	98.24%

Albumin (BCG法) ≥ 3.5 gm/dl之百分比：110年各分區統計值皆於參考值範圍。


血液透析_Albumin(BCG) ≥ 3.5 百分比



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	94.30%	94.13%	94.55%	94.98%	94.50%	93.95%	94.50%
109年	94.59%	94.18%	93.56%	94.50%	94.52%	94.61%	94.32%
110年	94.86%	94.06%	94.25%	94.41%	93.98%	94.50%	94.38%

Albumin (BCP法) ≥ 3.0 gm/dl之百分比：110年各分區統計值（高屏本項院所家數為0）皆於參考值範圍。

血液透析_Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	97.51%	95.36%	92.17%	96.12%	0.00%	84.38%	94.57%
109年	97.59%	96.06%	93.85%	94.57%	0.00%	97.56%	95.74%
110年	96.68%	98.78%	94.23%	95.21%	0.00%	100.00%	96.15%

(四) 層級別：


Albumin受檢率：110年各層級統計值皆於參考值範圍。

血液透析_Albumin-受檢率




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	97.98%	97.96%	97.12%	98.41%	98.37%
109年	97.88%	97.85%	97.18%	98.43%	98.33%
110年	98.20%	97.94%	96.95%	98.23%	98.24%

Albumin（BCG法） ≥ 3.5 gm/dl之百分比：110年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	95.08%	94.36%	92.01%	94.92%	94.50%
109年	94.98%	93.83%	92.02%	94.90%	94.32%
110年	94.52%	93.71%	92.20%	95.04%	94.38%

Albumin（BCP法） ≥ 3.0 gm/dl之百分比：110年各層級統計值（醫學中心本項院所家數為0）皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	92.13%	95.96%	92.81%	96.15%	94.57%
109年	0.00%	95.32%	95.70%	97.73%	95.74%
110年	0.00%	95.54%	97.53%	96.98%	96.15%

指標2：血液透析_尿素氮透析效率-URR

（一）參考值：


1. 受檢率：最近3年平均 $\times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍，110年為88.47%~100.00%。
2. 合格率：URR $\geq 65\%$ 之百分比以最近3年平均 $\times (1 - 10\%)$ 為下限，110年為 $\geq 88.95\%$ 。

（二）整體監測結果：

1. 110年 URR 受檢率為98.19%，於合理範圍，較109年之98.28%微幅下降，持續觀測。
2. 110年 URR $\geq 65\%$ 之百分比98.93%，於參考值範圍，較109年之98.81%上升，持續觀測。


（三）分區別：

URR受檢率：110年各分區統計值皆於合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	97.68%	98.13%	98.32%	98.44%	98.32%	96.78%	98.34%
109年	97.81%	98.22%	98.12%	98.44%	98.15%	96.82%	98.28%
110年	98.09%	98.20%	97.76%	98.30%	97.98%	97.59%	98.19%


URR $\geq$ 65%之百分比：110年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	98.85%	98.63%	98.71%	98.92%	98.96%	98.41%	98.85%
109年	98.78%	98.63%	98.75%	98.92%	98.96%	98.43%	98.81%
110年	98.97%	98.71%	98.82%	99.00%	99.02%	98.37%	98.93%


(四) 層級別：

URR受檢率：110年各層級統計值皆於合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	97.87%	97.89%	97.10%	98.37%	98.34%
109年	97.83%	97.71%	97.13%	98.40%	98.28%
110年	98.07%	97.89%	96.94%	98.18%	98.19%

URR $\geq$ 65%之百分比：110年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	98.79%	98.56%	98.58%	98.88%	98.85%
109年	98.33%	98.47%	98.64%	98.94%	98.81%
110年	98.56%	98.71%	98.80%	99.00%	98.93%

指標3：血液透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近3年平均 $\pm 10\%$ 為規定合理範圍，110年為88.61%~100.00%。
2. 合格率：Hb>8.5g/dL之百分比以最近3年平均 $\pm 10\%$ 為下限，110年為 $\geq 88.69\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 110年 Hb 受檢率為98.46%，於合理範圍，較109年之98.58%呈現微幅下降，持續觀測。
2. 110年 Hb 平均值為10.49g/dL，其中>8.5 g/dL 為98.51%，於參考值範圍，較109年之98.55%微幅下降，尚稱平穩。

(三) 分區別：


Hb受檢率：110年各分區統計值皆於合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	97.68%	98.39%	98.54%	98.60%	98.61%	97.47%	98.52%
109年	98.13%	98.63%	98.46%	98.66%	98.36%	97.51%	98.58%
110年	98.39%	98.60%	97.88%	98.49%	98.41%	97.78%	98.46%

Hb>8.5g/dL之百分比：110年各分區統計值皆於參考值範圍。

血液透析Hb>8.5g/dL百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	98.51%	98.43%	98.48%	98.66%	98.76%	97.60%	98.58%
109年	98.28%	98.54%	98.46%	98.74%	98.92%	97.32%	98.55%
110年	98.41%	98.53%	98.33%	98.70%	98.67%	97.67%	98.51%

(四) 層級別：


Hb受檢率：110年各層級統計值皆於合理範圍。

血液透析-Hb 受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	98.26%	97.93%	97.52%	98.52%	98.52%
109年	98.27%	98.16%	97.48%	98.64%	98.58%
110年	98.63%	98.14%	97.29%	98.41%	98.46%

Hb>8.5g/dL之百分比：110年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	98.88%	98.85%	98.11%	98.31%	98.58%
109年	99.06%	98.68%	98.05%	98.40%	98.55%
110年	98.67%	98.69%	98.22%	98.33%	98.51%

指標4：血液透析_住院率（住院人次/每千人）

（一）參考值：最近3平均值*（1+10%）為上限，110年為 ≤ 468.03 。

1. 醫學中心： ≤ 435.48 。

2. 區域醫院： ≤ 531.68 。


3. 地區醫院： ≤ 503.39 。

4. 基層診所： ≤ 430.65 。

（二）整體監測結果：

110年每千人住院人次為400.41，於參考值範圍，較109年之424.00下降，持續監測。


（三）分區別：110年各分區統計值，皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	423.51	407.79	449.62	454.57	411.05	473.12	430.04
109年	413.44	390.42	443.66	451.29	415.74	486.50	424.00
110年	379.43	365.93	432.03	423.13	403.55	448.65	400.41

(四) 層級別：110年各層級統計值，皆於各層級參考值範圍。


血液透析_住院率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	393.92	485.02	464.82	397.10	430.04
109年	397.65	485.90	454.85	389.31	424.00
110年	369.84	452.30	431.03	371.11	400.41


110年醫學中心的各分區統計值，皆於層級別參考值範圍。

血液透析(醫學中心)_住院率




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	429.88	330.34	419.91	333.33	342.58	485.48	393.92
109年	446.16	370.09	427.87	322.21	334.45	408.95	397.65
110年	405.58	313.48	416.7	299.16	315.88	408.07	369.84

110年區域醫院的各分區統計值，皆於層級別參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	493.04	424.4	512.85	495.44	504.37	445.81	485.02
109年	487.47	410.26	500.59	527.6	512.77	458.85	485.90
110年	451.39	386.37	494.05	444.85	483.94	460.90	452.30

110年地區醫院的各分區統計值，除南區（506.13）、東區（530.20）高於參考值上限，其他分區皆於層級別參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	453.01	430.11	465.16	503.23	482.92	577.55	464.82
109年	434.31	405.67	461.64	518.71	468.50	558.94	454.85
110年	385.47	388.46	438.98	506.13	449.84	530.2	431.03

110年基層診所的各分區統計值，皆於層級別參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	386.51	385.06	414.32	431.89	371.92	427.67	397.10
109年	373.62	365.57	408.75	409.32	383.94	488.89	389.31
110年	345.32	340.25	398.37	398.13	381.03	404.98	371.11

指標5：血液透析_死亡率（死亡人數/每百人）

（一）參考值：


1. 透析時間<1年死亡率：最近3年平均値*（1+10%）為上限，110年為 ≤ 2.50 。
2. 透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近3年平均値*（1+10%）為上限，110年為 ≤ 2.77 。

（二）整體監測結果：

1. 110年透析時間<1年之死亡率為2.39，於參考值範圍，較109年之2.28略為上升，持續觀察。
2. 110年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為2.66，於參考值範圍，較109年之2.48為上升，持續觀察。


（三）分區別：

透析時間<1年之死亡率：110年各分區統計值，除中區（2.67）外，皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	1.99	2.41	2.39	2.38	1.99	2.42	2.20
109年	2.16	2.37	2.78	2.26	1.92	2.26	2.28
110年	2.38	2.42	2.67	2.43	2.06	2.10	2.39


透析時間 ≥ 1 年之死亡率：110年各分區統計值，皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	2.66	2.60	2.63	2.43	2.45	2.80	2.57
109年	2.39	2.48	2.49	2.59	2.45	2.69	2.48
110年	2.67	2.71	2.68	2.69	2.56	2.38	2.66


(四) 層級別：

透析時間 < 1 年之死亡率：110年各層級統計值，除地區醫院（2.55）及基層診所（2.54）外，皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	1.41	1.99	2.79	2.18	2.20
109年	1.57	2.14	2.64	2.31	2.28
110年	1.43	2.27	2.55	2.54	2.39

透析時間 ≥ 1 年之死亡率：110年各層級統計值，除地區醫院（3.04）外，皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	2.05	2.49	3.01	2.53	2.57
109年	1.83	2.38	2.93	2.45	2.48
110年	2.12	2.51	3.04	2.66	2.66

指標6：瘻管重建率（重建人次/每千人月）


（一）參考值：最近3年平均値*（1+10%）為上限，110年為 ≤ 3.46 。

（二）整體監測結果：

110年瘻管重建率為2.64，於參考值範圍，較109年之2.93下降，符合監測趨勢。

（三）分區別：


110年各分區統計值，除中區（5.98）高於參考值上限外，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	2.52	1.95	6.78	3.06	1.19	2.71	3.08
109年	2.20	2.06	6.35	3.24	1.28	1.00	2.93
110年	1.90	1.70	5.98	3.08	1.00	1.45	2.64

(四) 層級別：

110年各層級統計值，除區域醫院（3.65）高於參考值上限外，其他層級於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	3.35	4.36	3.15	2.14	3.08
109年	3.53	4.32	2.84	1.93	2.93
110年	3.11	3.65	3.01	1.74	2.64

指標7：血液透析_脫離率

（一）參考值：


- 1.脫離率（I）-腎功能回復：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。
- 2.脫離率（II）-腎移植：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

（二）整體監測結果：

- 1.110年脫離率（I）腎功能回復為1.21%，較109年之1.46%下降。
- 2.110年脫離率（II）腎移植為0.22%，較109年之0.26%為下降。

（三）分區別：


脫離率（I）-腎功能回復：110年各分區統計值，除東區較109年為上升，其他分區則為下降。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	1.74%	1.48%	1.02%	2.03%	0.81%	1.67%	1.46%
109年	1.81%	1.40%	1.35%	1.75%	0.78%	1.49%	1.46%
110年	1.46%	1.02%	1.30%	1.31%	0.59%	2.31%	1.21%

脫離率（II）-腎移植：110年各分區統計值，除高屏與109年持平，北區較109年為上升外，其他分區為下降。

血液透析_脫離率(II)-腎移植




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	0.37%	0.36%	0.36%	0.21%	0.32%	0.21%	0.33%
109年	0.27%	0.22%	0.25%	0.24%	0.26%	0.71%	0.26%
110年	0.23%	0.27%	0.16%	0.20%	0.26%	0.24%	0.22%

（四）層級別：


脫離率（I）-腎功能回復：110年各層級統計值，除區域醫院較109年為上升外，其他層級皆為下降。

血液透析_脫離率(I)-腎功能回復



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	1.46%	1.33%	1.43%	1.56%	1.46%
109年	1.53%	1.46%	1.65%	1.33%	1.46%
110年	1.32%	1.57%	1.24%	0.92%	1.21%

脫離率（II）-腎移植：110年各層級統計值，除地區醫院較109年為上升外，其他層級為下降。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	0.77%	0.28%	0.31%	0.27%	0.33%
109年	0.77%	0.25%	0.16%	0.22%	0.26%
110年	0.55%	0.18%	0.21%	0.19%	0.22%

指標8：血液透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陽率


（一）參考值：最近3年平均 $\times (1+10\%)$ 為上限，110年為 $\leq 0.27\%$ 。

（二）整體監測結果：

110年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.20%，於參考值範圍，較109年之0.18%為上升，持續觀察。

（三）分區別：


110年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	0.25%	0.29%	0.26%	0.19%	0.30%	0.37%	0.26%
109年	0.21%	0.16%	0.12%	0.12%	0.27%	0.18%	0.18%
110年	0.17%	0.19%	0.20%	0.27%	0.21%	0.12%	0.20%

（四）層級別：

110年各層級統計值，除區域醫院（0.34%）及地區醫院（0.30%）高於參考值上限外，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	0.23%	0.26%	0.20%	0.28%	0.26%
109年	0.10%	0.28%	0.13%	0.17%	0.18%
110年	0.17%	0.34%	0.30%	0.10%	0.20%

指標9：血液透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率


（一）參考值：最近3年平均 $\times (1+10\%)$ 為上限，110年為 $\leq 0.53\%$ 。

（二）整體監測結果：

110年C型肝炎抗體轉陽率為0.50%，於參考值範圍，較109年之0.45%上升，持續觀察。

（三）分區別：


110年各分區統計值，除北區（0.57%）及南區（0.62%）高於參考值上限外，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	0.43%	0.50%	0.57%	0.60%	0.66%	1.18%	0.56%
109年	0.46%	0.47%	0.43%	0.45%	0.37%	0.90%	0.45%
110年	0.48%	0.57%	0.39%	0.62%	0.49%	0.13%	0.50%

（四）層級別：

110年各層級統計值，除區域醫院（0.88%）及地區醫院（0.59%）高於參考值上限，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	0.26%	0.55%	0.51%	0.62%	0.56%
109年	0.16%	0.44%	0.66%	0.41%	0.45%
110年	0.22%	0.88%	0.59%	0.32%	0.50%

指標10：55歲以下血液透析病人移植登錄率

(一) 參考值：最近3年平均 $\times$ (1-10%)為下限，110年為 $\geq 24.51\%$ 。


(二) 整體監測結果：

110年55歲以下血液透析病人移植登錄率為28.33%，於參考值範圍，較109年之27.92%為高，符合監測趨勢。

(三) 分區別：

110年各分區統計值，除高屏（22.9%）低於參考值外，其他分區業務組皆於參考值範圍。

血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	28.61%	25.45%	34.71%	23.67%	21.58%	29.82%	27.55%
109年	29.09%	25.72%	34.79%	24.41%	22.44%	28.43%	27.92%
110年	30.25%	25.71%	34.54%	24.56%	22.90%	28.60%	28.33%

(四) 層級別：

110年各層級統計值，除基層診所（24.04%）略低於參考值外，其他層級於參考值範圍。

血液透析_五十五歲以下透析病人移植登錄率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	42.48%	27.79%	27.25%	23.02%	27.55%
109年	44.13%	28.13%	26.96%	23.61%	27.92%
110年	45.38%	28.34%	27.34%	24.04%	28.33%

指標11：血液透析_鈣磷乘積

（一）參考值：

1. 受檢率：最近3年平均 $\times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍，110年為88.40%~100.00%。
2. 合格率（鈣磷乘積 $< 60 \text{mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比）：最近3年平均 $\times (1 - 10\%)$ 為下限，110年為 $\geq 87.65\%$ 。


（二）整體監測結果：

1. 110年血液透析鈣磷乘積受檢率為98.23%，於合理範圍，較109年之98.32%微幅下降，尚稱平穩。
2. 110年血液透析鈣磷乘積合格率为97.26%，於參考值範圍，較109年之97.45%微幅下降，持續觀測。

（三）分區別：


110年各分區受檢率統計值皆於合理範圍。

血液透析_鈣磷乘積受檢率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	97.49%	98.16%	98.32%	98.40%	98.36%	96.88%	98.29%
109年	97.86%	98.30%	98.12%	98.45%	98.20%	96.77%	98.32%
110年	98.11%	98.32%	97.75%	98.29%	98.04%	97.68%	98.23%


110年各分區合格率統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	96.89%	96.76%	97.13%	97.69%	97.59%	97.88%	97.28%
109年	97.14%	97.44%	97.38%	97.89%	97.28%	96.81%	97.45%
110年	97.24%	97.16%	96.96%	97.80%	96.77%	97.02%	97.26%


(四) 層級別：

110年各層級受檢率統計值皆於合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	97.87%	97.72%	97.09%	98.34%	98.29%
109年	97.84%	97.82%	97.14%	98.42%	98.32%
110年	98.09%	97.93%	96.97%	98.22%	98.23%

110年各層級合格率統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	97.39%	96.99%	96.77%	97.14%	97.28%
109年	96.59%	97.10%	97.19%	97.49%	97.45%
110年	97.10%	96.92%	96.78%	97.18%	97.26%

指標12：血液透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率


（一）參考值：最近3年平均 $\times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍，110年為89.78%~100.00%。

（二）整體監測結果：

110年血液透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率為97.80%，於合理範圍，較109年99.77%下降，持續觀測。

（三）分區別：


110年各分區受檢率皆於合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	99.43%	99.50%	99.50%	99.54%	99.40%	98.52%	99.75%
109年	99.51%	99.58%	99.60%	99.66%	99.43%	98.92%	99.77%
110年	97.20%	97.16%	96.96%	98.33%	97.82%	95.21%	97.80%

（四）層級別

110年各分層級受檢率皆於合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	99.50%	99.69%	98.88%	99.38%	99.75%
109年	99.70%	99.71%	98.81%	99.42%	99.77%
110年	98.36%	97.97%	95.99%	96.16%	97.80%

指標13：血液透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率

（一）參考值：最近3年平均 $\times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍，110年為89.80%~100.00%。


（二）整體監測結果：

110年血液透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率為98.60%，於合理範圍，較109年99.79%下降，持續觀測。

（三）分區別：

110年各分區受檢率皆於合理範圍。

血液透析_C型肝炎表面抗體(anti-HCV)受檢率




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	99.47%	99.54%	99.53%	99.57%	99.43%	98.42%	99.78%
109年	99.56%	99.58%	99.64%	99.62%	99.42%	98.85%	99.79%
110年	98.81%	98.50%	97.25%	98.28%	98.03%	97.65%	98.60%

（四）層級別：

110年各層級受檢率皆於合理範圍。

血液透析_C型肝炎表面抗體(anti-HCV)受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	99.49%	99.72%	98.99%	99.42%	99.78%
109年	99.67%	99.68%	98.88%	99.43%	99.79%
110年	98.71%	98.34%	96.81%	97.40%	98.60%

二、腹膜透析：

指標1：腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白（Albumin）

（一）參考值：

1. 受檢率：最近3年平均値*（ $1\pm 10\%$ ）為規定合理範圍，110年為88.76%~100.00%。

2. 合格率：

(1) 血清白蛋白（Albumin） ≥ 3.5 gm/dl（BCG 法）之百分比：最近3年平均値*（ $1-10\%$ ）為下限，110年為 $\geq 79.87\%$ 。

(2) 血清白蛋白（Albumin） ≥ 3.0 gm/dl（BCP 法）之百分比：最近3年平均値*（ $1-10\%$ ）為下限，110年為 $\geq 81.41\%$ 。

（二）整體監測結果：

1. 110年血清白蛋白（Albumin）受檢率為98.13%，於合理範圍，較109年之98.54%略為下降，持續觀測。


2. 110年血清白蛋白（BCG 法）平均値為3.75 gm/dl，其中 ≥ 3.5 gm/dl 之百分比為89.13%，於參考值範圍，較109年之88.70%略為上升，符合觀測趨勢。

3. 110年血清白蛋白（BCP 法）平均値為3.48 gm/dl，其中 ≥ 3.0 gm/dl 之百分比為96.01%，於參考值範圍，較109年之94.50%為上升，符合監測趨勢。

（三）分區別：


Albumin受檢率：110年各分區統計值皆於合理範圍。

腹膜透析Albumin-受檢率



Albumin（BCG法） ≥ 3.5 gm/dl之百分比：110年各分區統計值皆於參考值範圍。


腹膜透析 Albumin(BCG) ≥ 3.5 百分比



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	89.36%	90.55%	86.84%	89.06%	89.94%	94.52%	89.23%
109年	89.67%	90.59%	83.94%	89.26%	90.53%	90.13%	88.70%
110年	89.97%	89.31%	87.07%	89.12%	90.41%	86.06%	89.13%

Albumin（BCP法） $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：110年各分區統計值皆於參考值範圍（南區、高屏及東區無院所使用此法）。

腹膜透析 Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	92.21%	83.33%	86.30%	84.62%	0.00%	0.00%	88.64%
109年	97.54%	85.71%	92.82%	0.00%	0.00%	0.00%	94.50%
110年	96.55%	87.50%	94.44%	0.00%	0.00%	0.00%	96.01%

（四）層級別：

Albumin受檢率：110年各層級統計值皆於合理範圍。


腹膜透析 Albumin-受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	99.12%	98.67%	90.52%	100.00%	98.44%
109年	99.30%	98.16%	94.54%	98.28%	98.54%
110年	99.03%	98.53%	87.90%	100.00%	98.13%

Albumin（BCG法） ≥ 3.5 gm/dl之百分比：110年各層級統計值皆於參考值範圍。


腹膜透析Albumin(BCG) ≥ 3.5 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	89.17%	89.70%	82.85%	98.36%	89.23%
109年	89.07%	89.11%	81.12%	92.98%	88.70%
110年	89.46%	89.35%	84.22%	92.45%	89.13%

Albumin（BCP法） ≥ 3.0 gm/dl之百分比：110年各層級統計值皆於參考值範圍（基層診所無院所使用此法）。

腹膜透析Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	87.50%	90.68%	82.43%	0.00%	88.64%
109年	96.23%	96.06%	77.59%	0.00%	94.50%
110年	100.00%	95.90%	100.00%	0.00%	96.01%

指標2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

（一）參考值：


1. Weekly Kt/V 受檢率：最近3年平均値*（1±10%）為規定合理範圍，110年為87.67%~100.00%。
2. 合格率：Weekly Kt/V $\geq$ 1.7百分比以最近3年平均値*（1-10%）為下限，110年為 $\geq$ 83.82%。

（二）整體監測結果：

1. 110年 Weekly Kt/V 受檢率為96.58%，於合理範圍，較109年之97.55%略為下降，持續觀察。
2. 110年 Weekly Kt/V 平均値為2.01，其中 $\geq$ 1.7百分比為92.77%，於參考值範圍，較109年之92.38略為上升，符合監測趨勢。


（三）分區別：

Weekly Kt/V受檢率：110年各分區統計值皆於合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	97.13%	96.82%	96.13%	97.70%	97.56%	96.64%	97.07%
109年	97.45%	98.09%	96.54%	97.25%	98.52%	98.70%	97.55%
110年	96.73%	96.60%	94.33%	97.60%	98.05%	96.99%	96.58%


Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比：110年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	93.63%	93.09%	91.53%	95.48%	94.50%	92.36%	93.59%
109年	92.50%	93.62%	89.52%	94.92%	92.17%	94.74%	92.38%
110年	92.43%	92.62%	91.32%	94.71%	93.37%	93.17%	92.77%


(四) 層級別：

Weekly Kt/V 受檢率：110年各層級統計值，皆於合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	97.67%	97.50%	87.68%	98.36%	97.07%
109年	98.03%	97.47%	93.89%	96.55%	97.55%
110年	97.10%	97.23%	87.70%	96.23%	96.58%

Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比：110年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	93.41%	93.54%	94.86%	93.33%	93.59%
109年	92.48%	92.68%	89.77%	85.71%	92.38%
110年	93.05%	93.10%	88.97%	86.27%	92.77%

指標3：腹膜透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近3年平均 $\pm 10\%$ 為規定合理範圍，110年為88.59%~100.00%。
2. 合格率：Hb>8.5 g/dL 之百分比以最近3年平均 $\pm 10\%$ 為下限，110年為 $\geq 87.17\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 110年 Hb 受檢率為98.35%，於合理範圍，較109年之98.44%略為下降，持續觀察。
2. 110年 Hb 平均值為10.25，其中>8.5 g/dL 為97.31%，於參考值範圍，較109年之97.03%微幅上升，符合監測趨勢。


(三) 分區別：

Hb受檢率：110年各分區統計值皆於合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	98.52%	99.49%	96.41%	99.09%	98.11%	96.30%	98.24%
109年	98.37%	99.83%	97.16%	98.26%	98.88%	98.84%	98.44%
110年	99.06%	99.28%	95.46%	98.61%	99.17%	100.00%	98.35%


Hb>8.5 g/dL之百分比：110年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	96.78%	95.76%	95.35%	97.81%	96.83%	96.15%	96.56%
109年	97.81%	97.06%	95.93%	96.47%	96.88%	97.65%	97.03%
110年	97.71%	97.08%	96.30%	97.71%	97.20%	97.85%	97.31%


(四) 層級別

Hb受檢率：110年各層級統計值皆於合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	98.89%	98.54%	89.52%	100.00%	98.24%
109年	99.09%	98.25%	94.36%	97.30%	98.44%
110年	99.09%	99.12%	88.10%	100.00%	98.35%

Hb> 8.5 g/dL之百分比：110年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	96.47%	96.59%	95.12%	100.00%	96.56%
109年	97.35%	96.76%	95.22%	100.00%	97.03%
110年	97.45%	96.95%	97.30%	100.00%	97.31%

指標4：腹膜透析_住院率（住院人次/每千人）

（一）參考值：最近3平均值*（1+10%）為上限，110年為≤470.14。

1. 醫學中心：≤411.42。

2. 區域醫院：≤534.80。

3. 地區醫院：≤537.59。


4. 基層診所：≤643.17。

（二）整體監測結果：

110年每千人住院人次為399.90，於參考值範圍，較109年之421.88為下降，符合監測趨勢。

（三）分區別：


110年各分區統計值，皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	436.40	448.73	434.66	430.32	408.11	603.51	435.28
109年	436.21	409.39	447.16	402.13	387.82	431.89	421.88
110年	402.27	371.20	424.09	386.75	389.78	468.35	399.90


(四) 層級別：

110年各層級統計值，除基層診所（750）高於參考值上限，其他層級統計值皆於各層級參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	374.93	500.44	518.52	575.00	435.28
109年	380.69	464.92	478.46	548.67	421.88
110年	351.18	445.29	468.59	750.00	399.90


110年醫學中心各分區統計值，除東區（469.39）高於參考值外，其他皆於層級別參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	383.21	385.94	392.43	288.30	346.44	644.07	374.93
109年	393.79	341.23	419.71	314.81	353.16	481.48	380.69
110年	349.19	315.79	377.63	278.15	372.74	469.39	351.18

110年區域醫院各分區統計值，皆於層級別參考值範圍。


腹膜透析(區域醫院)_住院率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	512.47	492.00	501.33	521.21	455.38	527.78	500.44
109年	499.46	444.98	491.42	467.71	403.14	348.21	464.92
110年	478.38	395.38	476.31	452.20	390.47	458.33	445.29


110年地區醫院各分區統計值，除南區（565.22）高於參考值上限、東區病人數為0外，其他皆於層級別參考值範圍。

腹膜透析(地區醫院)_住院率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	256.76	500.00	517.24	592.59	684.21	0.00	518.52
109年	343.43	479.67	496.02	387.76	576.58	0.00	478.46
110年	280.99	427.48	516.20	565.22	536.36	0.00	468.59

110年基層診所的各分區統計值，除南區與高屏病人數小於5、臺北及東區病人數為0，不必再與參考值比較外，其他皆於層級別參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	0.00	481.48	382.72	1000.00	1200.00	0.00	575.00
109年	0.00	468.75	347.22	600.00	3000.00	0.00	548.67
110年	0.00	529.41	373.13	3250.00	2333.33	0.00	750.00

指標5：腹膜透析_死亡率（死亡人數/每百人）

（一）參考值

1. 透析時間＜1年死亡率：最近3年平均値*（1+10%）為上限，110年為 ≤ 1.22 。
2. 透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近3年平均値*（1+10%）為上限，110年為 ≤ 1.68 。


（二）整體監測結果：

1. 110年透析時間＜1年之死亡率為1.10，於參考值範圍，較109年之1.07上升，持續觀察。
2. 110年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為1.89，高於參考值，且較109年之1.58上升，持續觀察。

（三）分區別：


透析時間＜1年之死亡率：除臺北（1.23）及中區（1.53）高於參考值外，其他皆於參考值範圍。

腹膜透析_透析時間＜1年之死亡率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	1.20	1.41	2.09	0.19	1.03	1.10	1.28
109年	0.84	1.11	1.25	0.76	1.28	2.01	1.07
110年	1.23	1.10	1.53	1.09	0.48	0.00	1.10


透析時間 ≥ 1 年之死亡率：110年各分區統計值，除臺北（2.16）、北區（2.35）、中區（1.73）及東區（2.71）高於參考值外，其他皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	1.80	1.42	1.31	1.63	1.72	1.81	1.61
109年	1.84	1.79	1.63	1.21	1.24	1.28	1.58
110年	2.16	2.35	1.73	1.54	1.42	2.71	1.89

（四）層級別：


透析時間 < 1 年之死亡率：110年各層級統計值，基層診所病人數小於5，不必再與參考值比較，除醫學中心（0.63）外，其他皆高於參考值。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	0.80	1.71	1.87	0.00	1.28
109年	0.66	1.41	1.43	5.88	1.07
110年	0.63	1.38	2.15	5.88	1.10

透析時間 ≥ 1 年之死亡率：110年各層級統計值，除醫學中心（1.38）外，其他皆高於參考值。

腹膜透析_透析時間 ≥ 1 年之死亡率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	1.34	1.91	2.32	0.51	1.61
109年	1.38	1.84	1.86	1.00	1.58
110年	1.38	2.42	2.88	1.85	1.89

指標6：腹膜透析_腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每100人月數）


（一）參考值：最近3年平均 $\times (1+10\%)$ 為上限，110年為 ≤ 1.54 。

（二）整體監測結果：

110年腹膜炎發生次數為1,199次，腹膜炎發生率為1.53，於參考值範圍，較109年之1.42略為上升，持續監測。

（三）分區別：


110年各分區統計值，除南區（1.26）、東區（1.40）於參考值範圍，其他皆高於參考值。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	1.43	1.26	1.09	1.39	1.32	2.25	1.32
109年	1.68	1.47	1.43	1.30	1.18	0.80	1.42
110年	1.59	1.71	1.56	1.26	1.57	1.40	1.53

（四）層級別：

110年各層級統計值，除區域醫院（1.68）及地區醫院（1.75）高於參考值外，其他皆於參考值。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	1.22	1.50	1.26	0.88	1.32
109年	1.37	1.53	1.40	1.38	1.42
110年	1.42	1.68	1.75	1.18	1.53

指標7：腹膜透析_脫離率

（一）參考值：


- 1.脫離率（I）-腎功能回復：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。
- 2.脫離率（II）-腎移植：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

（二）整體監測結果：

- 1.110年脫離率（I）腎功能回復為0.54%，較109年之1.30%為下降。
- 2.110年脫離率（II）腎移植為1.00%，較109年之1.48%為下降。


（三）分區別：

脫離率（I）-腎功能回復：110年各分區統計值，除南區較109年為上升，其他分區皆較109年下降。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	1.42%	1.55%	0.00%	1.35%	1.27%	0.00%	1.03%
109年	1.93%	0.67%	0.88%	0.75%	1.12%	3.70%	1.30%
110年	0.29%	0.00%	0.00%	1.81%	0.53%	2.63%	0.54%


脫離率（II）-腎移植：110年各分區統計值，除南區較109年為上升，其他分區皆較109年下降。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	1.98%	2.31%	1.72%	1.41%	2.00%	6.06%	1.97%
109年	1.49%	1.92%	1.66%	0.94%	1.20%	2.78%	1.48%
110年	0.91%	1.49%	0.83%	1.08%	0.76%	2.10%	1.00%


（四）層級別：

脫離率（I）-腎功能回復：110年各層級統計值，醫學中心及區域醫院皆較109年下降（地區醫院及基層診所病人數為0）。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	1.35%	0.67%	1.15%	0.00%	1.03%
109年	1.92%	0.70%	0.88%	0.00%	1.30%
110年	0.73%	0.45%	0.00%	0.00%	0.54%

脫離率（II）-腎移植：110年各層級統計值，醫學中心較109年下降，區域醫院較109年略升，地區醫院較109年持平（基層診所病人數為0）。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	2.56%	1.25%	1.63%	0.00%	1.97%
109年	2.14%	0.81%	0.24%	0.00%	1.48%
110年	1.24%	0.82%	0.24%	0.00%	1.00%

指標8：腹膜透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陽率


（一）參考值：最近3年平均 $\times (1+10\%)$ 為上限，110年為 $\leq 0.29\%$ 。

（二）整體監測結果：

110年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.19%，於參考值範圍，較109年之0.20%下降，符合監測趨勢。

（三）分區別：


110年各分區統計值，除北區（0.43%）及南區（0.38%）高於參考值外（高屏及東區病人數為0），其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	0.11%	0.14%	0.54%	0.12%	0.32%	0.00%	0.24%
109年	0.33%	0.28%	0.09%	0.13%	0.11%	0.00%	0.20%
110年	0.17%	0.43%	0.90%	0.38%	0.00%	0.00%	0.19%

(四) 層級別：

110年各層級統計值，除地區醫院（0.31%）高於參考值外（基層診所病人數為0），其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	0.24%	0.27%	0.00%	0.00%	0.24%
109年	0.17%	0.27%	0.00%	0.00%	0.20%
110年	0.10%	0.28%	0.31%	0.00%	0.19%

指標9：腹膜透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率


（一）參考值：最近3年平均 $\times (1+10\%)$ 為上限，110年為 $\leq 0.15\%$ 。

（二）整體監測結果：

110年C型肝炎抗體轉陽率為0.19%，高於參考值範圍，且較109年之0.05%上升，持續監測。

（三）分區別：


110年各分區統計值除臺北（0.27%）、南區（0.24%）及高屏（0.20%）高於參考值外（東區病人數為0），其他分區皆參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	0.05%	0.13%	0.58%	0.12%	0.10%	0.00%	0.19%
109年	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.05%
110年	0.27%	0.13%	0.09%	0.24%	0.20%	0.00%	0.19%

（四）層級別：

110年各層級統計值，除區域醫院（0.4%）高於參考值外（地區醫院及基層診所病人數為0），醫學中心於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	0.19%	0.17%	0.36%	0.00%	0.19%
109年	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	0.05%
110年	0.06%	0.40%	0.00%	0.00%	0.19%

指標10：腹膜透析_55歲以下腹膜透析病人移植登錄率


(一) 參考值：最近3年平均值* (1-10%) 為下限，110年為 $\geq 54.45\%$ 。

(二) 整體監測結果：

110年55歲以下腹膜透析病人移植登錄率為61.56%，於參考值範圍，較109年之61.13%為上升，符合監測趨勢。

(三) 分區別：


110年各分區統計值，除高屏（48.19%）及東區（52.63%）低於參考值外，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	60.56%	57.84%	72.08%	60.04%	47.37%	63.01%	60.42%
109年	64.23%	56.83%	71.85%	58.81%	47.37%	63.08%	61.13%
110年	63.89%	57.14%	71.62%	63.25%	48.19%	52.63%	61.56%

(四) 層級別：

110年各層級統計值，除醫學中心（70.64%）於參考值範圍外，其他層級皆低於參考值。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
108年	66.92%	52.06%	48.00%	46.43%	60.42%
109年	68.32%	51.26%	54.60%	44.83%	61.13%
110年	70.64%	49.29%	51.74%	48.00%	61.56%

指標11：腹膜透析_鈣磷乘積

（一）參考值：


1. 受檢率：最近3年平均 $\times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍，110年為88.70%~100.00%。
2. 合格率（鈣磷乘積 $< 60 \text{mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比）：最近3年平均 $\times (1 - 10\%)$ 為下限，110年為 $\geq 86.07\%$ 。

（二）整體監測結果：

1. 110年腹膜透析鈣磷乘積受檢率為98.06%，於合理範圍，較109年之98.53%為下降，持續觀察。
2. 110年腹膜透析鈣磷乘積合格率为95.54%，於參考值範圍，較109年之95.72%為下降，持續觀察。


（三）分區別：

110年各分區受檢率統計值，皆於合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	98.71%	99.47%	96.86%	98.85%	98.54%	97.99%	98.41%
109年	98.66%	99.89%	97.45%	98.20%	98.77%	98.70%	98.53%
110年	98.62%	99.47%	95.23%	98.25%	99.11%	99.40%	98.06%


110年各分區合格率統計值，皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	94.95%	96.26%	96.28%	96.41%	94.89%	95.21%	95.64%
109年	95.05%	95.54%	95.78%	96.52%	96.18%	95.39%	95.72%
110年	94.94%	95.83%	95.67%	96.34%	95.25%	96.36%	95.54%


(四) 層級別：

110年各層級受檢率統計值，皆於合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	99.07%	98.67%	90.52%	100.00%	98.41%
109年	99.30%	98.16%	94.32%	98.28%	98.53%
110年	99.03%	98.53%	86.90%	100.00%	98.06%

110年各層級合格率統計值，皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	95.75%	95.32%	94.24%	100.00%	95.64%
109年	96.00%	95.44%	94.21%	98.25%	95.72%
110年	95.64%	95.41%	94.43%	98.11%	95.54%

指標12：腹膜透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率


（一）參考值：最近3年平均 $\times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍，110年為89.80%~100.00%。

（二）整體監測結果：

110年腹膜透析_B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率為96.28%，於合理範圍，較109年99.82%略為下降，呈平穩趨勢。

（三）分區別：


110年各分區受檢率，皆於合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	99.95%	99.86%	99.91%	100.00%	99.78%	100.00%	99.91%
109年	99.67%	99.86%	99.81%	99.87%	99.89%	100.00%	99.82%
110年	96.50%	96.67%	95.15%	97.99%	93.92%	97.56%	96.28%

（四）層級別

110年各層級受檢率，皆於合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	99.97%	99.91%	99.25%	100.00%	99.91%
109年	99.79%	99.82%	100.00%	100.00%	99.82%
110年	95.66%	97.26%	93.42%	91.11%	96.28%

指標13：腹膜透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率


（一）參考值：最近3年平均 $\times (1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，110年為89.81%~100.00%。

（二）整體監測結果：

110年腹膜透析_C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率為96.36%，於合理範圍，較109年99.83%下降，呈平穩趨勢。

（三）分區別：


110年各分區受檢率，皆於合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	99.95%	100.00%	99.92%	100.00%	99.80%	100.00%	99.93%
109年	99.69%	99.87%	99.83%	99.88%	100.00%	100.00%	99.83%
110年	96.52%	96.53%	95.36%	98.08%	94.35%	96.85%	96.36%

（四）層級別

110年各層級受檢率，皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
108年	99.97%	99.91%	99.64%	100.00%	99.93%
109年	99.81%	99.83%	100.00%	100.00%	99.83%
110年	95.73%	97.18%	94.59%	91.84%	96.36%

三、整體透析


指標1 醫療費用核減率

(一) 整體監測結果：

110年初核核減率為0.02%，較109年之0.04%為下降。

(二) 分區別：

110年各分區初核核減率，除臺北較109年持平外，其他分區皆較109年呈現下降。



年季	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
108年	0.01%	0.33%	0.08%	0.01%	0.01%	0.00%	0.07%
109年	0.01%	0.15%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
110年	0.01%	0.10%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%

指標2 C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率

(一) 參考值：為110年新增項目，尚無參考值。

(二) 整體監測結果：

110年C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率
81.06%。

(三) 分區別：

年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
110年	74.71%	85.06%	79.78%	84.85%	79.86%	91.80%	81.06%

(四) 層級別：

年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
110年	83.52%	83.95%	82.90%	78.53%	81.06%

指標3 HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率

(一) 參考值：為110年新增項目，尚無參考值。

(二) 整體監測結果：

110年HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率
93.85%。

(三) 分區別：

年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
110年	92.04%	91.90%	95.39%	95.65%	93.90%	93.26%	93.85%

(四) 層級別：

年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
110年	95.59%	94.76%	92.39%	93.85%	93.85%

肆、結論：

- 一、110年門診透析醫療品質資訊公開指標共計29項，除腎功能回復脫離率、腎移植脫離率及醫療費用核減率列為參考指標，其他訂定參考值之各該指標，於血液透析部分110年全署統計值皆於參考值範圍內；腹膜透析部分除「基層診所住院率」、「透析時間 ≥ 1 年之死亡率」及「C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率」未符合參考值外，其餘指標全國值均符合參考值範圍內（如附錄之表1）。
- 二、各指標各分區統計值彙整如附錄之表2，各分區統計值與參考值相較，大部分符合參考值範圍，符合監測趨勢。負向指標分區別未符合監測目標之項目：血液透析之住院率、透析時間 < 1 年死亡率、瘻管重建率及C型肝炎抗體轉陽率與腹膜透析之住院率、透析時間 < 1 年死亡率、透析時間 ≥ 1 年死亡率、腹膜炎發生率、B型肝炎表面抗原轉陽率及C型肝炎抗體轉陽率各有分區高於參考值上限。正向指標分區別未符合監測目標之項目：血液透析與腹膜透析之55歲以下透析病人移植登錄率各有分區低於參考值下限。
- 三、於分區別部分未符合監測目標之項目，相關分區業務組已持續加強注意，請院所對未達參考值之指標項目自主管理並視情況函請院所說明原因，以釐清醫療品質是否異常。本報告指標涉臨床專業，建請台灣腎臟醫學會瞭解原因，適時輔導會員。

附錄- 表1、110年整體性監測結果表：

指標名稱	指標 正負向	參考值* (110年)	監測結果之趨勢
血液透析			
指標1：營養狀態			
血清白蛋白 (Albumin)-受檢率	規定合 理範圍	88.52%~100.00% ○	110年受檢率為98.24%，較 109年之98.33%略降，於合 理範圍。
血清白蛋白 (BCG) ≥3.5之百分比	正向	≥84.78% ○	Albumin (BCG) ≥3.5 gm/dl 百分比之110年統計值為 94.38%，較109年之94.32% 上升。
血清白蛋白 (BCP) ≥3.0之百分比	正向	≥85.45% ○	Albumin (BCP) ≥3.0 gm/dl 百分比之110年統計值為 96.15%，較109年之95.74% 上升。 110年2種檢測方法之監測結 果皆於參考值範圍。
指標2：尿素氮透析效 率URR-受檢率	規定合 理範圍	88.47%~100.00% ○	110年URR-受檢率98.19%， 較109年之98.28%下降，於 合理範圍。
URR≥65%之百分比	正向	≥88.95% ○	110年URR≥65%之百分比為 98.93%，較109年之98.81% 上升，於參考值範圍。
指標3：			
Hb-受檢率	規定合 理範圍	88.61%~100.00% ○	110年Hb受檢率為98.46%， 較109年之98.58%略降，於 合理範圍。
Hb>8.5g/dL之百分比	正向	≥88.69% ○	110年Hb>8.5g/dL之百分比為 98.51%，較109年之98.55% 略降，且於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (110年)		監測結果之趨勢
指標4： 同院住院率（住院人次/每千人）	負向	醫學中心	≤ 435.48 ○	110 年每千人住院人次為 400.41，較 109 年之 424 下降，於全署參考值（468.03）範圍。各層級統計值分別為 369.84、452.30、431.03、371.11 亦於各層級參考值範圍。
		區域醫院	≤ 531.68 ○	
		地區醫院	≤ 503.39 ○	
		基層診所	≤ 430.65 ○	
指標5： 死亡率（死亡人數/每百人）	透析時間 < 1 年 負向	≤ 2.50 ○		110 年透析時間 < 1 年之死亡率為 2.39，較 109 年之 2.28 略升，於參考值範圍。
	透析時間 ≥ 1 年 負向	≤ 2.77 ○		110 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為 2.66，較 109 年之 2.48 略升，於參考值範圍。
指標6： 瘻管重建率（重建次數/每千人月）	負向	≤ 3.46 ○		110 年瘻管重建率為 2.64，較 109 年之 2.93 下降，於參考值範圍。
指標7： 脫離率（百分比） 脫離率（I）-腎功能回復 脫離率（II）-腎移植	參考	- -		110 年「脫離率（I）-腎功能回復」為 1.21%，較 109 年 1.46% 下降。 110 年「脫離率（II）-腎移植」為 0.22%，較 109 年之 0.26% 下降。
指標8： B 型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陽率（百分比）	負向	$\leq 0.27\%$ ○		110 年 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.20%，較 109 年之 0.18% 上升，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (110年)		監測結果之趨勢
指標9： C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率（百分比）	負向	≤0.53% ○		110年C型肝炎抗體轉陽率為0.50%，較109年之0.45%上升，於參考值範圍。
指標10： 55歲以下血液透析病人移植登錄率（百分比）	正向	≥24.51% ○		110年55歲以下血液透析病人移植登錄率為28.33%，較109年之27.92%上升，於參考值範圍。
指標11： 鈣磷乘積	規定合理範圍	受檢率	88.40%~100.00% % ○	110年鈣磷乘積受檢率為98.23%，較109年之98.32%下降，於合理範圍。
	正向	鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	≥87.65% ○	110年鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ² 為97.26%，較109年之97.45%下降，於參考值範圍。
指標12： B型肝炎表面抗原（HBsAg）受檢率	規定合理範圍	89.78%~100.00% ○		110年B型肝炎表面抗原受檢率為97.80%，較109年之99.77%下降，於合理範圍。
指標13： C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率（百分比）	規定合理範圍	89.80%~100.00% ○		110年C型肝炎抗體受檢率為98.60%，較109年之99.79%略降，於合理範圍。
腹膜透析				
指標1：營養狀態 血清白蛋白（Albumin）-受檢率	規定合理範圍	88.76%~100.00% ○		110年 Albumin 受檢率為98.13%，較109年之98.54%下降，於合理範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (110年)		監測結果之趨勢
血清白蛋白 (BCG) ≥3.5之百分比	正向	≥79.87% ○		110年 Albumin (BCG) ≥ 3.5 gm/dl百分比為89.13%，較109年之88.70%上升，於參考值範圍。
血清白蛋白 (BCP) ≥3.0之百分比	正向	≥81.41% ○		110年 Albumin (BCP) ≥ 3.0 gm/dl 百分比之統計值為96.01%，較109年之94.50%上升，於參考值範圍。
指標2：尿素氮透析效率 Weekly Kt/V-受檢率	規定合理範圍	87.67%~100.00% ○		110年 Weekly Kt/V-受檢率為96.58%，較109年之97.55%為下降，於合理範圍。
Weekly Kt/V≥1.7之百分比	正向	≥83.82% ○		110年Weekly Kt/V≥1.7百分比為92.77%，較109年之92.38%略升，於參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率	規定合理範圍	88.59%~100.00% ○		110年Hb受檢率為98.35%，較109年之98.44%略降，於合理範圍。
Hb>8.5g/dL之百分比	正向	≥87.17% ○		110年Hb>8.5g/dL之百分比為97.31%，較109年之97.03%上升，於參考值範圍。
指標4： 住院率（住院人次/每千人）	負向	醫學中心	≤411.42 ○	110年每千人住院人次為399.9，較109年之421.88下降，於全署參考值（470.14）範圍。各層級統計值分別為351.18、445.29、468.59、750除基層診所高於參考值上限外，其他層級統計值皆於各層
		區域醫院	≤534.80 ○	
		地區醫院	≤537.59 ○	
		基層診所	≤643.17 >	

指標名稱	指標 正負向	參考值* (110年)		監測結果之趨勢
				級參考值範圍。
指標5： 死亡率（死亡人數/每百人）	透析時間<1年 負向	≤ 1.22 ○		110年透析時間<1年之死亡率為1.10，較109年之1.07上升，於參考值範圍。
	透析時間 ≥ 1 年 負向	≤ 1.68 >		110年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為1.89，較109年之1.58上升，高於參考值範圍。
指標6： 腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每100人月）	負向	≤ 1.54 ○		110年腹膜炎發生率為1.53，較109年1.42上升，於參考值範圍。
指標7： 脫離率（百分比） 脫離率（I）-腎功能回復 脫離率（II）-腎移植	參考	-- --		110年「脫離率（I）-腎功能回復」為0.54%，較109年之1.30%下降。 110年「脫離率（II）-腎移植」為1.0%，較109年之1.48%下降。
指標8： B型肝炎表面抗原（HBsAg）轉陽率（百分比）	負向	$\leq 0.29\%$ ○		110年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.19%，較109年之0.20%略降，於參考值範圍。
指標9： C型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率（百分比）	負向	$\leq 0.15\%$ >		110年C型肝炎抗體轉陽率為0.19%，較109年之0.05%上升，高於參考值範圍。
指標10： 55歲以下腹膜透析病人移植登錄	正向	$\geq 54.45\%$ ○		110年55歲以下腹膜透析病人移植登錄率為61.56%，較

指標名稱	指標 正負向	參考值* (110年)		監測結果之趨勢
率				109年之61.13%上升，於參考值範圍。
指標11： 鈣磷乘積	規定合理範圍	受檢率	88.70%~100.00 % ○	110年鈣磷乘積受檢率為98.06%，較109年之98.53%下降，於合理範圍。
	正向	鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	≥86.07% ○	110年鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ² 為95.54%，較109年之95.72%下降，於參考值範圍。
指標12： B型肝炎表面抗原 (HBsAg) 受檢率（百分比）	規定合理範圍	89.80%~100.00% ○		110年B型肝炎表面抗原受檢率為96.28%，較109年之99.82%下降，於合理範圍。
指標13： C型肝炎抗體（anti-HCV）受檢率（百分比）	規定合理範圍	89.81%~100.00% ○		110年C型肝炎抗體轉陽率為96.36%，較109年之99.83%下降，於合理範圍。
整體透析指標				
指標1：醫療費用核減率	參考	--		110年初核核減率為0.02%，較109年之0.04%為下降。
指標2：C型肝炎病人抗體陽性慢性血液透析病人HCV RNA檢查率	正向	110年度新增指標，故無參考值。		110年C型肝炎病人抗體陽性慢性血液透析病人HCV RNA檢查率為81.06%。
指標3：HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率	正向	110年度新增指標，故無參考值。		110年HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率為93.85%。

【註】*「○」表該項整體性之醫療品質資訊項目於參考值範圍

「>」表該項整體性之醫療品質資訊項目高於參考值上限

附錄- 表2、110年分區別指標監測結果彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	血液透析部分																	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.14%	98.34%	97.70%	98.31%	98.06%	97.68%	98.24%	合理範圍	88.52%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCG)家數	216	89	137	108	133	19	702									
		Albumin(BCG)平均值	3.91	3.87	3.98	3.91	3.89	3.93	3.91									
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	94.86%	94.06%	94.25%	94.41%	93.98%	94.50%	94.38%	正向	≥84.78%	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	10	2	6	8	0	1	27									
		Albumin-平均值(BCP)	3.68	3.69	3.45	3.69	0.00	3.82	3.61									
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	96.68%	98.78%	94.23%	95.21%	0.00%	100.00%	96.15%	正向	≥85.45%	○	○	○	○	<	○	○
2	URR(102年新增項目,取代原Kt/V)	URR-受檢率	98.09%	98.20%	97.76%	98.30%	97.98%	97.59%	98.19%	合理範圍	88.47%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		URR-平均值	75.36	75.06	74.38	74.54	74.49	73.94	74.81									
		URR≥65%百分比	98.97%	98.71%	98.82%	99.00%	99.02%	98.37%	98.93%	正向	≥88.95%	○	○	○	○	○	○	○
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	98.39%	98.60%	97.88%	98.49%	98.41%	97.78%	98.46%	合理範圍	88.61%~100%	○	○	○	○	○	○	○
		Hb-平均值	10.50	10.43	10.47	10.48	10.56	10.35	10.49									
		Hb> 8.5百分比	98.41%	98.53%	98.33%	98.70%	98.67%	97.67%	98.51%	正向	≥88.69%	○	○	○	○	○	○	○
4	住院率(110下半年)	醫學中心	住院次數	1,112	190	534	197	528	137	2,697								
			住院率(住院次數/每千人)	405.58	313.48	416.70	299.16	315.88	408.07	369.84	負向	≤435.48	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	住院次數	2,234	1,242	1,745	1,329	1,333	221	8,103								
			住院率(住院次數/每千人)	451.39	386.37	494.05	444.85	483.94	460.90	452.30	負向	≤531.68	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	1,151	1,553	1,660	1,217	1,061	277	6,917								
			住院率(住院次數/每千人)	385.47	388.46	438.98	506.13	449.84	530.20	431.03	負向	≤503.39	○	○	○	>	○	>
		基層診所	住院次數	4,513	1,649	2,664	2,899	3,117	309	15,150								
			住院率(住院次數/每千人)	345.32	340.25	398.37	398.13	381.03	404.98	371.11	負向	≤430.65	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人)	透析時間<1年之死亡率	2.38	2.42	2.67	2.43	2.06	2.10	2.39	負向	≤2.50	○	○	>	○	○	○	○
		透析時間≥1年之死亡率	2.67	2.71	2.68	2.69	2.56	2.38	2.66	負向	≤2.77	○	○	○	○	○	○	○
		瘻管重建次數	220	106	449	198	73	15	1,061									
6	瘻管重建率(110下半年)	瘻管重建率(人次/每千人月)	1.90	1.70	5.98	3.08	1.00	1.45	2.64	負向	≤3.46	○	○	>	○	○	○	○
		腎功能恢復人數	44	15	24	21	10	6	120									
7	脫離率(110下半年)	脫離率(I)-腎功能回復	1.46%	1.02%	1.30%	1.31%	0.59%	2.31%	1.21%	合理範圍	不另訂定	-	-	-	-	-	-	-
		腎移植人數	51	33	24	26	37	5	176									
		脫離率(II)-腎移植	0.23%	0.27%	0.16%	0.20%	0.26%	0.24%	0.22%	合理範圍	不另訂定	-	-	-	-	-	-	-
8	B型肝炎表面抗原轉陽率(110全年)	轉陽人數	31	19	24	28	25	2	129									
		陰性人數	18,575	9,878	11,861	10,352	11,667	1,649	63,437									
		轉陽率	0.17%	0.19%	0.20%	0.27%	0.21%	0.12%	0.20%	負向	≤0.27%	○	○	○	○	○	○	○
9	C型肝炎抗體轉陽率(110全年)	轉陽人數	92	57	46	62	57	2	316									
		陰性人數	19,058	9,972	11,836	10,058	11,536	1,575	63,477									
		轉陽率	0.48%	0.57%	0.39%	0.62%	0.49%	0.13%	0.50%	負向	≤0.53%	○	>	○	>	○	○	○
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率(110全年)	登錄人數	1328	705	993	589	652	139	4397									
		病患人數	4,390	2,742	2,875	2,398	2,847	486	15,523									
		登錄率(百分比)	30.25%	25.71%	34.54%	24.56%	22.90%	28.60%	28.33%	正向	≥24.51%	○	○	○	○	<	○	○
11	鈣磷乘積指標(110下半年)	鈣磷乘積-受檢率	98.11%	98.32%	97.75%	98.29%	98.04%	97.68%	98.23%	合理範圍	88.40%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
		鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	97.24%	97.16%	96.96%	97.80%	96.77%	97.02%	97.26%	正向	≥87.65%	○	○	○	○	○	○	○
12	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率(110全年)	申報HBsAg檢驗值之人數	18,055	9,597	11,500	10,179	11,413	1,570	62,040									
		B肝-前一年之陰性人數	18,575	9,878	11,861	10,352	11,667	1,649	63,437									
		B肝-受檢率	97.20%	97.16%	96.96%	98.33%	97.82%	95.21%	97.80%	合理範圍	89.78%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
13	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率(110全年)	申報Anti-HCV檢驗值之人數	18,832	9,822	11,511	9,885	11,309	1,538	62,590									
		C肝-前一年之陰性人數	19,058	9,972	11,836	10,058	11,536	1,575	63,477									
		C肝-受檢率	98.81%	98.50%	97.25%	98.28%	98.03%	97.65%	98.60%	合理範圍	89.80%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.67%	99.36%	95.55%	98.25%	99.11%	99.40%	98.13%	合理範圍	88.76%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	25	19	24	18	16	4	106										
		Albumin(BCG)平均值	3.80	3.78	3.69	3.75	3.76	3.62	3.75										
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	89.97%	89.31%	87.07%	89.12%	90.41%	86.06%	89.13%	正向	≥79.87%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	6	1	4	0	0	0	11										
		Albumin-平均值(BCP)	3.50	3.18	3.37	0.00	0.00	0.00	3.48										
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	96.55%	87.50%	94.44%	0.00%	0.00%	0.00%	96.01%	正向	≥81.41%	○	○	○	<	<	<	○	
2	Weekly Kt/V(110下半年)	Weekly Kt/V-受檢率	96.73%	96.60%	94.33%	97.60%	98.05%	96.99%	96.58%	合理範圍	87.67%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	2.00	2.08	1.97	2.03	2.02	2.05	2.01										
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	92.43%	92.62%	91.32%	94.71%	93.37%	93.17%	92.77%	正向	≥83.82%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	99.06%	99.28%	95.46%	98.61%	99.17%	100.00%	98.35%	合理範圍	88.59%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.43	10.31	10.05	10.19	10.18	10.18	10.25										
		Hb>8.5百分比	97.71%	97.08%	96.30%	97.71%	97.20%	97.85%	97.31%	正向	≥87.17%	○	○	○	○	○	○	○	
4	住院率(110下半年)	醫學中心	住院次數	463	114	323	126	248	46	1,319									
			住院率(住院次數/每千人)	349.19	315.79	377.63	278.15	372.74	469.39	351.18	負向	≤411.42	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	432	163	196	272	193	28	1,282									
			住院率(住院次數/每千人)	478.38	395.38	476.31	452.20	390.47	458.33	445.29	負向	≤534.80	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	17	56	112	13	30	0	228									
			住院率(住院次數/每千人)	280.99	427.48	516.20	565.22	536.36	0.00	468.59	負向	≤537.59	○	○	○	>	○	○	○
		基層診所	住院次數	0	9	13	7	4	0	41									
住院率(住院次數/每千人)	0.00	529.41	373.13	3250.00	2333.33	0.00	750.00	負向	≤643.17	○	○	○	>	>	○	>			
5	死亡率 (人/每百人)	遠析時間<1年之死亡率	1.23	1.10	1.53	1.09	0.48	0.00	1.10	負向	≤1.22	>	○	>	○	○	○	○	
		遠析時間≥1年之死亡率	2.16	2.35	1.73	1.54	1.42	2.71	1.89	負向	≤1.68	>	>	>	○	○	>	>	
6	腹膜炎發生率(110下半年)	腹膜炎發生次數	399	173	255	149	213	24	1,199										
		腹膜炎發生率 (人次/每百人月)	1.59	1.71	1.56	1.26	1.57	1.40	1.53	負向	≤1.54	>	>	>	○	>	○	○	
7	脫離率(110下半年)	腎功能恢復人數	1	0	0	3	1	1	6										
		脫離率(I)-腎功能回復	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.01%	0.03%	0.01%	合理範圍	不另訂定	-	-	-	-	-	-	-	
		腎移植人數	19	12	11	11	8	3	64										
		脫離率(II)-腎移植	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	合理範圍	不另訂定	-	-	-	-	-	-	-	
8	B型肝炎表面抗原轉陽率(110全年)	轉陽人數	3	3	1	3	0	0	10										
		陰性人數	1743	691	1073	797	921	123	5329										
		轉陽率	0.17%	0.43%	0.09%	0.38%	0.00%	0.00%	0.19%	負向	≤0.29%	○	>	○	>	○	○	○	
9	C型肝炎抗體轉陽率(110全年)	轉陽人數	5	1	1	2	2	0	11										
		陰性人數	1867	749	1164	834	992	127	5713										
		轉陽率	0.27%	0.13%	0.09%	0.24%	0.20%	0.00%	0.19%	負向	≤0.15%	>	○	○	>	>	○	>	
10	五十五歲以下透析病人移植 登錄率	登錄人數	651	284	482	296	267	40	2,016										
		病患人數	1,019	497	673	468	554	76	3,275										
		登錄率(百分比)	63.89%	57.14%	71.62%	63.25%	48.19%	52.63%	61.56%	正向	≥54.45%	○	○	○	○	<	<	○	
11	鈣磷乘積指標(110下半年)	鈣磷乘積-受檢率	0.99%	0.99%	0.95%	0.98%	0.99%	0.99%	0.98%	合理範圍	88.70%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		鈣磷乘積<60 mg2/dL2	0.95%	0.96%	0.96%	0.96%	0.95%	0.96%	0.96%	正向	≥86.07%	○	○	○	○	○	○	○	
12	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受 檢率(110全年)	申報HBsAg檢驗值之人數	1,682	668	1,021	781	865	120	5,131										
		B肝-前一年之陰性人數	1,743	691	1,073	797	921	123	5,329										
		B肝-受檢率	0.97%	0.97%	0.95%	0.98%	0.94%	0.98%	0.96%	合理範圍	89.80%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
13	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢 率(110全年)	申報Anti-HCV檢驗值之人數	1,802	723	1,110	818	936	123	5,505										
		C肝-前一年之陰性人數	1,867	749	1,164	834	992	127	5,713										
		C肝-受檢率	0.97%	0.97%	0.95%	0.98%	0.94%	0.97%	0.96%	合理範圍	89.81%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	整體透析(血液與腹膜合併計算)																	
1	醫療費用核減率(初核)(104年新增)		0.01%	0.10%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	合理範圍	無	-	-	-	-	-	-	-
2	HCV RNA檢查率(110年新增)	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA-檢查率(年)	74.71%	85.06%	79.78%	84.85%	79.86%	91.80%	81.06%	正向	-	-	-	-	-	-	-	-
3	抗病毒藥物治療率(110年新增)	HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物-治療率(年)	92.04%	91.90%	95.39%	95.65%	93.90%	93.26%	93.85%	正向	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：

- 一、 依衛福部109年2月6日衛部保字第1091260018號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
- 二、 110年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值 x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值 x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。
- 三、 > 為高於參考值上限，< 為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。
- 四、 本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。