

106 年

門診透析整體性醫療品質資訊公開報告



衛生福利部

中央健康保險署

107 年 7 月

目 錄

壹、前言	1
貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義	2
參、指標值監測結果	15
一、血液透析	15
指標 1：血液透析_血清白蛋白 (Albumin)	15
指標 2：血液透析_尿素氮透析效率-URR	20
指標 3：血液透析_貧血檢查-Hb	24
指標 4：血液透析_住院率 (住院次數/每 100 人月)	28
指標 5：血液透析_死亡率 (死亡個案數/每 100 人月)	40
指標 6：瘻管重建率(重建次數/每 100 人月)	53
指標 7：血液透析_脫離率	57
指標 8：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率	61
指標 9：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率	63
指標 10：55 歲以下血液透析病人移植登錄率	65
指標 11：血液透析_鈣磷乘績	67
二、腹膜透析：	70
指標 1：腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)	70
指標 2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V	76
指標 3：腹膜透析_貧血檢查-Hb	80
指標 4：腹膜透析_住院率 (住院次數/每 100 人月)	84
指標 5：腹膜透析_死亡率 (死亡個案數/每 100 人月)	96
指標 6：腹膜透析_腹膜炎發生率 (發生腹膜炎次數/每 100 人月)	108
指標 7：腹膜透析_脫離率	110
指標 8：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率	114
指標 9：腹膜透析_C 型肝炎抗體 (anti-HCV) 轉陽率	116
指標 10：腹膜透析_55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率	118
指標 11：腹膜透析_鈣磷乘績	120
三、整體透析	123
指標 1 醫療費用核減率	123
肆、結論：	124
附錄 -表 1、106 年整體性監測結果表：	125
附錄 - 表 2、106 年分區別指標監測結果彙整表	132

壹、 前言

● 緣起：

本報告係依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜，分為血液透析、腹膜透析及整體透析 3 大部分，呈現各指標之操作型定義、整體與 6 個健保分區及醫療院所各層級別之監測統計。本報告資料係依健保申報資料及透析院所上傳至健保署 VPN 系統資料所編製。

● 意義：

本報告指標項目依其特性區分為正向指標、負向指標、及非絕對正向或負向指標。對正向指標之監測目的，在於期待指標數值呈上升或平穩但維持高於某一數值之趨勢，若呈現明顯下降趨勢，則需進一步瞭解原因；反之，對負向指標，則期待指標數值呈下降或平穩但維持低於某一數值之趨勢，若呈現明顯上升趨勢，則需進一步瞭解原因；對於非絕對正向或負向指標之監測目的，在於期待指標數值呈平穩趨勢，若呈現巨幅變動，則需進一步瞭解原因。

● 特別聲明：

本報告資料無法反映完整醫療過程與結果，因此，指標數字的表現可能為多重原因造成，醫療適當性仍需就病人情形由醫療專業認定，不應直接認定反映品質，請使用者審慎解讀。

註 1；健保署 6 個分區係指中央健康保險署臺北、北區、中區、南區、高屏及東區等六個分區服務範圍。

貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義

第一部分：血液透析

指標1. 血清白蛋白 (Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) 人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法) 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) BCG法或BCP法人數。

二、參考值 (106年)：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.23%~100%。

(二) 合格率： ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法) 之百分比分別為 $\geq 84.51\%$ 、 $\geq 83.51\%$ 。

三、監測頻率：每3個月 (每季別呈現指標數值)。

指標2. 尿素氮透析效率-URR

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：分母病人檢驗URR人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值：

分子：申報URR檢驗值之總和。

分母：申報URR檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗URR $\geq$ 65%之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗URR人數。

二、參考值（106年）：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.15%~100%。

(二) 合格率： $\geq$ 65% 之百分比為 $\geq$ 88.99%。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Hb $>$ 8.5g/dL之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值（106年）：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.41%~100%。

(二) 合格率： $>$ 8.5g/dL之百分比為 $\geq$ 88.70%。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標4. 住院率

一、公式說明：

(一) 跨院住院率

分子：追蹤期間所有病人之跨院總住院次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

(二) 同院住院率

分子：追蹤期間所有病人之同院總住院次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、參考值（106年）：本項為負向指標。

(一) 跨院住院率：

1. 醫學中心： ≤ 13.37 。
2. 區域醫院： ≤ 14.81 。
3. 地區醫院： ≤ 14.01 。
4. 基層診所： ≤ 10.21 。

(二) 同院住院率：

1. 醫學中心： ≤ 11.45 。
2. 區域醫院： ≤ 11.73 。
3. 地區醫院： ≤ 4.89 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間 <1 年之死亡率

分子：追蹤期間透析小於1年之死亡個案數*100。

分母：追蹤期間透析小於1年之總病人月數。

(二) 透析時間 ≥ 1 年之死亡率

分子：追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數*100。

分母：追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數。

二、參考值（106年）：本項為負向指標。

(一) 透析時間 <1 年死亡率：

1. 醫學中心： ≤ 1.10 。
2. 區域醫院： ≤ 1.22 。
3. 地區醫院： ≤ 1.57 。
4. 基層診所： ≤ 1.13 。

(二)透析時間 ≥ 1 年死亡率：

1. 醫學中心： ≤ 1.09 。
2. 區域醫院： ≤ 1.20 。
3. 地區醫院： ≤ 1.35 。
4. 基層診所： ≤ 1.08 。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標6. 瘻管重建率

一、公式說明：

(一) 跨院瘻管重建率

分子：追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

(二) 同院瘻管重建率

分子：追蹤期間所有病人於同院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、參考值（106年）：本項為負向指標。

(一) 跨院瘻管重建率： ≤ 0.57 。

(二) 同院瘻管重建率： ≤ 0.15 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一) 脫離率(I)-腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二) 脫離率(II)-因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值（106年）：本項列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標8. B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，106年參考值為 $\leq 0.40\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，106年參考值為 $\leq 0.71\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下血液透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下血液透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下血液透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，106年參考值為 $\geq 20.11\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標11. 鈣磷乘積

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：分母病人測量鈣磷乘積人數。

分母：慢性血液透析病人數。

（二）合格率

分子：分母病人測量鈣磷乘積 $< 60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數

分母：慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。

二、參考值（106年）：本項為正向指標。

（一）受檢率：規定合理範圍，本項為106年新增指標。

（二）合格率： $< 60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比，本項為106年新增指標。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

第二部分：腹膜透析

指標1. 血清白蛋白 (Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) 人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法) 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) BCG法或BCP法人數。

二、參考值 (106年)：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.49%~100%。

(二) 合格率： ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法)之百分比分別為 $\geq 78.97\%$ 、 $\geq 78.68\%$ 。

三、監測頻率：每3個月 (每季別呈現指標數值)。

指標2. 尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Weekly Kt/V檢驗值之總和。

分母：申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V ≥ 1.7 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Weekly Kt/V人數。

二、參考值（106年）：本項為正向指標。

(一) 受檢率：87.97%~100%。

(二) 合格率： ≥ 1.7 之百分比為 $\geq 84.23\%$ 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值（106年）：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.48%~100%。

(二) 合格率： $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比為 $\geq 87.49\%$ 。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標4. 住院率

一、公式說明：

(一) 跨院住院率

分子：追蹤期間所有病人之跨院總住院次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

(二) 同院住院率

分子：追蹤期間所有病人之同院總住院次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、參考值（106年）：本項為負向指標。

(一) 跨院住院率：

1. 醫學中心： ≤ 10.38 。

2. 區域醫院： ≤ 13.70 。

3. 地區醫院： ≤ 15.76 。

4. 基層診所： ≤ 8.33 。

(二) 同院住院率：

1. 醫學中心： ≤ 9.08 。

2. 區域醫院： ≤ 11.96 。

3. 地區醫院： ≤ 9.57 。

4. 基層診所： ≤ 0.00 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間 <1 年之死亡率

分子：追蹤期間透析小於1年之死亡個案數*100。

分母：追蹤期間透析小於1年之總病人月數。

(二) 透析時間 ≥ 1 年之死亡率

分子：追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數*100。

分母：追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數。

二、參考值（106年）：本項為負向指標。

(一) 透析時間 <1 年死亡率：

1. 醫學中心： ≤ 0.41 。

2. 區域醫院： ≤ 0.66 。
3. 地區醫院： ≤ 0.47 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

(二)透析時間 ≥ 1 年死亡率：

1. 醫學中心： ≤ 0.67 。
2. 區域醫院： ≤ 0.98 。
3. 地區醫院： ≤ 0.85 。
4. 基層診所： ≤ 0.87 。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標6. 腹膜炎發生率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數 $\times 100$ 。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、參考值：本項為負向指標，106年參考值為 ≤ 1.76 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一)脫離率(I)-腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二)脫離率(II)-因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值（106年）：本項列為監控參考指標，惟不列正負向

及參考值。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標8. B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，106年參考值為 $\leq 0.24\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，106年參考值為 $\leq 0.23\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下腹膜透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下腹膜透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下腹膜透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，106年參考值為 $\geq 48.33\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標11. 鈣磷乘積

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：分母病人測量鈣磷乘積人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

（二）合格率

分子：分母病人測量鈣磷乘積 $< 60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數

分母：慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。

二、參考值：本項為正向指標。

（一）受檢率：規定合理範圍，本項為106年新增指標。

（二）合格率： $< 60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比，本項為106年新增指標。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

第三部分：整體透析

指標：醫療費用核減率

一、公式說明：

分子：申請點數扣除核定點數之初核核減點數。

分母：申請點數加總部分負擔之醫療費用點數。

二、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

參、指標值監測結果

一、血液透析

指標 1：血液透析_血清白蛋白 (Albumin)

(一)參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，106 年為 89.23%~100%。
2. 合格率：
 - (1)血清白蛋白 (Albumin) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ (BCG 法)之百分比：
最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，106 年為 $\geq 84.51\%$ 。
 - (2)血清白蛋白 (Albumin) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ (BCP 法)之百分比：
最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，106 年為 $\geq 83.51\%$ 。

(二)整體監測結果：

1. 106 年血清白蛋白 (Albumin) 受檢率為 98.67% ，較 105 年之 98.91% 為低，仍符合規定合理範圍。
2. 106 年血清白蛋白平均值 (BCG 法) 平均值為 3.88 gm/dl ，其中 $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比為 93.95% ，較 105 年之 93.78% 略高，且符合參考值範圍。
3. 106 年血清白蛋白平均值 (BCP 法) 平均值為 3.47gm/dl ，其中 $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比為 94.25% ，較 105 年之 92.71% 高，且符合參考值範圍。


(三)分區別：

Albumin 受檢率：106 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.66%	99.39%	99.20%	99.01%	99.06%	98.37%	99.37%
105 年	97.99%	98.97%	98.93%	98.76%	98.87%	97.80%	98.91%
106 年	98.00%	98.46%	98.67%	98.31%	98.80%	97.43%	98.67%

Albumin (BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：106 年各分區統計值皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	94.44%	93.39%	94.11%	94.50%	93.46%	91.98%	94.03%
105 年	94.18%	92.62%	93.99%	94.02%	93.36%	93.28%	93.78%
106 年	93.73%	92.96%	94.07%	94.26%	94.40%	93.78%	93.95%


Albumin (BCP 法) ≥ 3.0 gm/dl 之百分比：106 年各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	93.44%	90.67%	92.13%	94.89%	83.33%	94.85%	92.86%
105 年	93.99%	90.54%	92.15%	96.47%	90.48%	86.11%	92.71%
106 年	96.68%	91.36%	93.47%	96.35%	89.86%	86.43%	94.25%


(四)層級別：

Albumin 受檢率：106 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.34%	98.85%	99.04%	99.12%	99.37%
105 年	98.79%	98.41%	97.49%	98.88%	98.91%
106 年	98.42%	98.22%	97.47%	98.58%	98.67%

Albumin (BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：106 年各層級統計值皆符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	92.99%	93.03%	91.68%	94.95%	94.03%
105 年	93.62%	92.88%	91.46%	94.45%	93.78%
106 年	93.82%	93.39%	91.23%	94.69%	93.95%

Albumin (BCP 法) ≥ 3.0 gm/dl 之百分比：106 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全計
104 年	95.60%	91.41%	92.33%	96.15%	92.86%
105 年	94.06%	92.70%	92.12%	94.64%	92.71%
106 年	95.76%	94.85%	92.41%	96.38%	94.25%

指標 2：血液透析_尿素氮透析效率-URR

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，106 年為 89.15%~100%。
2. 合格率：URR $\geq 65\%$ 之百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，106 年為 $\geq 88.99\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 106 年 URR 受檢率為 98.62%，較 105 年之 98.90% 略低，仍符合規定合理範圍。
2. 106 年 URR $\geq 65\%$ 之百分比為 98.90%，較 105 年之 98.91% 略低，仍符合參考值範圍。


(三) 分區別：

URR 受檢率：106 年全區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.57%	99.07%	98.61%	98.97%	98.98%	98.31%	99.21%
105 年	98.15%	98.70%	98.94%	98.71%	98.81%	97.74%	98.90%
106 年	97.96%	98.30%	98.62%	98.28%	98.75%	97.22%	98.62%


URR $\geq$ 65%之百分比：106 年各區統計值皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.82%	98.69%	98.88%	98.90%	98.76%	98.73%	98.85%
105 年	98.87%	98.72%	98.78%	99.02%	99.05%	98.34%	98.91%
106 年	98.88%	98.65%	98.86%	98.96%	98.96%	98.84%	98.90%


(四) 層級別：

URR 受檢率：106 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.21%	98.68%	98.28%	99.08%	99.21%
105 年	98.66%	98.32%	97.63%	98.84%	98.90%
106 年	98.33%	98.11%	97.39%	98.53%	98.62%

URR $\geq$ 65%之百分比：106 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.51%	98.39%	98.56%	99.05%	98.85%
105 年	98.28%	98.63%	98.61%	99.08%	98.91%
106 年	98.45%	98.56%	98.67%	99.05%	98.90%

指標 3：血液透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，106 年為 89.41%~100%。
2. 合格率：Hb>8.5g/dL 之百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，106 年為 $\geq 88.70\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 106 年 Hb 受檢率為 98.91%，較 105 年之 99.19% 略低，仍符合規定合理範圍。
2. 106 年 Hb 平均值為 10.52g/dL，其中>8.5 g/dL 為 98.55%，較 105 年之 98.52% 略高，且符合參考值範圍。


(三) 分區別：

Hb 受檢率:106 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.78%	99.43%	99.27%	99.18%	99.24%	98.37%	99.50%
105 年	98.47%	99.15%	99.12%	98.96%	99.10%	98.29%	99.19%
106 年	98.29%	98.66%	98.75%	98.44%	99.02%	97.97%	98.91%


Hb>8.5g/dL 之百分比：106 年各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.40%	98.47%	98.48%	98.81%	98.91%	97.08%	98.59%
105 年	98.21%	98.40%	98.39%	98.49%	98.99%	98.26%	98.52%
106 年	98.31%	98.21%	98.60%	98.67%	99.00%	96.82%	98.55%


(四)層級別：

Hb 受檢率：106 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.64%	99.03%	99.25%	99.22%	99.50%
105 年	99.20%	98.67%	98.06%	99.07%	99.19%
106 年	98.58%	98.48%	97.81%	98.77%	98.91%

Hb>8.5g/dL 之百分比：106 年各層級統計值皆符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.60%	98.57%	97.97%	98.51%	98.59%
105 年	98.72%	98.63%	98.07%	98.32%	98.52%
106 年	98.75%	98.70%	97.83%	98.45%	98.55%

指標 4：血液透析_住院率（住院次數/每 100 人月）

指標 4-1：血液透析_跨院住院率

（一）參考值：最近 3 平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。


1. 醫學中心： ≤ 13.37 。
2. 區域醫院： ≤ 14.81 。
3. 地區醫院： ≤ 14.01 。
4. 基層診所： ≤ 10.21 。

（二）整體監測結果：

106 年跨院住院次數為 81,891 次，跨院住院率為 9.77，較 105 年之 9.69 略為上升。

（三）分區別：


106 年各分區統計值，除南區及東區較 105 年為低，其他分區呈上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	10.13	9.74	9.98	10.43	9.44	12.80	9.60
105 年	10.18	9.88	9.95	10.68	9.58	12.51	9.69
106 年	10.25	10.00	10.20	10.54	9.69	12.23	9.77


(四) 層級別：

106 年各層級統計值皆符合參考值範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	11.83	13.46	12.74	9.31	9.60
105 年	12.69	13.23	12.65	9.46	9.69
106 年	12.18	13.06	12.96	9.61	9.77

106 年醫學中心的各分區統計值，除臺北(13.78)及東區(21.32)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	13.33	7.22	13.07	11.32	8.64	23.63	11.83
105 年	14.06	6.84	14.52	11.85	9.84	23.02	12.69
106 年	13.78	7.10	12.78	11.40	9.67	21.32	12.18

106 年區域醫院的各分區統計值，除東區(14.93)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	14.00	12.30	13.87	13.71	13.46	14.74	13.46
105 年	13.41	12.72	13.52	12.95	13.75	16.82	13.23
106 年	13.16	12.18	13.77	13.24	13.20	14.93	13.06

106 年地區醫院的各分區統計值，除南區(15.19)、高屏(14.75)及東區(16.60)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	11.78	12.35	11.98	15.10	14.64	18.88	12.74
105 年	12.56	11.65	11.68	15.51	14.52	17.59	12.65
106 年	12.56	12.17	12.61	15.19	14.75	16.60	12.96

106 年基層診所的各分區統計值，除東區(12.79)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	9.94	9.30	9.45	9.59	8.98	12.80	9.31
105 年	9.97	9.70	9.30	10.24	9.14	12.45	9.46
106 年	10.05	9.75	9.94	10.05	9.35	12.79	9.61

指標 4-2：血液透析_同院住院率

(一) 參考值:最近 3 平均值*(1+10%)為上限。


1. 醫學中心： ≤ 11.45 。
2. 區域醫院： ≤ 11.73 。
3. 地區醫院： ≤ 4.89 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

(二) 整體監測結果：

106 年同院住院次數為 36,946 次，同院住院率為 4.41，較 105 年之 4.44 略為下降。

(三) 分區別：


106 年各分區統計值，除北區、中區較 105 年為高，其他分區呈下降趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	4.59	4.39	4.73	4.22	3.95	6.69	4.52
105 年	4.48	4.40	4.69	3.97	3.98	6.70	4.44
106 年	4.41	4.44	4.76	3.95	3.85	6.35	4.41


(四) 層級別：

106 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	10.15	10.76	4.52	0.00	4.52
105 年	10.84	10.47	4.31	0.00	4.44
106 年	10.38	10.40	4.67	0.00	4.41

106 年醫學中心的各分區統計值，除臺北(11.98)、東區(15.91)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	11.50	6.03	11.07	10.12	7.51	18.27	10.15
105 年	12.07	5.67	11.97	10.48	8.68	17.93	10.84
106 年	11.98	6.19	10.20	10.19	8.39	15.91	10.38

106 年區域醫院的各分區統計值皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	11.43	8.96	11.18	10.97	10.63	10.84	10.76
105 年	11.00	9.27	10.80	10.06	10.72	11.42	10.47
106 年	10.80	9.05	11.22	10.26	10.25	10.79	10.40

106 年地區醫院的各分區統計值，除高屏(5.91)及東區(7.11)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	2.84	4.79	4.03	5.50	6.06	7.74	4.52
105 年	2.85	4.67	3.75	5.05	5.56	6.64	4.31
106 年	3.01	4.85	4.76	4.71	5.91	7.11	4.67

106 年基層診所的各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

指標 5：血液透析_死亡率（死亡個案數/每 100 人月）

（一）參考值：


1. 透析時間 < 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限。
 - (1) 醫學中心： ≤ 1.10 。
 - (2) 區域醫院： ≤ 1.22 。
 - (3) 地區醫院： ≤ 1.57 。
 - (4) 基層診所： ≤ 1.13 。
2. 透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限。
 - (1) 醫學中心： ≤ 1.09 。
 - (2) 區域醫院： ≤ 1.20 。
 - (3) 地區醫院： ≤ 1.35 。
 - (4) 基層診所： ≤ 1.08 。

（二）整體監測結果：

1. 106 年透析時間 < 1 年之死亡率為 1.03，較 105 年之 1.0 略為上升。
2. 106 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為 1.00，較 105 年之 0.99 略為上升。


(三)分區別：

106 年各分區的透析時間<1 年之死亡率，除高屏及東區較 105 年下降外，其他分區呈微幅上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.03	1.06	0.99	1.13	0.93	1.21	1.02
105 年	0.99	0.95	1.03	1.01	1.04	1.24	1.00
106 年	1.05	1.02	1.14	1.06	0.99	0.85	1.03


106 年各分區的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除北區及南區較 105 年為低外，其他分區呈微幅上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.99	0.91	0.98	0.93	0.95	1.14	0.95
105 年	0.98	1.00	0.99	1.07	0.97	1.06	0.99
106 年	1.01	0.98	1.05	1.02	1.00	1.12	1.00


(四)層級別：

106 年各層級的透析時間<1 年之死亡率皆符合參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	1.12	1.07	1.47	1.03	1.02
105 年	0.99	1.09	1.41	1.01	1.00
106 年	1.08	1.19	1.44	1.04	1.03

106 年醫學中心的各分區透析時間<1 年之死亡率，臺北(1.20)、中區(1.14)、高屏(1.17)及東區(1.28)高於參考值上限，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.36	1.14	0.96	0.67	1.00	1.32	1.12
105 年	1.07	0.47	1.20	1.12	0.66	0.99	0.99
106 年	1.20	0.27	1.14	0.61	1.17	1.28	1.08

106 年區域醫院的透析時間<1 年之死亡率，除北區(1.26)、中區(1.50)、南區(1.42)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.24	1.10	0.97	1.07	0.90	1.02	1.07
105 年	1.14	1.00	1.05	0.95	1.10	2.28	1.09
106 年	0.94	1.26	1.50	1.42	0.95	1.06	1.19

106 年地區醫院的透析時間<1 年之死亡率，除高屏區(1.58)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.51	1.29	1.30	2.03	1.45	2.13	1.47
105 年	1.17	1.21	1.49	1.94	1.69	0.85	1.41
106 年	1.40	1.35	1.53	1.31	1.58	1.39	1.44

106 年基層診所的透析時間<1 年之死亡率，除臺北(1.17)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.00	1.05	1.17	1.09	0.95	1.11	1.03
105 年	1.06	0.85	1.05	0.97	0.99	1.53	1.01
106 年	1.17	0.85	1.11	1.05	0.96	0.67	1.04

106 年各層級的透析時間 ≥ 1 年之死亡率皆符合參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.95	1.04	1.19	0.98	0.95
105 年	0.98	1.09	1.24	1.02	0.99
106 年	0.97	1.08	1.29	1.03	1.00

106 年醫學中心的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除中區(1.15)及東區(1.87)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.16	0.57	1.03	0.64	0.72	1.66	0.95
105 年	1.05	0.80	1.20	0.76	0.76	1.69	0.98
106 年	1.01	0.57	1.15	0.78	0.84	1.87	0.97

106 年區域醫院的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除東區(1.22)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.02	1.13	1.07	0.94	1.06	1.15	1.04
105 年	0.95	1.22	1.10	1.12	1.08	1.29	1.09
106 年	1.05	1.09	1.10	1.10	1.04	1.22	1.08

106 年地區醫院的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，臺北(1.37)、南區(1.54)、高屏(1.41)及東區(1.43)高於參考值上限，其他分區符合參考值範圍。



年季	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.28	0.94	1.17	1.38	1.40	1.39	1.19
105 年	1.34	1.09	1.12	1.47	1.41	1.39	1.24
106 年	1.37	1.11	1.30	1.54	1.41	1.43	1.29

106 年基層診所的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除東區(1.17)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年季	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.03	0.94	1.02	0.94	0.96	1.24	0.98
105 年	1.03	1.00	1.02	1.09	0.98	1.03	1.02
106 年	1.04	1.04	1.06	1.00	1.04	1.17	1.03

指標 6：瘻管重建率(重建次數/每 100 人月)

指標 6-1：血液透析_跨院瘻管重建率


(一) 參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，106 年為 ≤ 0.57 。

(二) 整體監測結果：

106 年跨院重建次數為 3,774 次，跨院瘻管重建率為 0.45，較 105 年之 0.48 低，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


106 年各分區統計值，除中區(0.84)高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.56	0.50	0.94	0.48	0.22	0.43	0.53
105 年	0.48	0.40	0.88	0.45	0.19	0.41	0.48
106 年	0.44	0.35	0.84	0.39	0.20	0.43	0.45

(四) 層級別：

106 年各層級統計值，符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.60	0.68	0.67	0.47	0.53
105 年	0.56	0.64	0.54	0.43	0.48
106 年	0.55	0.57	0.50	0.41	0.45

指標 6-2：血液透析_同院瘻管重建率


(一) 參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，106 年為 ≤ 0.15 。

(二) 整體監測結果：

106 年同院重建次數為 1,004 次，同院瘻管重建率為 0.12，較 105 年之 0.12 相同，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


106 年各分區統計值，除臺北(0.16)高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.19	0.09	0.10	0.10	0.11	0.31	0.14
105 年	0.16	0.10	0.08	0.12	0.10	0.29	0.12
106 年	0.16	0.08	0.08	0.09	0.11	0.29	0.12

(三) 層級別：

106 年各層級統計值，除醫學中心(0.38)及區域醫院(0.24)高於參考值上限外，其他層級皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.40	0.26	0.08	0.00	0.14
105 年	0.36	0.25	0.05	0.00	0.12
106 年	0.38	0.24	0.04	0.00	0.12

指標 7：血液透析_脫離率

(一)參考值：


1. 脫離率(I)-腎功能回復：列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。
2. 脫離率(II)-腎移植：列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。

(二) 整體監測結果：

1. 106 年脫離率(I)腎功能回復為 1.50% ，較 105 年之 1.08 % 略高。
2. 106 年脫離率(II)腎移植為 0.32% ，較 105 年之 0.27%略為上升。


(三) 分區別：

脫離率(I)-腎功能回復：106 年各分區統計值，除南區及東區較 105 年為低，其他分區呈現上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.58%	1.37%	1.36%	0.60%	0.77%	0.00%	1.17%
105 年	1.39%	1.14%	1.15%	1.05%	0.36%	1.30%	1.08%
106 年	1.99%	2.20%	1.51%	0.97%	0.65%	0.40%	1.50%


脫離率(II)-腎移植：106 年各分區統計值，除高屏區較 105 年為低，其他分區呈現上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.31%	0.18%	0.33%	0.25%	0.26%	0.42%	0.28%
105 年	0.31%	0.28%	0.30%	0.19%	0.26%	0.17%	0.27%
106 年	0.33%	0.36%	0.38%	0.22%	0.23%	0.74%	0.32%


(三) 層級別：

脫離率(I)-腎功能回復：106 年各層級統計值，皆呈現上升趨勢。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.98%	1.17%	1.59%	0.98%	1.17%
105 年	1.53%	0.99%	1.42%	0.79%	1.08%
106 年	1.99%	1.23%	1.64%	1.43%	1.50%

脫離率(II)-腎移植：106 年各層級統計值，除地區醫院較 105 年為低，其他層級呈現上升趨勢。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.43%	0.26%	0.28%	0.25%	0.28%
105 年	0.59%	0.26%	0.28%	0.21%	0.27%
106 年	0.72%	0.33%	0.27%	0.25%	0.32%

指標 8：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率


(一) 參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，106 年為 $\leq 0.40\%$ 。

(二) 整體監測結果：

106 年 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.38%，較 105 年之 0.40% 下降，且低於參考值上限。

(三) 分區別：


106 年各分區統計值，除臺北(0.46%) 高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.27%	0.30%	0.34%	0.28%	0.31%	0.79%	0.32%
105 年	0.38%	0.43%	0.52%	0.32%	0.36%	0.35%	0.40%
106 年	0.46%	0.39%	0.39%	0.31%	0.30%	0.33%	0.38%

(四)層級別：

106 年各層級統計值除醫學中心高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.35%	0.27%	0.32%	0.31%	0.32%
105 年	0.37%	0.39%	0.44%	0.38%	0.40%
106 年	0.44%	0.37%	0.35%	0.37%	0.38%

指標 9：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率


(一)參考值：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，106 年為 $\leq 0.71\%$ 。

(二)整體監測結果：

106 年 C 型肝炎抗體轉陽率為 0.59%，較 105 年之 0.64%降低，且符合參考值範圍。

(三)分區別：


106 年各分區統計值，除東區(0.94)高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.56%	0.54%	0.84%	0.80%	0.47%	0.89%	0.65%
105 年	0.59%	0.44%	0.79%	0.59%	0.66%	1.06%	0.64%
106 年	0.57%	0.56%	0.62%	0.56%	0.55%	0.94%	0.59%

(四)層級別：

106 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.07%	0.48%	0.89%	0.74%	0.65%
105 年	0.27%	0.55%	0.69%	0.70%	0.64%
106 年	0.35%	0.56%	0.56%	0.63%	0.59%

指標 10：55 歲以下血液透析病人移植登錄率


(一) 參考值：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，106 年為 $\geq 20.11\%$ 。

(二) 整體監測結果：

106 年 55 歲以下血液透析病人移植登錄率為 25.34%，較 105 年之 23.37%為高，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


106 年各分區統計值，除高屏(19.93%)低於參考值下限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	21.94%	19.11%	26.84%	18.11%	17.16%	27.74%	21.32%
105 年	24.90%	21.95%	28.68%	19.74%	17.75%	29.27%	23.37%
106 年	26.68%	22.88%	32.05%	21.10%	19.93%	29.17%	25.34%

(四) 層級別：

106 年各層級統計值符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	34.50%	21.29%	19.02%	18.07%	21.32%
105 年	37.06%	22.81%	22.28%	19.79%	23.37%
106 年	39.71%	25.23%	24.15%	21.31%	25.34%

指標 11：血液透析_鈣磷乘績

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，本項為 106 年新增指標。
2. 合格率：鈣磷乘績 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比，以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，本項為 106 年新增指標。

(二) 整體監測結果：

1. 106 年血液透析_鈣磷乘績受檢率為 98.48%。
2. 106 年鈣磷乘績 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比為 97.34%。


(三) 分區別：

鈣磷乘績受檢率：




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106 年	97.77%	98.31%	98.51%	98.05%	98.55%	97.12%	98.48%

鈣磷乘積 $<60\text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比：




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106 年	96.86%	96.73%	97.54%	97.72%	97.58%	97.67%	97.34%

(四) 層級別：
鈣磷乘積受檢率：



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
106 年	98.05%	98.03%	97.24%	98.35%	98.48%

鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比：



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
106 年	96.73%	96.83%	96.80%	97.36%	97.34%

二、腹膜透析：

指標 1：腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)

(一)參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm10\%)$ 為規定合理範圍，106 年為 89.49%~100%。
2. 合格率：
 - (1)血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG 法) 之百分比：最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，106 年為 $\geq 78.97\%$ 。
 - (2)血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.0 gm/dl (BCP 法) 之百分比：最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，106 年為 $\geq 78.68\%$ 。

(二)整體監測結果：

1. 106 年血清白蛋白 (Albumin) 受檢率為 98.94% ，較 105 年之 99.17% 略為下降，仍符合規定合理範圍。
2. 106 年血清白蛋白 (BCG 法) 平均值為 3.73 gm/dl，其中 ≥ 3.5 gm/dl 之百分比為 87.75% ，較 105 年之 87.55% 略高，且符合參考值範圍。
3. 106 年血清白蛋白 (BCP 法) 平均值為 3.28 gm/dl，其中 ≥ 3.0 gm/dl 之百分比為 89.91% ，較 105 年之 88.41% 為高，且符合參考值範圍。


(三) 分區別：

Albumin 受檢率：106 年各分區統計值皆符合規定合理範圍內。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	99.51%	100%	99.93%	99.53%	99.68%	100%	99.69%
105 年	99.03%	99.89%	99.35%	99.25%	98.83%	97.78%	99.17%
106 年	98.98%	99.23%	99.07%	98.59%	98.69%	99.33%	98.94%

Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：106 年各分區統計值皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	86.56%	90.69%	88.94%	87.41%	88.06%	82.61%	87.93%
105 年	85.14%	90.88%	87.74%	88.48%	88.00%	89.39%	87.55%
106 年	86.69%	89.03%	88.13%	87.05%	88.20%	90.54%	87.75%


Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：106 年除北區低於參考值外，其他分區統計值皆在參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	85.53%	96.15%	90.48%	81.72%	-	77.78%	86.44%
105 年	86.93%	83.33%	90.88%	-	-	-	88.41%
106 年	89.07%	75.00%	92.11%	-	-	-	89.91%


(四) 層級別：

Albumin 受檢率：106 年各層級統計值皆符合規定合理範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	99.72%	99.63%	100.00%	100.00%	99.69%
105 年	99.28%	98.92%	100.00%	100.00%	99.17%
106 年	99.27%	98.55%	97.45%	98.67%	98.94%

Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：106 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	86.88%	88.54%	93.41%	95.52%	87.93%
105 年	86.44%	88.69%	89.24%	98.11%	87.55%
106 年	87.31%	87.85%	89.16%	97.30%	87.75%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：106 年各層級統計值
皆在參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	89.72%	86.64%	68.42%	100.00%	86.44%
105 年	93.16%	88.57%	73.02%	-	88.41%
106 年	92.27%	89.69%	84.13%	-	89.91%

指標 2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

(一)參考值：


1. Weekly Kt/V 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm10\%)$ 為規定合理範圍，106 年為 87.97%~100%。
2. 合格率：Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，106 年為 $\geq 84.23\%$ 。

(二)整體監測結果：

1. 106 年 Weekly Kt/V 受檢率為 97.46%，較 105 年之 97.64% 略為下降，仍符合規定合理範圍。
2. 106 年 Weekly Kt/V 平均值為 2.05，其中 ≥ 1.7 之百分比為 94.48%，較 105 年之 93.57% 高，且符合參考值範圍。


(三)分區別：

Weekly Kt/V 受檢率：106 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	97.77%	96.47%	97.63%	98.22%	98.63%	96.38%	97.85%
105 年	96.70%	99.09%	98.13%	97.94%	97.89%	95.56%	97.64%
106 年	97.35%	96.93%	97.49%	97.46%	97.46%	96.64%	97.46%


Weekly Kt/V $\geq$ 1.7 百分比：106 年各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	93.29%	92.22%	91.55%	95.62%	95.19%	96.99%	93.61%
105 年	93.71%	91.62%	91.28%	95.22%	95.30%	98.45%	93.57%
106 年	94.35%	91.62%	93.37%	96.82%	95.49%	97.22%	94.48%


(四) 層級別：

Weekly Kt/V 受檢率：106 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	97.71%	97.94%	97.32%	97.01%	97.85%
105 年	97.29%	97.91%	98.64%	100.00%	97.64%
106 年	97.60%	96.80%	96.17%	98.67%	97.46%

Weekly Kt/V $\geq$ 1.7 之百分比：106 年各層級統計值皆在參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	93.49%	93.86%	92.20%	87.69%	93.61%
105 年	93.67%	93.53%	93.12%	90.57%	93.57%
106 年	94.79%	94.30%	90.71%	91.89%	94.48%

指標 3：腹膜透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，106 年為 89.48%~100%。
2. 合格率：Hb>8.5 g/dL 之百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，106 年為 $\geq 87.49\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 106 年 Hb 受檢率為 98.93%，較 105 年之 99.10% 略為下降，仍符合規定合理範圍。
2. 106 年 Hb 平均值為 10.20，其中>8.5 g/dL 為 97.03%，較 105 年之 97.14% 為低，仍符合參考值範圍。


(三) 分區別：

Hb 受檢率：106 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	99.70%	100.00%	99.86%	99.44%	99.71%	100.00%	99.74%
105 年	99.08%	99.80%	99.57%	99.23%	98.46%	93.88%	99.10%
106 年	99.03%	99.27%	99.03%	98.51%	98.50%	100.00%	98.93%


Hb>8.5 g/dL 之百分比：106 年各分區統計值皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	97.72%	97.32%	97.15%	96.80%	96.98%	96.23%	97.29%
105 年	97.22%	97.77%	95.96%	97.48%	97.44%	97.83%	97.14%
106 年	96.75%	97.99%	97.63%	96.03%	96.67%	94.23%	97.03%


(三)層級別

Hb 受檢率:106 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	99.77%	99.67%	100.00%	100.00%	99.74%
105 年	99.03%	99.12%	100.00%	100.00%	99.10%
106 年	99.24%	98.51%	97.52%	98.18%	98.93%

Hb> 8.5 g/dL 之百分比：106 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	97.14%	97.40%	95.73%	100.00%	97.29%
105 年	96.84%	97.55%	96.23%	96.15%	97.14%
106 年	96.97%	96.91%	97.46%	94.44%	97.03%

指標 4：腹膜透析_住院率（住院次數/每 100 人月）

指標 4-1：腹膜透析_跨院住院率

（一）參考值：最近 3 平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。


1. 醫學中心： ≤ 10.38 。
2. 區域醫院： ≤ 13.70 。
3. 地區醫院： ≤ 15.76 。
4. 基層診所： ≤ 8.33 。

（二）整體監測結果：

106 年跨院住院次數為 8,405 次，跨院住院率為 10.77，較 105 年之 10.83 下降。

（三）分區別：


106 年各分區統計值，除北區、高屏、東區較 105 年為高外，其他分區呈下降趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	11.13	10.64	10.88	10.02	9.32	13.57	10.49
105 年	11.29	10.30	11.66	9.82	10.44	13.61	10.83
106 年	11.13	10.74	10.88	9.74	11.09	13.66	10.77


(四)層級別：

106 年各層級統計值皆符合參考值範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	9.19	12.42	13.27	8.63	10.49
105 年	9.68	12.46	14.02	6.04	10.83
106 年	9.74	12.34	14.28	7.89	10.77

106 年醫學中心的各分區統計值，除東區(13.87)高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	9.60	9.14	9.66	7.55	8.55	13.97	9.19
105 年	9.73	9.27	10.68	7.41	9.67	15.10	9.68
106 年	9.84	9.57	10.27	7.66	10.06	13.87	9.74

106 年區域醫院的各分區統計值皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	13.72	11.98	13.61	11.87	10.05	13.31	12.42
105 年	13.62	11.03	14.25	11.50	11.40	11.90	12.46
106 年	13.13	11.19	13.38	11.31	12.37	13.55	12.34

106 年地區醫院的各分區統計值，除北區(15.95)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	15.29	13.90	9.06	16.03	15.85	-	13.27
105 年	21.37	15.12	10.37	-	14.05	-	14.02
106 年	7.22	15.95	14.45	-	13.77	-	14.28

106 年基層診所的各分區統計值，除中區(9.83)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	33.33	9.14	7.02	8.53	15.79	9.09	8.63
105 年	-	6.58	5.61	5.83	5.41	100.00	6.04
106 年	-	3.13	9.83	4.17	6.82	-	7.89

指標 4-2：腹膜透析_同院住院率

(一) 參考值:最近 3 平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。


1. 醫學中心： ≤ 9.08 。
2. 區域醫院： ≤ 11.96 。
3. 地區醫院： ≤ 9.57 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

(二) 整體監測結果：

106 年同院住院次數為 7,349 次，同院住院率為 9.42，與 105 年之 9.42 相同。

(三) 分區別：


106 年各分區統計值，除北區、高屏、東區較 105 年為高外，其他分區呈下降趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	9.90	8.83	9.59	8.68	7.99	10.04	9.20
105 年	10.10	8.10	9.99	8.56	8.92	11.29	9.42
106 年	9.93	8.91	9.25	8.49	9.52	11.71	9.42


(四)層級別：

106 年各層級統計值皆在參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	8.07	10.93	8.73	0.00	9.20
105 年	8.48	10.89	7.99	0.00	9.42
106 年	8.62	10.70	9.09	0.00	9.42

106 年醫學中心的各分區統計值，除東區(11.89)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	8.35	7.65	8.85	6.61	7.39	12.01	8.07
105 年	8.63	7.52	9.33	6.49	8.52	12.72	8.48
106 年	8.75	8.44	8.71	6.99	9.03	11.89	8.62

106 年區域醫院的各分區統計值，皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	12.31	10.43	12.01	10.19	8.79	8.36	10.93
105 年	12.25	8.86	12.26	10.07	9.66	9.77	10.89
106 年	11.81	9.36	11.25	9.61	10.46	11.49	10.70

106 年地區醫院的各分區統計值除北區(10.34)、中區(10.06)高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	7.85	9.38	5.77	15.27	10.04	-	8.73
105 年	8.97	8.95	6.82	-	7.55	-	7.99
106 年	3.09	10.34	10.06	-	7.79	-	9.09

106 年基層診所的各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 年	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 年	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00

指標 5：腹膜透析_死亡率（死亡個案數/每 100 人月）

（一）參考值

1. 透析時間 < 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限。

(1)醫學中心： ≤ 0.41 。

(2)區域醫院： ≤ 0.66 。

(3)地區醫院： ≤ 0.47 。

(4)基層診所： ≤ 0.00 。

2. 透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限。

(1)醫學中心： ≤ 0.67 。

(2)區域醫院： ≤ 0.98 。

(3)地區醫院： ≤ 0.85 。

(4)基層診所： ≤ 0.87 。


（二）整體監測結果：

1. 106 年透析時間 < 1 年之死亡率為 0.52，較 105 年之 0.47 略高。

2. 106 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為 0.72，較 105 年之 0.70 略高。


(三)分區別：

106 年各分區的透析時間<1 年之死亡率，除北區、中區及高屏區較 105 年為高外，其他分區呈下滑趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.56	0.38	0.50	0.30	0.40	0.72	0.47
105 年	0.60	0.36	0.44	0.56	0.33	0.34	0.47
106 年	0.56	0.41	0.61	0.46	0.47	0.32	0.52


106 年各分區的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，北區、中區較 105 年為低，其他分區呈上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.78	0.81	0.69	0.59	0.62	0.94	0.71
105 年	0.74	0.75	0.75	0.69	0.59	0.43	0.70
106 年	0.75	0.68	0.67	0.75	0.72	1.06	0.72

(四)層級別：


106 年各層級的透析時間 < 1 年之死亡率，除醫學中心符合參考值範圍外，區域醫院、地區醫院、基層診所皆高於參考值。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.38	0.55	0.75	0.00	0.47
105 年	0.37	0.62	0.18	0.00	0.47
106 年	0.30	0.77	0.89	1.92	0.52


106 年醫學中心的各分區透析時間 < 1 年之死亡率，除高屏

(0.45)、東區(0.50)高於考值範圍外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.43	0.34	0.50	0.00	0.21	1.48	0.38
105 年	0.49	0.00	0.51	0.45	0.08	0.61	0.37
106 年	0.33	0.12	0.28	0.15	0.45	0.50	0.30

106 年區域醫院的各分區透析時間<1 年之死亡率，除臺北(0.89)及中區(1.19)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.75	0.39	0.49	0.45	0.49	0.00	0.55
105 年	0.69	0.83	0.44	0.61	0.66	0.00	0.62
106 年	0.89	0.61	1.19	0.66	0.54	0.00	0.77

106 年地區醫院的各分區透析時間<1 年之死亡率，除北區(0.70)、中區(1.80)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.00	0.46	0.71	0.00	2.82	-	0.75
105 年	1.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.18
106 年	0.00	0.70	1.80	0.00	0.00	0.00	0.89

106 年基層診所的各分區透析時間<1 年之死亡率除中區(2.44)高於參考值外，其他分區皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
105 年	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
106 年	-	-	2.44	-	0.00	-	1.92

106 年各層級的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除地區醫院(1.06)高於參考值上限外，其他層級符合參考值範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.60	0.87	0.56	0.71	0.71
105 年	0.61	0.81	1.03	0.34	0.70
106 年	0.61	0.87	1.06	0.60	0.72

106 年醫學中心的各分區透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除南區(0.76)、東區(1.07)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.64	0.48	0.73	0.47	0.49	1.20	0.60
105 年	0.67	0.59	0.70	0.55	0.49	0.34	0.61
106 年	0.62	0.44	0.55	0.76	0.61	1.07	0.61

106 年區域醫院的各分區透析時間 ≥ 1 年之死亡率除了東區(1.06)高於參考值外，其他分區皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.98	1.27	0.67	0.69	0.85	0.71	0.87
105 年	0.86	0.84	0.89	0.80	0.72	0.52	0.81
106 年	0.96	0.82	0.91	0.75	0.85	1.06	0.87

106 年地區醫院的各分區透析時間 ≥ 1 年之死亡率，北區(1.29)、中區(1.13)、高屏(1.07)高於參考值外，其他各區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.59	0.60	0.42	0.00	0.27	-	0.56
105 年	1.12	1.23	0.58	-	1.23	-	1.03
106 年	0.00	1.29	1.13	-	1.07	-	1.06

106 年基層診所的各分區透析時間 ≥ 1 年之死亡率皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.00	0.61	0.59	1.55	0.00	0.00	0.71
105 年	-	0.68	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
106 年	-	0.78	0.69	0.00	0.00	-	0.60

指標 6：腹膜透析_腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每 100 人月）


（一）參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，106 年為 ≤ 1.76 。

（二）整體監測結果：

106 年腹膜炎發生次數為 1,306 次，腹膜炎發生率為 1.67，較 105 年之 1.53 略高，仍符合參考值範圍。

（三）分區別：


106 年各分區統計值，除台北(1.90)、東區(2.02)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.65	1.77	1.74	1.56	1.47	1.94	1.63
105 年	1.53	1.52	1.58	1.48	1.58	2.05	1.53
106 年	1.90	1.64	1.62	1.35	1.66	2.02	1.67

(四)層級別：

106 年各層級統計值，除區域醫院(1.85)高於參考值上限外，其他層級符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	1.51	1.80	2.42	1.75	1.63
105 年	1.41	1.73	1.39	1.34	1.53
106 年	1.59	1.85	1.60	0.83	1.67

指標 7：腹膜透析_脫離率

(一)參考值：


1. 脫離率(I)-腎功能回復：列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。
2. 脫離率(II)-腎移植：列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。

(二)整體監測結果：

1. 106 年脫離率(I)腎功能回復為 0.80% ，較 105 年之 0.27% 為高。
2. 106 年脫離率(II)腎移植為 1.43% ，較 105 年之 1.29% 為高。


(三)分區別：

脫離率(I)-腎功能回復：106 年各分區統計值呈上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.75%	0.00%	0.92%	0.68%	1.54%	0.00%	0.81%
105 年	0.48%	0.00%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%
106 年	1.07%	0.00%	1.41%	1.30%	0.00%	0.00%	0.80%


脫離率(II)-腎移植：106 年各分區統計值，除中區較 105 年為低外，其他分區呈上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	1.07%	0.50%	1.77%	0.92%	1.43%	3.28%	1.22%
105 年	1.37%	0.88%	2.31%	0.82%	0.88%	0.00%	1.29%
106 年	1.45%	1.72%	1.89%	0.93%	1.07%	1.57%	1.43%


(三)層級別：

脫離率(I)-腎功能回復：106 年各層級統計值呈現上升趨勢。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.91%	0.80%	0.00%	0.00%	0.81%
105 年	0.18%	0.39%	0.00%	0.00%	0.27%
106 年	0.84%	0.84%	0.00%	0.00%	0.80%

脫離率(II)-腎移植：106 年各層級統計值，除區域醫院、基層診所較 105 年為低外，其他層級呈上升趨勢。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	1.35%	1.11%	0.51%	0.00%	1.22%
105 年	1.84%	0.62%	0.53%	2.38%	1.29%
106 年	2.11%	0.56%	0.85%	1.56%	1.43%

指標 8：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率


(一) 參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，106 年為 $\leq 0.24\%$ 。

(二) 整體監測結果：

106 年 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.52%，較 105 年之 0.21% 上升，高於參考值範圍。

(三) 分區別：


106 年各分區統計值，除北區(0.15%)符合參考值範圍，其他分區高於參考值上限。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.18%	0.30%	0.00%	0.51%	0.11%	0.99%	0.22%
105 年	0.27%	0.15%	0.10%	0.25%	0.22%	0.00%	0.21%
106 年	0.43%	0.15%	0.96%	0.37%	0.52%	0.91%	0.52%

(四) 層級別：

106 年各層級統計值，醫學中心、區域醫院高於參考值上限外，其他層級符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.21%	0.24%	0.00%	0.00%	0.22%
105 年	0.14%	0.27%	0.64%	0.00%	0.21%
106 年	0.67%	0.35%	0.00%	0.00%	0.52%

指標 9：腹膜透析_C 型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率


(一)參考值：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，106 年為 $\leq 0.23\%$ 。

(二)整體監測結果：

106 年 C 型肝炎抗體轉陽率為 0.16%，較 105 年之 0.28% 下降，且符合參考值範圍。

(三)分區別：


106 年各分區統計值，除台北(0.25%)南區(0.24%)參考值上限，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.17%	0.27%	0.09%	0.00%	0.11%	0.00%	0.13%
105 年	0.15%	0.27%	0.45%	0.48%	0.20%	0.00%	0.28%
106 年	0.25%	0.00%	0.09%	0.24%	0.10%	0.00%	0.16%

(四)層級別：

106 年各層級統計值，所有層級皆符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.07%	0.18%	0.00%	1.67%	0.13%
105 年	0.03%	0.50%	1.20%	1.96%	0.28%
106 年	0.22%	0.08%	0.00%	0.00%	0.16%

指標 10：腹膜透析_55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率


(一)參考值：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，106 年為 $\geq 48.33\%$ 。

(二) 整體監測結果：

106 年 55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率為 58.73%，較 105 年之 55.12%為高，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


106 年各分區統計值，除高屏(42.48%)低於參考值下限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	52.75%	47.10%	67.86%	54.98%	34.24%	62.50%	52.28%
105 年	58.73%	51.09%	71.37%	53.27%	35.12%	52.63%	55.12%
106 年	59.63%	56.20%	74.24%	57.03%	42.48%	56.41%	58.73%

(三)層級別：

106 年各層級統計值，除基層診所(47.06%)低於參考值下限外，其他層級皆符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	58.53%	44.24%	35.78%	33.33%	52.28%
105 年	61.83%	45.45%	47.66%	34.48%	55.12%
106 年	65.43%	48.49%	55.00%	47.06%	58.73%

指標 11：腹膜透析_鈣磷乘績

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍，本項為 106 年新增指標。
2. 合格率：鈣磷乘績 $< 60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比，以最近 3 年平均 $\text{值} \times (1 - 10\%)$ 為下限，本項為 106 年新增指標。

(二) 整體監測結果：

1. 106 年腹膜透析_鈣磷乘績受檢率為 98.92%。
2. 106 年鈣磷乘績 $< 60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比為 94.87%。


(三) 分區別：

鈣磷乘績受檢率：




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106 年	98.94%	99.23%	99.07%	98.59%	98.61%	99.33%	98.92%

鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比：




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
106 年	94.07%	94.80%	95.94%	95.52%	94.45%	95.27%	94.87%

(四) 層級別：
鈣磷乘積受檢率：



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
106 年	99.24%	98.51%	97.45%	98.67%	98.92%

鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比：



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
106 年	94.80%	94.53%	96.51%	97.30%	94.87%

三、整體透析


指標 1 醫療費用核減率

(一) 整體監測結果：

106 年初核核減率為 0.06% ，較 105 年之 0.05%略高。

(二) 分區別：

106 年各分區統計值，除台北及中區較 105 年為高，其他分區呈現下滑或平穩趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.02%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
105 年	0.01%	0.19%	0.09%	0.01%	0.02%	0.01%	0.05%
106 年	0.04%	0.19%	0.11%	0.01%	0.01%	0.01%	0.06%

肆、結論：

106年門診透析醫療品質指標全國值，除腎功能回復脫離率與腎移植脫離率列為監控參考指標，「腹膜透析的(區域醫院、地區醫院、基層診所)之透析時間<1年之死亡率」、「腹膜透析地區醫院透析時間 $\geq$ 1年之死亡率」、「腹膜透析B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率」未符合參考值範圍外，其餘指標全國值均符合參考值範圍內(如附錄表1~表2)，其中正(負)向趨勢不一致之指標，需留意其後續變化趨勢，而於分區別部分未符合監測目標之項目，相關分區已持續加強注意，並視情況函請院所說明原因，以釐清醫療品質是否異常。本報告指標涉臨床專業，建請台灣腎臟醫學會瞭解原因，適時輔導會員。

附錄 -表1、106年整體性監測結果表：

指標名稱	指標 正負向	參考值* (106年)	監測結果之趨勢
血液透析			
指標1： 血清白蛋白 (Albumin) -受檢率	規定合 理範圍	89.23%~100% ○	106年受檢率為98.67%，較105年之98.91%略低，但符合參考值範圍。
血清白蛋白(BCG) $\geq$ 3.5之百分比	正向	$\geq 84.51\%$ ○	Albumin(BCG) ≥ 3.5 gm/dl百分比之106年統計值為93.95%，較105年之93.78%略高。
血清白蛋白(BCP) $\geq$ 3.0之百分比	正向	$\geq 83.51\%$ ○	Albumin(BCP) ≥ 3.0 gm/dl百分比之106年統計值為94.25%，較105年之92.71%略高。 105年2種檢測方法之監測結果皆符合參考值範圍。
指標2： 尿素氮透析效 率URR-受檢率	規定合 理範圍	89.15%~100% ○	105年URR-受檢率98.62%，較105年之98.90%為低，但符合參考值範圍。
URR $\geq 65\%$ 之百分比	正向	$\geq 88.99\%$ ○	106年URR $\geq 65\%$ 之百分比為98.90%，較105年之98.91%略低，但符合參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率	規定合 理範圍	89.41%~100% ○	106年Hb受檢率為98.91%，較105年之99.19%略低，但符合參考值範圍。
Hb >8.5 g/dL之百分比	正向	$\geq 88.70\%$ ○	106年Hb >8.5 g/dL之百分比為98.55%，較105年之98.52%略高，且符合參考值範圍。
指標4-1： 跨院住院率（住院次數 /每100人月）	負向	醫學中心 ≤ 13.37 ○	106年每百人月住院次數為12.18，較105年之12.69低，且符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 14.81 ○	106年每百人月住院次數為13.06，較106年之13.23略低，且符合參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (106年)	監測結果之趨勢
		地區醫院 ≤ 14.01 ○	106年每百人月住院次數為12.96，較105年之12.65略高，但符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 10.21 ○	106年每百人月住院次數為9.61，較105年之9.46略高，但仍符合參考值範圍。
指標4-2： 同院住院率（住院次數/每100人月）	負向	醫學中心 ≤ 11.45 ○	106年每百人月住院次數為10.38，較105年之10.84為低，且符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 11.73 ○	106年每百人月住院次數為10.40，較105年之10.47略低，亦符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 4.89 ○	106年每百人月住院次數為4.67，較105年之4.31略高，但仍符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 0.00 ○	106年每百人月住院次數為0，與105年之0相當，亦符合參考值範圍。
指標5： 死亡率（死亡個案數/每100人月） 透析時間<1年死亡率 透析時間 ≥ 1 年死亡率	負向	醫學中心 ≤ 1.10 ○	106年透析時間<1年之死亡率為1.08，較105年之0.99略高，但符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 1.22 ○	106年透析時間<1年之死亡率為1.19，較105年之1.09略高，但仍符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 1.57 ○	106年透析時間<1年之死亡率為1.44，較105年之1.41略高，但仍符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 1.13 ○	106年透析時間<1年之死亡率為1.04，較105年之1.01略高，但仍符合參考值範圍。
	負向	醫學中心 ≤ 1.09 ○	106年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為0.97，較105年之0.98為低，亦符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 1.20 ○	106年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為1.08，較105年之1.09為低，且符合參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (106年)	監測結果之趨勢
			。
		地區醫院 ≤ 1.35 ○	106年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為1.29，較105年之1.24略高，但符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 1.08 ○	106年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為1.03，較105年之1.02略高，但符合參考值範圍。
指標6-1： 跨院瘻管重建率（重建次數/每100人月）	負向	≤ 0.57 ○	106年跨院執行瘻管重建率為0.45，較105年之0.48下降，且符合參考值範圍。
指標6-2： 同院瘻管重建率（重建次數/每100人月）	負向	≤ 0.15 ○	106年同院執行瘻管重建率為0.12，與105年之0.12相當，且符合參考值範圍。
指標7： 脫離率(百分比) 脫離率(I)-腎功能回復 脫離率(II)-腎移植	參考	-- --	106年「脫離率(I)-腎功能回復」為1.50%，較105年1.08%為高。 106年「脫離率(II)-腎移植」為0.32%，較105年之0.27%高。
指標8： B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.40\%$ ○	106年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.38%，較105年之0.40%為低，且符合參考值範圍。
指標9： C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百	負向	$\leq 0.71\%$ ○	106年C型肝炎抗體轉陽率為0.59%，較105年之0.64%略低，且符合參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (106年)	監測結果之趨勢
分比)			
指標10： 55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)	正向	$\geq 20.11\%$ ○	106年55歲以下血液透析病人移植登錄率為25.34%，較105年之23.37%為高，且符合參考值範圍。
指標11： 鈣磷乘積受檢率	規定合理範圍	-	106年血液透析鈣磷乘積受檢率為98.48%，本項為106年新增指標。
鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	正向	-	106年血液透析鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比為97.34%，本項為106年新增指標。
腹膜透析			正向
指標1： 血清白蛋白(Albumin)-受檢率	規定合理範圍	89.49%~100% ○	106年Albumin受檢率為98.94%，較105年之99.17%低，但符合參考值範圍。
血清白蛋白(BCG) ≥ 3.5 之百分比	正向	$\geq 78.97\%$ ○	106年Albumin(BCG) $\geq 3.5 \text{ gm/dl}$ 百分比為87.75%，較105年統計值為87.55%為高。
血清白蛋白(BCP) ≥ 3.0 之百分比	正向	$\geq 78.68\%$ ○	106年Albumin(BCP) $\geq 3.0 \text{ gm/dl}$ 百分比為89.91%，較105年統計值為88.41%為高。 106年2種檢測方法之監測結果皆符合參考值範圍。
指標2： 尿素氮透析效率 Weekly Kt/V-受檢率	規定合理範圍	87.97%~100% ○	106年Weekly Kt/V-受檢率為97.46%，較105年之97.64%為低，但符合參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (106年)	監測結果之趨勢
Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之百分比	正向	$\geq 84.23\%$ ○	106年Weekly Kt/V $\geq$ 1.7百分比為94.48%，較105年之93.57%略高，且符合參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率	規定合理範圍	89.48%~100% ○	106年Hb受檢率為98.93%，較105年之99.10%略低，但符合參考值範圍。
Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比	正向	$\geq 87.49\%$ ○	106年Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比為97.03%，較105年之97.14%下降，仍符合參考值範圍。
指標4-1： 跨院住院率（住院次數/每100人月）	負向	醫學中心 ≤ 10.38 ○	106年每百人月住院次數為9.74，較105年之9.68為高，仍符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 13.70 ○	106年每百人月住院次數為12.34，較105年之12.46略高，且符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 15.76 ○	106年每百人月住院次數為14.28，較105年之14.02為高，仍符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 8.33 ○	106年每百人月住院次數為7.89，較105年之6.04為高，符合參考值範圍。
指標4-2： 同院住院率（住院次數/每100人月）	負向	醫學中心 ≤ 9.08 ○	106年每百人月住院次數為8.62，較105年之8.48為高，仍符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 11.96 ○	106年每百人月住院次數為10.70，較105年之10.89為低，符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 9.57 ○	106年每百人月住院次數為9.09，較105年之7.99為低，符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 0.00 ○	105年每百人月住院次數為0，與105年之0相當，且符合參考值範圍。
指標5： 死亡率（死亡人數/每100人月） 透析時間 <1 年死亡率	負向	醫學中心 ≤ 0.41 ○	106年透析時間 <1 年死亡率為0.30，較105年之0.37略低，且符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 0.66 ●	106年透析時間 <1 年死亡率為0.77，較105年之0.62為高，高於參考值上限。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (106年)	監測結果之趨勢
透析時間 ≥ 1 年死亡率		地區醫院 ≤ 0.47 ●	106年透析時間 < 1 年死亡率為0.89，較105年之0.18為高，高於參考值上限。
		基層診所 ≤ 0.00 ●	106年透析時間 < 1 年死亡率為1.92，較105年之0為高，高於參考值上限。
	負向	醫學中心 ≤ 0.67 ○	106年透析時間 ≥ 1 年死亡率為0.61，與105年之0.61相當，且符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 0.98 ○	106年透析時間 ≥ 1 年死亡率為0.87，較105年之0.81略高，仍符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 0.85 ●	106年透析時間 ≥ 1 年死亡率為1.06，較105年之1.03為高，且高於參考值上限。
		基層診所 ≤ 0.87 ○	106年透析時間 ≥ 1 年死亡率為0.60，較105年之0.34為高，仍符合參考值範圍。
指標6： 腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每100人月）	負向	≤ 1.76 ○	106年腹膜炎發生率為1.67，較105年1.53為高，仍符合參考值範圍。
指標7： 脫離率(百分比) 脫離率(I)-腎功能回復 脫離率(II)-腎移植	參考	-- --	106年「脫離率(I)-腎功能回復」為0.80%，較105年之0.27%為高。 106年「脫離率(II)-腎移植」為1.43%，較105年之1.29%為高。
指標8： B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.24\%$ ●	106年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.52%，較105年之0.21%高，高於參考值上限。
指標9： C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.23\%$ ○	106年C型肝炎抗體轉陽率為0.16%，較105年之0.28%為低，且符合參考值範圍。
指標10： 55歲以下腹膜透析病人移植登錄率	正向	$\geq 48.33\%$ ○	106年55歲以下腹膜透析病人移植登錄率為58.73%，較105年之55.12%為高，

指標名稱	指標 正負向	參考值* (106年)	監測結果之趨勢
			且符合參考值範圍。
指標11： 鈣磷乘積受檢率	規定合理範圍	-	106年鈣磷乘積受檢率為98.92%，本項為106年新增指標。
鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比	正向	-	106年鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比為94.87%，本項為106年新增指標。
整體透析			
指標11：醫療費用核減率	--	--	106年初核核減率為0.06%，較105年之0.05%略高。

【註】*「○」表該項整體性之醫療品質資訊項目符合參考值範圍

「●」表該項整體性之醫療品質資訊項目未符合參考值範圍

附錄 - 表2、106年分區別指標監測結果彙整表

106年門診透析總額醫療品質資訊彙整表																				
指標	指標項目			臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標 方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	血液透析部分																			
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.00%	98.46%	98.67%	98.31%	98.80%	97.43%	98.67%	規定合理 範圍	89.23%-100%	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	172	77	120	100	123	18	610		-									
		Albumin(BCG)平均值	3.89	3.85	3.90	3.90	3.87	3.90	3.88											
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	93.73%	92.96%	94.07%	94.26%	94.40%	93.78%	93.95%	正向	≥84.51%	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Albumin(BCP)家數	11	6	10	6	4	2	39		-									
		Albumin-平均值(BCP)	3.60	3.31	3.40	3.72	3.25	3.23	3.47											
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	96.68%	91.36%	93.47%	96.35%	89.86%	86.43%	94.25%	正向	≥83.51%	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	URR	URR-受檢率	97.96%	98.30%	98.62%	98.28%	98.75%	97.22%	98.62%	規定合理 範圍	89.15%-100%	○	○	○	○	○	○	○	○	
		URR-平均值	75.48	75.23	74.59	74.78	74.55	74.34	74.95		-									
		URR≥65%百分比	98.88%	98.65%	98.86%	98.96%	98.96%	98.84%	98.90%	正向	≥88.99%	○	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb	Hb-受檢率	98.29%	98.66%	98.75%	98.44%	99.02%	97.97%	98.91%	規定合理 範圍	89.41%-100%	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.50	10.47	10.56	10.44	10.59	10.36	10.52		-									
		Hb> 8.5百分比	98.31%	98.21%	98.60%	98.67%	99.00%	96.82%	98.55%	正向	≥88.70%	○	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率	醫學中心	住院次數	4,484	511	1,961	818	1,762	702	10,190	-									
			住院率(人次/每百人月)	13.78	7.10	12.78	11.40	9.67	21.32	12.18	負向	≤13.37	>	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	7,000	4,243	5,032	5,098	4,055	801	25,973	-									
			住院率(人次/每百人月)	13.16	12.18	13.77	13.24	13.20	14.93	13.06	負向	≤14.81	○	○	○	○	○	>	○	
		地區醫院	住院次數	4,057	5,343	5,125	2,810	3,420	701	21,028	-									
			住院率(人次/每百人月)	12.56	12.17	12.61	15.19	14.75	16.60	12.96	負向	≤14.01	○	○	○	>	>	>	○	
		基層診所	住院次數	12,552	4,307	6,828	7,778	8,096	1,240	39,133	-									
			住院率(人次/每百人月)	10.05	9.75	9.94	10.05	9.35	12.79	9.61	負向	≤10.21	○	○	○	○	○	>	○	
4-2	同院住院率	醫學中心	住院次數	3,896	445	1,565	731	1,529	524	8,690	-									
			住院率(人次/每百人月)	11.98	6.19	10.20	10.19	8.39	15.91	10.38	負向	≤11.45	>	○	○	○	○	○	>	○
		區域醫院	住院次數	5,743	3,154	4,102	3,951	3,150	579	20,679	-									
			住院率(人次/每百人月)	10.80	9.05	11.22	10.26	10.25	10.79	10.40	負向	≤11.73	○	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	971	2,131	1,934	872	1,369	300	7,577	-									
			住院率(人次/每百人月)	3.01	4.85	4.76	4.71	5.91	7.11	4.67	負向	≤4.89	○	○	○	○	>	>	>	○
		基層診所	住院次數	0	0	0	0	0	0	0	-									
			住院率(人次/每百人月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	○	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	遠折時間<1年之死亡率	1.20	0.27	1.14	0.61	1.17	1.28	1.08	負向	≤1.10	>	○	>	○	>	>	○	
			遠折時間≥1年之死亡率	1.01	0.57	1.15	0.78	0.84	1.87	0.97	負向	≤1.09	○	○	>	○	○	>	○	
		區域醫院	遠折時間<1年之死亡率	0.94	1.26	1.50	1.42	0.95	1.06	1.19	負向	≤1.22	○	>	>	>	○	○	○	○
			遠折時間≥1年之死亡率	1.05	1.09	1.10	1.10	1.04	1.22	1.08	負向	≤1.20	○	○	○	○	○	>	○	
		地區醫院	遠折時間<1年之死亡率	1.40	1.35	1.53	1.31	1.58	1.39	1.44	負向	≤1.57	○	○	○	○	>	○	○	○
			遠折時間≥1年之死亡率	1.37	1.11	1.30	1.54	1.41	1.43	1.29	負向	≤1.35	>	○	○	>	>	>	>	○
		基層診所	遠折時間<1年之死亡率	1.17	0.85	1.11	1.05	0.96	0.67	1.04	負向	≤1.13	>	○	○	○	○	○	○	○
			遠折時間≥1年之死亡率	1.04	1.04	1.06	1.00	1.04	1.17	1.03	負向	≤1.08	○	○	○	○	○	>	>	○

6-1	跨院瘻管重建率	瘻管重建次數 瘻管重建率 (人次/每百人月)	1,063 0.44	454 0.35	1,352 0.84	558 0.39	315 0.20	96 0.43	3,774 0.45	負向	- ≤0.57	○	○	>	○	○	○	○
6-2	同院瘻管重建率	瘻管重建次數 瘻管重建率 (人次/每百人月)	400 0.16	106 0.08	122 0.08	127 0.09	180 0.11	64 0.29	1,004 0.12	負向	- ≤0.15	>	○	○	○	○	>	○
7	脫離率	腎功能恢復人數	55	31	26	15	10	1	138	-								
		脫離率(I)-腎功能回復	1.99%	2.20%	1.51%	0.97%	0.65%	0.40%	1.50%	參考指標		-	-	-	-	-	-	-
		腎移植人數	67	39	51	26	30	13	225	-								
8	B型肝炎表面抗原轉陽率	脫離率(II)-腎移植	0.33%	0.36%	0.38%	0.22%	0.23%	0.74%	0.32%	參考指標		-	-	-	-	-	-	-
		轉陽人數	77	35	44	30	33	5	224	負向	-							
		陰性人數	16,736	9,038	11,280	9,715	10,951	1,503	58,552		-							
9	C型肝炎抗體轉陽率	轉陽率	0.46%	0.39%	0.39%	0.31%	0.30%	0.33%	0.38%		≤0.40%	>	○	○	○	○	○	○
		轉陽人數	95	50	67	51	58	13	334	負向	-							
		陰性人數	16,675	8,868	10,870	9,050	10,461	1,385	56,669		-							
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率	轉陽率	0.57%	0.56%	0.62%	0.56%	0.55%	0.94%	0.59%		≤0.71%	○	○	○	○	○	>	○
		登錄人數	1,219	614	939	545	601	147	4,059	正向	-							
		病患人數	4,569	2,684	2,930	2,583	3,016	504	16,018		-							
11	鈣磷乘積	登錄率(百分比)	26.68%	22.88%	32.05%	21.10%	19.93%	29.17%	25.34%		≥20.11%	○	○	○	○	<	○	○
		鈣磷乘積-受檢率	97.77%	98.31%	98.51%	98.05%	98.55%	97.12%	98.48%	規定合理範圍	-	-	-	-	-	-	-	-
		鈣磷乘積< 60 mg²/dL²	96.86%	96.73%	97.54%	97.72%	97.58%	97.67%	97.34%		-	-	-	-	-	-	-	-

106年門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
																			腹膜透析部分
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	98.98%	99.23%	99.07%	98.59%	98.69%	99.33%	98.94%	規定合理範圍	89.49%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	23	19	20	19	17	4	102										
		Albumin(BCG)平均值	3.73	3.80	3.71	3.70	3.71	3.74	3.73										
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	86.69%	89.03%	88.13%	87.05%	88.20%	90.54%	87.75%	正向	≥78.97%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	7	2	9	-	-	-	18										
		Albumin-平均值(BCP)	3.29	3.09	3.28	-	-	-	3.28										
2	Weekly Kt/V	Albumin(BCP)≥3.0百分比	89.07%	75.00%	92.11%	-	-	-	89.91%	正向	≥78.68%	○	<	○	-	-	-	○	
		Weekly Kt/V-受檢率	97.35%	96.93%	97.49%	97.46%	97.46%	96.64%	97.46%	規定合理範圍	87.97%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	2.04	2.09	2.01	2.05	2.07	2.09	2.05		-								
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	94.35%	91.62%	93.37%	96.82%	95.49%	97.22%	94.48%	正向	≥84.23%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb	Hb-受檢率	99.03%	99.27%	99.03%	98.51%	98.50%	100.00%	98.93%	規定合理範圍	89.48%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.30	10.33	10.05	10.07	10.15	10.38	10.20										
		Hb>8.5百分比	96.75%	97.99%	97.63%	96.03%	96.67%	94.23%	97.03%	正向	≥87.49%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率	醫學中心	住院次數	1,529	424	938	365	793	119	4,152		-							
		住院率(人次/每百人月)	9.84	9.57	10.27	7.66	10.06	13.87	9.74	負向	≤10.38	○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	1,381	471	586	785	685	92	3,981		-							
		住院率(人次/每百人月)	13.13	11.19	13.38	11.31	12.37	13.55	12.34	負向	≤13.70	○	○	○	○	○	○	○	
		地區醫院	住院次數	14	145	112	-	76	-	347		-							
		住院率(人次/每百人月)	7.22	15.95	14.45	-	13.77	-	14.28	負向	≤15.76	○	>	○	-	○	-	○	
		基層診所	住院次數	-	4	47	3	3	-	57		-							
		住院率(人次/每百人月)	-	3.13	9.83	4.17	6.82	-	7.89	負向	≤8.33	-	○	>	○	○	-	○	
4-2	同院住院率	醫學中心	住院次數	1,359	374	795	333	712	102	3,675		-							
		住院率(人次/每百人月)	8.75	8.44	8.71	6.99	9.03	11.89	8.62	負向	≤9.08	○	○	○	○	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	1,242	394	493	667	579	78	3,453		-							
		住院率(人次/每百人月)	11.81	9.36	11.25	9.61	10.46	11.49	10.70	負向	≤11.96	○	○	○	○	○	○	○	
		地區醫院	住院次數	6	94	78	-	43	-	221		-							
		住院率(人次/每百人月)	3.09	10.34	10.06	-	7.79	-	9.09	負向	≤9.57	○	>	>	-	○	-	○	
		基層診所	住院次數	-	0	0	0	0	-	0		-							
		住院率(人次/每百人月)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	○	○	-	○	
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	遠析時間<1年之死亡率	0.33	0.12	0.28	0.15	0.45	0.50	0.30	負向	≤0.41	○	○	○	○	>	>	○
		遠析時間≥1年之死亡率	0.62	0.44	0.55	0.76	0.61	1.07	0.61	負向	≤0.67	○	○	○	>	○	>	○	
		區域醫院	遠析時間<1年之死亡率	0.89	0.61	1.19	0.66	0.54	0.00	0.77	負向	≤0.66	>	○	>	○	○	○	>
		遠析時間≥1年之死亡率	0.96	0.82	0.91	0.75	0.85	1.06	0.87	負向	≤0.98	○	○	○	○	○	>	○	
		地區醫院	遠析時間<1年之死亡率	0.00	0.70	1.80	-	0.00	-	0.89	負向	≤0.47	○	>	>	-	○	-	>
		遠析時間≥1年之死亡率	0.00	1.29	1.13	-	1.07	-	1.06	負向	≤0.85	○	>	>	-	>	-	>	
		基層診所	遠析時間<1年之死亡率	-	-	2.44	-	0.00	-	1.92	負向	≤0.00	-	-	>	-	○	-	>
		遠析時間≥1年之死亡率	-	0.78	0.69	0.00	0.00	-	0.60	負向	≤0.87	-	○	○	○	○	-	○	

6	腹膜炎發生率	腹膜炎發生次數 腹膜炎發生率 (人次/每百人月)	499 1.90	159 1.64	239 1.62	159 1.35	232 1.66	31 2.02	1,306 1.67	負向	- ≤1.76	>	○	○	○	○	>	○
7	脫離率	腎功能恢復人數 脫離率(I)-腎功能回復 腎移植人數 脫離率(II)-腎移植	4 1.07% 32 1.45%	0 0.00% 14 1.72%	3 1.41% 24 1.89%	2 1.30% 9 0.93%	0 0.00% 12 1.07%	0 0.00% 2 1.57%	9 0.80% 93 1.43%	- 參考指標 - 參考指標	-	-	-	-	-	-	-	
8	B型肝炎表面抗原轉陽率	轉陽人數 陰性人數 轉陽率	8 1,872 0.43%	1 664 0.15%	10 1,042 0.96%	3 809 0.37%	5 956 0.52%	1 110 0.91%	28 5,422 0.52%	- - 負向 ≤0.24%	-	>	○	>	>	>	>	
9	C型肝炎抗體轉陽率	轉陽人數 陰性人數 轉陽率	5 2,011 0.25%	0 729 0.00%	1 1,094 0.09%	2 843 0.24%	1 1,027 0.10%	0 113 0.00%	9 5,786 0.16%	- - 負向 ≤0.23%	-	>	○	○	>	○	○	
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率	登錄人數 病患人數 登錄率(百分比)	647 1,085 59.63%	281 500 56.20%	513 691 74.24%	292 512 57.03%	260 612 42.48%	44 78 56.41%	2,032 3,460 58.73%	- - 正向 ≥48.33%	-	○	○	○	○	<	○	
11	鈣磷乘積	鈣磷乘積-受檢率 鈣磷乘積< 60 mg²/dL²	98.94% 94.07%	99.23% 94.80%	99.07% 95.94%	98.59% 95.52%	98.61% 94.45%	99.33% 95.27%	98.92% 94.87%	規定合理 範圍 正向	- -	-	-	-	-	-	-	

【說明】 一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。

二、106年_門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。

三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。

四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。