

105 年

門診透析整體性醫療品質資訊公開報告



衛生福利部

中央健康保險署

106 年 7 月

目 錄

壹、前言	1
貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義	2
參、指標值監測結果	13
一、血液透析	13
指標 1：血液透析_血清白蛋白 (Albumin)	13
指標 2：血液透析_尿素氮透析效率-URR	18
指標 3：血液透析_貧血檢查-Hb	22
指標 4：血液透析_住院率 (住院次數/每 100 人月)	26
指標 5：血液透析_死亡率 (死亡個案數/每 100 人月)	38
指標 6：瘻管重建率(重建次數/每 100 人月)	51
指標 7：血液透析_脫離率	55
指標 8：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率	59
指標 9：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率	61
指標 10：55 歲以下血液透析病人移植登錄率	63
二、腹膜透析：	65
指標 1：腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)	65
指標 2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V	71
指標 3：腹膜透析_貧血檢查-Hb	75
指標 4：腹膜透析_住院率 (住院次數/每 100 人月)	79
指標 5：腹膜透析_死亡率 (死亡個案數/每 100 人月)	91
指標 6：腹膜透析_腹膜炎發生率 (發生腹膜炎次數/每 100 人月)	103
指標 7：腹膜透析_脫離率	105
指標 8：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率	109
指標 9：腹膜透析_C 型肝炎抗體 (anti-HCV) 轉陽率 (百分比)	111
指標 10：腹膜透析_55 歲以下腹膜透析病患移植登錄率	113
三、整體透析	115
指標 1 醫療費用核減率	115
肆、結論：	116
附錄 -表 1、105 年整體性監測結果表：	117
附錄 - 表 2、105 年分區別指標監測結果彙整表	123

壹、前言

● 緣起：

本報告係依據衛生福利部訂定發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」之「五、門診透析」指標項目，辦理本項資訊公開事宜，分為血液透析、腹膜透析及整體透析3大部分，呈現各指標之操作型定義、整體與6個健保分區及醫療院所各層級別之監測統計。本報告資料係依健保申報資料及透析院所上傳至健保署VPN系統資料所編製。

● 意義：

本報告指標項目依其特性區分為正向指標、負向指標、及非絕對正向或負向指標。對正向指標之監測目的，在於期待指標數值呈上升或平穩但維持高於某一數值之趨勢，若呈現明顯下降趨勢，則需進一步瞭解原因；反之，對負向指標，則期待指標數值呈下降或平穩但維持低於某一數值之趨勢，若呈現明顯上升趨勢，則需進一步瞭解原因；對於非絕對正向或負向指標之監測目的，在於期待指標數值呈平穩趨勢，若呈現巨幅變動，則需進一步瞭解原因。

● 特別聲明：

本報告資料無法反映完整醫療過程與結果，因此，指標數字的表現可能為多重原因造成，醫療適當性仍需就病人情形由醫療專業認定，不應直接認定反映品質，請使用者審慎解讀。

註1；健保署6個分區係指中央健康保險署臺北、北區、中區、南區、高屏及東區等六個分區服務範圍。

貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義

第一部分：血液透析

指標1. 血清白蛋白 (Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) 人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法) 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) BCG法或BCP法人數。

二、參考值 (105年)：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.43%~100%。

(二) 合格率： ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法) 之百分比分別為 $\geq 84.63\%$ 、 $\geq 83.57\%$ 。

三、監測頻率：每3個月 (每季別呈現指標數值)。

指標2. 尿素氮透析效率-URR

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：分母病人檢驗URR人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值：

分子：申報URR檢驗值之總和。

分母：申報URR檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗URR $\geq 65\%$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗URR人數。

二、參考值（105年）：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.29%~100%。

(二) 合格率： $\geq 65\%$ 之百分比為 $\geq 88.97\%$ 。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值（105年）：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.55%~100%。

(二) 合格率： $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比為 $\geq 88.73\%$ 。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標4. 住院率

一、公式說明：

(一) 跨院住院率

分子：追蹤期間所有病人之跨院總住院次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

(二) 同院住院率

分子：追蹤期間所有病人之同院總住院次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、參考值（105年）：本項為負向指標。

(一) 跨院住院率：

1. 醫學中心： ≤ 13.06 。
2. 區域醫院： ≤ 14.99 。
3. 地區醫院： ≤ 14.20 。
4. 基層診所： ≤ 10.15 。

(二) 同院住院率：

1. 醫學中心： ≤ 11.19 。
2. 區域醫院： ≤ 11.90 。
3. 地區醫院： ≤ 4.99 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間 <1 年之死亡率

分子：追蹤期間透析小於1年之死亡個案數*100。

分母：追蹤期間透析小於1年之總病人月數。

(二) 透析時間 ≥ 1 年之死亡率

分子：追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數*100。

分母：追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數。

二、參考值（105年）：本項為負向指標。

(一) 透析時間 <1 年死亡率：

1. 醫學中心： ≤ 1.11 。
2. 區域醫院： ≤ 1.25 。
3. 地區醫院： ≤ 1.54 。
4. 基層診所： ≤ 1.13 。

(二)透析時間 ≥ 1 年死亡率：

1. 醫學中心： ≤ 1.07 。
2. 區域醫院： ≤ 1.19 。
3. 地區醫院： ≤ 1.36 。
4. 基層診所： ≤ 1.05 。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標6. 瘻管重建率

一、公式說明：

(一)跨院瘻管重建率

分子：追蹤期間所有病人於跨院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數 $\times 100$ 。

分母：追蹤期間之總病人月數。

(二)同院瘻管重建率

分子：追蹤期間所有病人於同院重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數 $\times 100$ 。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、參考值（105年）：本項為負向指標。

(一)跨院瘻管重建率： ≤ 0.60 。

(二)同院瘻管重建率： ≤ 0.16 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一)脫離率(I)-腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二)脫離率(II)-因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值（105年）：本項列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標8. B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，105年參考值為 $\leq 0.35\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，105年參考值為 $\leq 0.72\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下血液透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下血液透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下血液透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，105年參考值為 $\geq 19.19\%$ 。

三、監測頻率：每年。

第二部分：腹膜透析

指標1. 血清白蛋白 (Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) 人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白 (Albumin) 檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法) 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗血清白蛋白 (Albumin) BCG法或BCP法人數。

二、參考值 (105年)：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.72%~100%。

(二) 合格率： ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl (BCP法)之百分比分別為 $\geq 79.14\%$ 、 $\geq 77.80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月 (每季別呈現指標數值)。

指標2. 尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Weekly Kt/V檢驗值之總和。

分母：申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V ≥ 1.7 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Weekly Kt/V人數。

二、參考值（105年）：本項為正向指標。

(一) 受檢率：88.07%~100%。

(二) 合格率： ≥ 1.7 之百分比為 $\geq 84.25\%$ 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值（105年）：本項為正向指標。

(一) 受檢率：89.77%~100%。

(二) 合格率： $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比為 $\geq 87.56\%$ 。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標4. 住院率

一、公式說明：

(一) 跨院住院率

分子：追蹤期間所有病人之跨院總住院次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

(二) 同院住院率

分子：追蹤期間所有病人之同院總住院次數*100。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、參考值（105年）：本項為負向指標。

(一) 跨院住院率：

1. 醫學中心： ≤ 10.24 。
2. 區域醫院： ≤ 13.68 。
3. 地區醫院： ≤ 16.66 。
4. 基層診所： ≤ 9.33 。

(二) 同院住院率：

1. 醫學中心： ≤ 8.92 。
2. 區域醫院： ≤ 11.90 。
3. 地區醫院： ≤ 10.12 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間 <1 年之死亡率

分子：追蹤期間透析小於1年之死亡個案數*100。

分母：追蹤期間透析小於1年之總病人月數。

(二) 透析時間 ≥ 1 年之死亡率

分子：追蹤期間透析大於等於1年之死亡個案數*100。

分母：追蹤期間透析大於等於1年之總病人月數。

二、參考值（105年）：本項為負向指標。

(一) 透析時間 <1 年死亡率：

1. 醫學中心： ≤ 0.41 。

2. 區域醫院： ≤ 0.66 。
3. 地區醫院： ≤ 0.51 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

(二)透析時間 ≥ 1 年死亡率：

1. 醫學中心： ≤ 0.67 。
2. 區域醫院： ≤ 0.97 。
3. 地區醫院： ≤ 0.82 。
4. 基層診所： ≤ 1.00 。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標6. 腹膜炎發生率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數 $\times 100$ 。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、參考值：本項為負向指標，105年參考值為 ≤ 1.71 。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一)脫離率(I)-腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二)脫離率(II)-因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值（105年）：本項列為監控參考指標，惟不列正負向

及參考值。

三、監測頻率：每6個月（以上、下半年，呈現指標數值）。

指標8. B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，105年參考值為 $\leq 0.24\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間Anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，105年參考值為 $\leq 0.14\%$ 。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下腹膜透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下腹膜透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下腹膜透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，105年參考值為 $\geq 47.05\%$ 。

三、監測頻率：每年。

第三部分：整體透析

指標:醫療費用核減率

一、公式說明：

分子：申請點數扣除核定點數之初核核減點數。

分母：申請點數加總部分負擔之醫療費用點數。

二、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

參、指標值監測結果

一、血液透析

指標 1：血液透析_血清白蛋白 (Albumin)

(一)參考值：

1. 受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，105 年為 89.43%~100%。

2. 合格率：

(1)血清白蛋白 (Albumin) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ (BCG 法)之百分比：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，105 年為 $\geq 84.63\%$ 。

(2)血清白蛋白 (Albumin) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ (BCP 法)之百分比：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，105 年為 $\geq 83.57\%$ 。

(二)整體監測結果：


1. 105 年血清白蛋白 (Albumin) 受檢率為 98.91% ，較 104 年之 99.37% 為低，仍符合規定合理範圍。

2. 105 年血清白蛋白平均值 (BCG 法) 平均值為 3.87 gm/dl，其中 $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比為 93.78%，較 104 年之 94.03% 略低，仍符合參考值範圍。

3. 105 年血清白蛋白平均值 (BCP 法) 平均值為 3.44 gm/dl，其中 $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比為 92.71%，較 104 年之 92.86% 稍低，仍符合參考值範圍。


(三)分區別：

Albumin 受檢率：105 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.66%	99.39%	99.20%	99.01%	99.06%	98.37%	99.37%
105 年	97.99%	98.97%	98.93%	98.76%	98.87%	97.80%	98.91%

Albumin (BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：105 年各分區統計值皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	94.44%	93.39%	94.11%	94.50%	93.46%	91.98%	94.03%
105 年	94.18%	92.62%	93.99%	94.02%	93.36%	93.28%	93.78%


Albumin (BCP 法) ≥ 3.0 gm/dl 之百分比：105 年各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	93.44%	90.67%	92.13%	94.89%	83.33%	94.85%	92.86%
105 年	93.99%	90.54%	92.15%	96.47%	90.48%	86.11%	92.71%


(四)層級別：

Albumin 受檢率：105 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.34%	98.85%	99.04%	99.12%	99.37%
105 年	98.79%	98.41%	97.49%	98.88%	98.91%

Albumin (BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：105 年各層級統計值皆符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	92.99%	93.03%	91.68%	94.95%	94.03%
105 年	93.62%	92.88%	91.46%	94.45%	93.78%

Albumin (BCP 法) ≥ 3.0 gm/dl 之百分比：105 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全計
104 年	95.60%	91.41%	92.33%	96.15%	92.86%
105 年	94.06%	92.70%	92.12%	94.64%	92.71%

指標 2：血液透析_尿素氮透析效率-URR

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm10\%)$ 為規定合理範圍，105 年為 89.29%~100%。
2. 合格率： $URR \geq 65\%$ 之百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，105 年為 $\geq 88.97\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 105 年 URR 受檢率為 98.90%，較 104 年之 99.21% 略低，仍符合規定合理範圍。
2. 105 年 $URR \geq 65\%$ 之百分比為 98.91%，較 104 年之 98.85% 稍高，且符合參考值範圍。


(三) 分區別：

URR 受檢率：105 年全區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.57%	99.07%	98.61%	98.97%	98.98%	98.31%	99.21%
105 年	98.15%	98.70%	98.94%	98.71%	98.81%	97.74%	98.90%


URR $\geq$ 65%之百分比：105 年各區統計值皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.82%	98.69%	98.88%	98.90%	98.76%	98.73%	98.85%
105 年	98.87%	98.72%	98.78%	99.02%	99.05%	98.34%	98.91%


(四) 層級別：

URR 受檢率：各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.21%	98.68%	98.28%	99.08%	99.21%
105 年	98.66%	98.32%	97.63%	98.84%	98.90%

URR $\geq$ 65%之百分比：105 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.51%	98.39%	98.56%	99.05%	98.85%
105 年	98.28%	98.63%	98.61%	99.08%	98.91%

指標 3：血液透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，105 年為 89.55%~100%。
2. 合格率：Hb>8.5g/dL 之百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，105 年為 $\geq 88.73\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 105 年 Hb 受檢率為 99.19%，較 104 年之 99.50% 略低，仍符合規定合理範圍。
2. 105 年 Hb 平均值為 10.51g/dL，其中>8.5 g/dL 為 98.52%，較 104 年之 98.59% 略低，仍符合參考值範圍。


(三) 分區別：

HB 受檢率:105 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.78%	99.43%	99.27%	99.18%	99.24%	98.37%	99.50%
105 年	98.47%	99.15%	99.12%	98.96%	99.10%	98.29%	99.19%


Hb>8.5g/dL 之百分比：105 年各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	98.40%	98.47%	98.48%	98.81%	98.91%	97.08%	98.59%
105 年	98.21%	98.40%	98.39%	98.49%	98.99%	98.26%	98.52%


(四)層級別：

Hb 受檢率：105 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.64%	99.03%	99.25%	99.22%	99.50%
105 年	99.20%	98.67%	98.06%	99.07%	99.19%

Hb>8.5g/dL 之百分比：105 年各層級統計值皆符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	98.60%	98.57%	97.97%	98.51%	98.59%
105 年	98.72%	98.63%	98.07%	98.32%	98.52%

指標 4：血液透析_住院率（住院次數/每 100 人月）

指標 4-1：血液透析_跨院住院率

（一）參考值：最近 3 平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。


1. 醫學中心： ≤ 13.06 。
2. 區域醫院： ≤ 14.99 。
3. 地區醫院： ≤ 14.20 。
4. 基層診所： ≤ 10.15 。

（二）整體監測結果：

105 年跨院住院次數為 78,718 次，跨院住院率為 9.69，較 104 年之 9.60 略為上升。

（三）分區別：


105 年各分區統計值，除中區及東區較 104 年為低，其他分區呈上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	10.15	9.76	9.99	10.45	9.32	12.30	9.61
104 年	10.13	9.74	9.98	10.43	9.44	12.80	9.60
105 年	10.18	9.88	9.95	10.68	9.58	12.51	9.69


(四) 層級別：

105 年各層級統計值皆符合參考值範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	11.95	13.69	12.83	9.08	9.61
104 年	11.83	13.46	12.74	9.31	9.60
105 年	12.69	13.23	12.65	9.46	9.69

105 年醫學中心的各分區統計值，除臺北(14.06)、中區(14.52)及東區(23.02)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	12.96	8.06	13.60	13.03	8.61	22.81	11.95
104 年	13.33	7.22	13.07	11.32	8.64	23.63	11.83
105 年	14.06	6.84	14.52	11.85	9.84	23.02	12.69

105 年區域醫院的各分區統計值，除東區(16.82)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	13.87	12.46	15.09	13.92	12.97	17.71	13.69
104 年	14.00	12.30	13.87	13.71	13.46	14.74	13.46
105 年	13.41	12.72	13.52	12.95	13.75	16.82	13.23

105 年地區醫院的各分區統計值，除南區(15.51)、高屏(14.52)及東區(17.59)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	12.45	11.68	11.50	15.98	14.87	20.45	12.83
104 年	11.78	12.35	11.98	15.10	14.64	18.88	12.74
105 年	12.56	11.65	11.68	15.51	14.52	17.59	12.65

105 年基層診所的各分區統計值，除南區(10.24)及東區(12.45)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	9.60	9.44	9.09	9.43	8.75	11.52	9.08
104 年	9.94	9.30	9.45	9.59	8.98	12.80	9.31
105 年	9.97	9.70	9.30	10.24	9.14	12.45	9.46

指標 4-2：血液透析_同院住院率

(一) 參考值:最近 3 平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。


1. 醫學中心： ≤ 11.19 。
2. 區域醫院： ≤ 11.90 。
3. 地區醫院： ≤ 4.99 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

(二) 整體監測結果：

105 年同院住院次數為 36,110 次，同院住院率為 4.44，較 104 年之 4.52 略為下降。

(三) 分區別：


105 年各分區統計值，除北區、高屏及東區較 104 年為高，其他分區呈下滑趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	4.68	4.31	4.86	4.16	3.95	6.87	4.55
104 年	4.59	4.39	4.73	4.22	3.95	6.69	4.52
105 年	4.48	4.40	4.69	3.97	3.98	6.70	4.44


(四) 層級別：

105 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	10.25	10.75	4.51	0.00	4.55
104 年	10.15	10.76	4.52	0.00	4.52
105 年	10.84	10.47	4.31	0.00	4.44

105 年醫學中心的各分區統計值，除臺北(12.07)、中區(11.97)及東區(17.93)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	11.22	6.84	11.27	11.50	7.57	17.19	10.25
104 年	11.50	6.03	11.07	10.12	7.51	18.27	10.15
105 年	12.07	5.67	11.97	10.48	8.68	17.93	10.84

105 年區域醫院的各分區統計值皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	11.32	9.13	11.67	10.59	10.21	11.96	10.75
104 年	11.43	8.96	11.18	10.97	10.63	10.84	10.76
105 年	11.00	9.27	10.80	10.06	10.72	11.42	10.47

105 年地區醫院的各分區統計值，除南區(5.05)、高屏(5.56)及東區(6.64)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	3.17	4.39	3.98	5.45	6.15	9.18	4.51
104 年	2.84	4.79	4.03	5.50	6.06	7.74	4.52
105 年	2.85	4.67	3.75	5.05	5.56	6.64	4.31

105 年基層診所的各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

指標 5：血液透析_死亡率（死亡個案數/每 100 人月）

（一）參考值：

1. 透析時間 < 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限。

(1)醫學中心： ≤ 1.11 。

(2)區域醫院： ≤ 1.25 。

(3)地區醫院： ≤ 1.54 。

(4)基層診所： ≤ 1.13 。

2. 透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限。

(1)醫學中心： ≤ 1.07 。

(2)區域醫院： ≤ 1.19 。

(3)地區醫院： ≤ 1.36 。

(4)基層診所： ≤ 1.05 。


（二）整體監測結果：

1. 105 年透析時間 < 1 年之死亡率為 1.00，較 104 年之 1.02 略為下降。

2. 105 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為 1.00，較 104 年之 0.95 略為上升。


(三)分區別：

105 年各分區的透析時間<1 年之死亡率，除中區、高屏及東區較 104 年微幅上升外，其他分區呈下滑趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.07	1.06	1.02	1.02	0.89	0.95	1.01
104 年	1.03	1.06	0.99	1.13	0.93	1.21	1.02
105 年	0.99	0.95	1.03	1.01	1.04	1.24	1.00


105 年各分區的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除臺北及東區較 104 年為低外，其他分區呈微幅上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.01	0.94	0.99	1.04	0.91	1.17	0.97
104 年	0.99	0.91	0.98	0.93	0.95	1.14	0.95
105 年	0.98	1.00	0.99	1.07	0.97	1.06	0.99


(四)層級別：

105 年各層級的透析時間<1 年之死亡率皆符合參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	0.88	1.17	1.39	1.04	1.01
104 年	1.12	1.07	1.47	1.03	1.02
105 年	0.99	1.09	1.41	1.01	1.00

105 年醫學中心的各分區透析時間<1 年之死亡率，除中區(1.20)及南區(1.12)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.09	0.67	0.81	0.91	0.60	0.71	0.88
104 年	1.36	1.14	0.96	0.67	1.00	1.32	1.12
105 年	1.07	0.47	1.20	1.12	0.66	0.99	0.99

105 年區域醫院的透析時間<1 年之死亡率，除東區(2.28)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.17	1.33	1.29	1.08	0.91	1.19	1.17
104 年	1.24	1.10	0.97	1.07	0.90	1.02	1.07
105 年	1.14	1.00	1.05	0.95	1.10	2.28	1.09

105 年地區醫院的透析時間<1 年之死亡率，除南區(1.94)及高屏(1.69)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.46	1.12	1.23	1.76	1.53	1.85	1.39
104 年	1.51	1.29	1.30	2.03	1.45	2.13	1.47
105 年	1.17	1.21	1.49	1.94	1.69	0.85	1.41

105 年基層診所的透析時間<1 年之死亡率，除東區(1.53)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.15	1.18	1.06	0.97	0.84	1.05	1.04
104 年	1.00	1.05	1.17	1.09	0.95	1.11	1.03
105 年	1.06	0.85	1.05	0.97	0.99	1.53	1.01

105 年各層級的透析時間 ≥ 1 年之死亡率皆符合參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	1.04	1.13	1.25	0.97	0.97
104 年	0.95	1.04	1.19	0.98	0.95
105 年	0.98	1.09	1.24	1.02	0.99

105 年醫學中心的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除中區(1.20)及東區(1.69)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.19	0.69	1.28	0.96	0.61	2.19	1.04
104 年	1.16	0.57	1.03	0.64	0.72	1.66	0.95
105 年	1.05	0.80	1.20	0.76	0.76	1.69	0.98

105 年區域醫院的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除北區(1.22)及東區(1.29)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.04	1.10	1.21	1.26	1.06	1.50	1.13
104 年	1.02	1.13	1.07	0.94	1.06	1.15	1.04
105 年	0.95	1.22	1.10	1.12	1.08	1.29	1.09

105 年地區醫院的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除南區(1.47)、高屏(1.41)及東區(1.39)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年季	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.29	1.03	1.13	1.65	1.42	1.70	1.25
104 年	1.28	0.94	1.17	1.38	1.40	1.39	1.19
105 年	1.34	1.09	1.12	1.47	1.41	1.39	1.24

105 年基層診所的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除南區(1.09)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年季	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.04	0.96	0.98	0.94	0.91	1.14	0.97
104 年	1.03	0.94	1.02	0.94	0.96	1.24	0.98
105 年	1.03	1.00	1.02	1.09	0.98	1.03	1.02

指標 6：瘻管重建率(重建次數/每 100 人月)

指標 6-1：血液透析_跨院瘻管重建率


(一) 參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，105 年為 ≤ 0.60 。

(二) 整體監測結果：

105 年跨院重建次數為 3,941 次，跨院瘻管重建率為 0.48，較 104 年之 0.53 降低，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


105 年各分區統計值，除中區(0.88)高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.57	0.42	0.93	0.47	0.22	0.58	0.53
104 年	0.56	0.50	0.94	0.48	0.22	0.43	0.53
105 年	0.48	0.40	0.88	0.45	0.19	0.41	0.48

(四) 層級別：

105 年各層級統計值，除區域醫院(0.64) 高於參考值上限外，其他層級皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	0.63	0.70	0.58	0.48	0.53
104 年	0.60	0.68	0.67	0.47	0.53
105 年	0.56	0.64	0.54	0.43	0.48

指標 6-2：血液透析_同院瘻管重建率


(一) 參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，105 年為 ≤ 0.16 。

(二) 整體監測結果：

105 年同院重建次數為 1,014 次，同院瘻管重建率為 0.12，較 104 年之 0.14 下降，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


105 年各分區統計值，除東區(0.29)高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.19	0.10	0.11	0.10	0.12	0.36	0.14
104 年	0.19	0.09	0.10	0.10	0.11	0.31	0.14
105 年	0.16	0.10	0.08	0.12	0.10	0.29	0.12

(三) 層級別：

105 年各層級統計值，除醫學中心(0.36)及區域醫院(0.25) 高於參考值上限外，其他層級皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	0.45	0.26	0.08	0.00	0.14
104 年	0.40	0.26	0.08	0.00	0.14
105 年	0.36	0.25	0.05	0.00	0.12

指標 7：血液透析_脫離率

(一)參考值：


1. 脫離率(I)-腎功能回復：列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。
2. 脫離率(II)-腎移植：列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。

(二)整體監測結果：

1. 105 年脫離率(I)腎功能回復為 1.08%，較 104 年之 1.17% 略低。
2. 105 年脫離率(II)腎移植為 0.27%，較 104 年之 0.28%略為下降。


(三)分區別：

脫離率(I)-腎功能回復：105 年各分區統計值，除南區及東區較 104 年為高，其他分區呈現下降趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.19%	1.19%	0.86%	1.01%	0.60%	4.85%	1.09%
104 年	1.58%	1.37%	1.36%	0.60%	0.77%	0.00%	1.17%
105 年	1.39%	1.14%	1.15%	1.05%	0.36%	1.30%	1.08%


脫離率(II)-腎移植：105 年各分區統計值，除中區、南區及東區較 104 年為低，其他分區呈現平穩趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.32%	0.16%	0.37%	0.28%	0.29%	0.30%	0.29%
104 年	0.31%	0.18%	0.33%	0.25%	0.26%	0.42%	0.28%
105 年	0.31%	0.28%	0.30%	0.19%	0.26%	0.17%	0.27%


(三) 層級別：

脫離率(I)-腎功能回復:105 年各層級統計值,除醫學中心較 104 年為高外,其他層級皆呈現下滑趨勢。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	1.74%	0.94%	1.30%	0.83%	1.09%
104 年	0.98%	1.17%	1.59%	0.98%	1.17%
105 年	1.53%	0.99%	1.42%	0.79%	1.08%

脫離率(II)-腎移植：105 年各層級統計值，除基層診所較 104 年為低，其他層級呈現平穩或上升趨勢。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	0.69%	0.33%	0.20%	0.23%	0.29%
104 年	0.43%	0.26%	0.28%	0.25%	0.28%
105 年	0.59%	0.26%	0.28%	0.21%	0.27%

指標 8：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率


(一) 參考值：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，105 年為 $\leq 0.35\%$ 。

(二) 整體監測結果：

105 年 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.40%，較 104 年之 0.32% 為高，高於參考值上限。

(三) 分區別：


105 年各分區統計值，除南區(0.32%)及東區(0.35%)符合參考值範圍外，其他分區皆高於參考值上限。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.27%	0.30%	0.34%	0.28%	0.31%	0.79%	0.32%
105 年	0.38%	0.43%	0.52%	0.32%	0.36%	0.35%	0.40%

(四)層級別：

105 年各層級統計值皆高於參考值上限。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.35%	0.27%	0.32%	0.31%	0.32%
105 年	0.37%	0.39%	0.44%	0.38%	0.40%

指標 9：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率


(一)參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，105 年為 $\leq 0.72\%$ 。

(二)整體監測結果：

105 年 C 型肝炎抗體轉陽率為 0.64%，較 104 年之 0.65%稍低，且符合參考值範圍。

(三)分區別：


105 年各分區統計值，除中區(0.79%)及東區(1.06%)高於參考值上限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.56%	0.54%	0.84%	0.80%	0.47%	0.89%	0.65%
105 年	0.59%	0.44%	0.79%	0.59%	0.66%	1.06%	0.64%

(四)層級別：

105 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.07%	0.48%	0.89%	0.74%	0.65%
105 年	0.27%	0.55%	0.69%	0.70%	0.64%

指標 10：55 歲以下血液透析病人移植登錄率


(一) 參考值：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，105 年為 $\geq 19.19\%$ 。

(二) 整體監測結果：

105 年 55 歲以下血液透析病人移植登錄率為 23.37%，較 104 年之 21.37%為高，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


105 年各分區統計值，除高屏(17.75%)低於參考值下限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	21.94%	19.11%	26.84%	18.11%	17.16%	27.74%	21.32%
105 年	24.90%	21.95%	28.68%	19.74%	17.75%	29.27%	23.37%

(四) 層級別：

105 年各層級統計值符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	34.50%	21.29%	19.02%	18.07%	21.32%
105 年	37.06%	22.81%	22.28%	19.79%	23.37%

二、腹膜透析：

指標 1：腹膜透析_血清白蛋白(Albumin)

(一)參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm10\%)$ 為規定合理範圍，105 年為 89.72%~100%。
2. 合格率：
 - (1)血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl(BCG 法)之百分比：最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，105 年為 $\geq 79.14\%$ 。
 - (2)血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.0 gm/dl(BCP 法)之百分比：最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，105 年為 $\geq 77.80\%$ 。

(二)整體監測結果：

1. 105 年血清白蛋白 (Albumin) 受檢率為 99.17% ，較 104 年之 99.69% 略為下降，亦符合規定合理範圍。
2. 105 年血清白蛋白 (BCG 法) 平均值為 3.73 gm/dl，其中 ≥ 3.5 gm/dl 之百分比為 87.55% ，較 104 年之 87.93% 為低，仍符合參考值範圍。
3. 105 年血清白蛋白 (BCP 法) 平均值為 3.23 gm/dl，其中 ≥ 3.0 gm/dl 之百分比為 88.41% ，較 104 年之 86.44% 為高，且符合參考值範圍。


(三) 分區別：

Albumin 受檢率：105 年各分區統計值皆符合規定合理範圍內。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	99.51%	100%	99.93%	99.53%	99.68%	100%	99.69%
105 年	99.03%	99.89%	99.35%	99.25%	98.83%	97.78%	99.17%

Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：105 年各分區統計值皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	86.56%	90.69%	88.94%	87.41%	88.06%	82.61%	87.93%
105 年	85.14%	90.88%	87.74%	88.48%	88.00%	89.39%	87.55%


Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：105 年各分區統計值皆在參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	85.53%	96.15%	90.48%	81.72%	-	77.78%	86.44%
105 年	86.93%	83.33%	90.88%	-	-	-	88.41%


(四) 層級別：

Albumin 受檢率：105 年各層級統計值皆符合規定合理範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	99.72%	99.63%	100.00%	100.00%	99.69%
105 年	99.28%	98.92%	100.00%	100.00%	99.17%

Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：105 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	86.88%	88.54%	93.41%	95.52%	87.93%
105 年	86.44%	88.69%	89.24%	98.11%	87.55%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：105 年各層級統計值，除地區醫院(73.02%)低於參考值下限外，其他層級皆在參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	89.72%	86.64%	68.42%	100.00%	86.44%
105 年	93.16%	88.57%	73.02%	-	88.41%

指標 2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

(一)參考值：


1. Weekly Kt/V 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，105 年為 88.07%~100%。
2. 合格率：Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，105 年為 $\geq 84.25\%$ 。

(二)整體監測結果：

1. 105 年 Weekly Kt/V 受檢率為 97.64%，較 104 年之 97.85% 略為下降，仍符合規定合理範圍。
2. 105 年 Weekly Kt/V 平均值為 2.04，其中 ≥ 1.7 之百分比為 93.57%，較 104 年之 93.61% 略低，仍符合參考值範圍。


(三)分區別：

Weekly Kt/V 受檢率：105 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	97.77%	96.47%	97.63%	98.22%	98.63%	96.38%	97.85%
105 年	96.70%	99.09%	98.13%	97.94%	97.89%	95.56%	97.64%


Weekly Kt/V $\geq$ 1.7 百分比：105 年各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	93.29%	92.22%	91.55%	95.62%	95.19%	96.99%	93.61%
105 年	93.71%	91.62%	91.28%	95.22%	95.30%	98.45%	93.57%


(四) 層級別：

Weekly Kt/V 受檢率：105 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	97.71%	97.94%	97.32%	97.01%	97.85%
105 年	97.29%	97.91%	98.64%	100.00%	97.64%

Weekly Kt/V $\geq$ 1.7 之百分比：105 年各層級統計值皆在參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	93.49%	93.86%	92.20%	87.69%	93.61%
105 年	93.67%	93.53%	93.12%	90.57%	93.57%

指標 3：腹膜透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


1. 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，105 年為 89.77%~100%。
2. 合格率：Hb>8.5 g/dL 之百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，105 年為 $\geq 87.56\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 105 年 Hb 受檢率為 99.10%，較 104 年之 99.74% 略為下降，仍符合規定合理範圍。
2. 105 年 Hb 平均值為 10.22，其中>8.5 g/dL 為 97.14%，較 104 年之 97.29% 為低，仍符合參考值範圍。


(三) 分區別：

Hb 受檢率:105 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	99.70%	100.00%	99.86%	99.44%	99.71%	100.00%	99.74%
105 年	99.08%	99.80%	99.57%	99.23%	98.46%	93.88%	99.10%


Hb>8.5 g/dL 之百分比：105 年各分區統計值皆符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	97.72%	97.32%	97.15%	96.80%	96.98%	96.23%	97.29%
105 年	97.22%	97.77%	95.96%	97.48%	97.44%	97.83%	97.14%


(三)層級別

Hb 受檢率:105 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	99.77%	99.67%	100.00%	100.00%	99.74%
105 年	99.03%	99.12%	100.00%	100.00%	99.10%

Hb> 8.5 g/dL 之百分比:105 年各層級統計值皆符合參考值範圍內。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	97.14%	97.40%	95.73%	100.00%	97.29%
105 年	96.84%	97.55%	96.23%	96.15%	97.14%

指標 4：腹膜透析_住院率（住院次數/每 100 人月）

指標 4-1：腹膜透析_跨院住院率

（一）參考值：最近 3 平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。


1. 醫學中心： ≤ 10.24 。
2. 區域醫院： ≤ 13.68 。
3. 地區醫院： ≤ 16.66 。
4. 基層診所： ≤ 9.33 。

（二）整體監測結果：

105 年跨院住院次數為 8,475 次，跨院住院率為 10.83，較 104 年之 10.49 略為上升。

（三）分區別：


105 年各分區統計值，除北區及南區較 104 年為低外，其他分區呈上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	11.51	11.17	10.39	9.58	9.90	12.51	10.59
104 年	11.13	10.64	10.88	10.02	9.32	13.57	10.49
105 年	11.29	10.30	11.66	9.82	10.44	13.61	10.83


(四)層級別：

105 年各層級統計值皆符合參考值範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	9.43	12.49	15.68	8.05	10.59
104 年	9.19	12.42	13.27	8.63	10.49
105 年	9.68	12.46	14.02	6.04	10.83

105 年醫學中心的各分區統計值，除中區(10.68)及東區(15.10)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	10.05	9.37	9.49	8.25	8.51	14.56	9.43
104 年	9.60	9.14	9.66	7.55	8.55	13.97	9.19
105 年	9.73	9.27	10.68	7.41	9.67	15.10	9.68

105 年區域醫院的各分區統計值，除中區(14.25)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	14.07	12.75	12.76	10.55	11.72	12.84	12.49
104 年	13.72	11.98	13.61	11.87	10.05	13.31	12.42
105 年	13.62	11.03	14.25	11.50	11.40	11.90	12.46

105 年地區醫院的各分區統計值，除臺北(21.37)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	14.46	19.29	10.12	28.85	14.25	-	15.68
104 年	15.29	13.90	9.06	16.03	15.85	-	13.27
105 年	21.37	15.12	10.37	-	14.05	-	14.02

105 年基層診所的各分區統計值，除東區高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	8.33	12.84	7.45	3.73	10.26	0.00	8.05
104 年	33.33	9.14	7.02	8.53	15.79	9.09	8.63
105 年	-	6.58	5.61	5.83	5.41	100.00	6.04

指標 4-2：腹膜透析_同院住院率

(一) 參考值:最近 3 平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。


1. 醫學中心： ≤ 8.92 。
2. 區域醫院： ≤ 11.90 。
3. 地區醫院： ≤ 10.12 。
4. 基層診所： ≤ 0.00 。

(二) 整體監測結果：

105 年同院住院次數為 7,369 次，同院住院率為 9.42，較 104 年之 9.20 略為上升。

(三) 分區別：


105 年各分區統計值，除北區及南區較 104 年為低外，其他分區呈上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	10.22	9.29	8.82	8.04	8.46	11.59	9.22
104 年	9.90	8.83	9.59	8.68	7.99	10.04	9.20
105 年	10.10	8.10	9.99	8.56	8.92	11.29	9.42


(四)層級別：

105 年各層級統計值皆在參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	8.21	10.81	9.37	0.00	9.22
104 年	8.07	10.93	8.73	0.00	9.20
105 年	8.48	10.89	7.99	0.00	9.42

105 年醫學中心的各分區統計值，除中區(9.33)及東區(12.72)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	8.81	8.16	8.18	7.07	7.32	12.76	8.21
104 年	8.35	7.65	8.85	6.61	7.39	12.01	8.07
105 年	8.63	7.52	9.33	6.49	8.52	12.72	8.48

105 年區域醫院的各分區統計值，除臺北(12.25)及中區(12.26)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	12.46	10.77	10.86	8.84	10.12	10.75	10.81
104 年	12.31	10.43	12.01	10.19	8.79	8.36	10.93
105 年	12.25	8.86	12.26	10.07	9.66	9.77	10.89

105 年地區醫院的各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	7.23	11.11	6.82	21.15	8.77	-	9.37
104 年	7.85	9.38	5.77	15.27	10.04	-	8.73
105 年	8.97	8.95	6.82	-	7.55	-	7.99

105 年基層診所的各分區統計值皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 年	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

指標 5：腹膜透析_死亡率（死亡個案數/每 100 人月）

（一）參考值

1. 透析時間 < 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限。

(1)醫學中心： ≤ 0.41 。

(2)區域醫院： ≤ 0.66 。

(3)地區醫院： ≤ 0.51 。

(4)基層診所： ≤ 0.00 。

2. 透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限。

(1)醫學中心： ≤ 0.67 。

(2)區域醫院： ≤ 0.97 。

(3)地區醫院： ≤ 0.82 。

(4)基層診所： ≤ 1.00 。


（二）整體監測結果：

1. 105 年透析時間 < 1 年之死亡率為 0.47，較 104 年之 0.47 相當。

2. 105 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為 0.70，較 104 年之 0.71 略低。


(三)分區別：

105 年各分區的透析時間<1 年之死亡率，除臺北及南區較 104 年為高外，其他分區呈下滑趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.65	0.66	0.40	0.28	0.42	0.00	0.50
104 年	0.56	0.38	0.50	0.30	0.40	0.72	0.47
105 年	0.60	0.36	0.44	0.56	0.33	0.34	0.47


105 年各分區的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除中區及南區較 104 年為高外，其他分區呈下滑趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.84	0.84	0.63	0.84	0.66	0.86	0.76
104 年	0.78	0.81	0.69	0.59	0.62	0.94	0.71
105 年	0.74	0.75	0.75	0.69	0.59	0.43	0.70


(四)層級別：

105 年各層級的透析時間 < 1 年之死亡率皆在參考值範圍內。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	0.38	0.64	0.36	0.00	0.50
104 年	0.38	0.55	0.75	0.00	0.47
105 年	0.37	0.62	0.18	0.00	0.47

105 年醫學中心的各分區透析時間<1 年之死亡率，除北區及高屏符合參考值範圍外，其他分區高於參考值上限。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.62	0.32	0.21	0.37	0.16	0.00	0.38
104 年	0.43	0.34	0.50	0.00	0.21	1.48	0.38
105 年	0.49	0.00	0.51	0.45	0.08	0.61	0.37

105 年區域醫院的各分區透析時間 < 1 年之死亡率，除臺北(0.69)及北區(0.83)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.71	1.00	0.62	0.24	0.81	0.00	0.64
104 年	0.75	0.39	0.49	0.45	0.49	0.00	0.55
105 年	0.69	0.83	0.44	0.61	0.66	0.00	0.62

105 年地區醫院的各分區透析時間 < 1 年之死亡率，除臺北(1.79)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.00	0.42	0.75	0.00	0.00	-	0.36
104 年	0.00	0.46	0.71	0.00	2.82	-	0.75
105 年	1.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.18

105 年基層診所的各分區透析時間<1 年之死亡率皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
104 年	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
105 年	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00

105 年各層級的透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除地區醫院(1.03)高於參考值上限外，其他層級符合參考值範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	0.62	0.98	0.73	1.33	0.76
104 年	0.60	0.87	0.56	0.71	0.71
105 年	0.61	0.81	1.03	0.34	0.70

105 年醫學中心的各分區透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除中區(0.70)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.74	0.46	0.57	0.66	0.47	1.27	0.62
104 年	0.64	0.48	0.73	0.47	0.49	1.20	0.60
105 年	0.67	0.59	0.70	0.55	0.49	0.34	0.61

105 年區域醫院的各分區透析時間 ≥ 1 年之死亡率皆符合參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.04	1.15	0.81	0.99	0.96	0.51	0.98
104 年	0.98	1.27	0.67	0.69	0.85	0.71	0.87
105 年	0.86	0.84	0.89	0.80	0.72	0.52	0.81

105 年地區醫院的各分區透析時間 ≥ 1 年之死亡率，除中區符合參考值範圍外，另臺北、北區及高屏高於參考值上限。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.55	1.03	0.00	0.00	0.54	-	0.73
104 年	1.59	0.60	0.42	0.00	0.27	-	0.56
105 年	1.12	1.23	0.58	-	1.23	-	1.03

105 年基層診所的各分區透析時間 ≥ 1 年之死亡率皆符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.00	3.88	0.51	0.62	0.00	0.00	1.33
104 年	0.00	0.61	0.59	1.55	0.00	0.00	0.71
105 年	-	0.68	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34

指標 6：腹膜透析_腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每 100 人月）


（一）參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，105 年為 ≤ 1.71 。

（二）整體監測結果：

105 年腹膜炎發生次數為 1,200 次，腹膜炎發生率為 1.53，較 104 年之 1.63 為低，且符合參考值範圍。

（三）分區別：


105 年各分區統計值，除東區(2.05)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.74	1.95	1.32	1.79	1.42	2.61	1.64
104 年	1.65	1.77	1.74	1.56	1.47	1.94	1.63
105 年	1.53	1.52	1.58	1.48	1.58	2.05	1.53

(四)層級別：

105 年各層級統計值，除區域醫院(1.73)高於參考值上限外，其他層級符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	1.45	1.97	1.64	1.15	1.64
104 年	1.51	1.80	2.42	1.75	1.63
105 年	1.41	1.73	1.39	1.34	1.53

指標 7：腹膜透析_脫離率

(一)參考值：


- 1.脫離率(I)-腎功能回復：列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。
- 2.脫離率(II)-腎移植：列為監控參考指標，惟不列正負向及參考值。

(二)整體監測結果：

- 1.105 年脫離率(I)腎功能回復為 0.27% ，較 104 年之 0.81%為低。
- 2.105 年脫離率(II)腎移植為 1.29% ，較 104 年之 1.22%為高。


(三)分區別：

脫離率(I)-腎功能回復：105 年各分區統計值呈下滑趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.83%	2.14%	0.44%	2.29%	1.03%	5.88%	1.26%
104 年	0.75%	0.00%	0.92%	0.68%	1.54%	0.00%	0.81%
105 年	0.48%	0.00%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%


脫離率(II)-腎移植：105 年各分區統計值，除南區、高屏及東區較 104 年為低外，其他分區呈上升趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	1.52%	0.86%	1.78%	0.70%	0.37%	1.55%	1.17%
104 年	1.07%	0.50%	1.77%	0.92%	1.43%	3.28%	1.22%
105 年	1.37%	0.88%	2.31%	0.82%	0.88%	0.00%	1.29%


(三)層級別：

脫離率(I)-腎功能回復：105 年各層級統計值呈現下降趨勢。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	1.61%	0.99%	0.00%	0.00%	1.26%
104 年	0.91%	0.80%	0.00%	0.00%	0.81%
105 年	0.18%	0.39%	0.00%	0.00%	0.27%

脫離率(II)-腎移植：105 年各層級統計值，除區域醫院較 104 年為低外，其他層級呈上升趨勢。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
103 年	1.57%	0.60%	0.52%	4.76%	1.17%
104 年	1.35%	1.11%	0.51%	0.00%	1.22%
105 年	1.84%	0.62%	0.53%	2.38%	1.29%

指標 8：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率


(一) 參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，105 年為 $\leq 0.24\%$ 。

(二) 整體監測結果：

105 年 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.21% ，較 104 年之 0.22% 略低，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


105 年各分區統計值，除臺北(0.27%)及南區(0.25%)高於參考值上限外，其他分區符合參考值範圍內。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.18%	0.30%	0.00%	0.51%	0.11%	0.99%	0.22%
105 年	0.27%	0.15%	0.10%	0.25%	0.22%	0.00%	0.21%

(四) 層級別：

105 年各層級統計值，除區域醫院及地區醫院高於參考值上限外，其他層級符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.21%	0.24%	0.00%	0.00%	0.22%
105 年	0.14%	0.27%	0.64%	0.00%	0.21%

指標 9：腹膜透析_C 型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率


（一）參考值：最近 3 年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限，105 年為 $\leq 0.14\%$ 。

（二）整體監測結果：

105 年 C 型肝炎抗體轉陽率為 0.28%，較 104 年之 0.13% 上升，且高於參考值上限。

（三）分區別：


105 年各分區統計值，除東區符合參考值範圍外，其他分區皆高於參考值上限。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	0.17%	0.27%	0.09%	0.00%	0.11%	0.00%	0.13%
105 年	0.15%	0.27%	0.45%	0.48%	0.20%	0.00%	0.28%

(四)層級別：

105 年各層級統計值，除醫學中心符合參考值範圍外，其他層級皆高於參考值上限。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	0.07%	0.18%	0.00%	1.67%	0.13%
105 年	0.03%	0.50%	1.20%	1.96%	0.28%

指標 10：腹膜透析_55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率


(一)參考值：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，105 年為 $\geq 47.05\%$ 。

(二) 整體監測結果：

105 年 55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率為 55.12%，較 104 年之 52.28%為高，且符合參考值範圍。

(三) 分區別：


105 年各分區統計值，除高屏(35.12%)低於參考值下限外，其他分區皆符合參考值範圍。



年度	台北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
104 年	52.75%	47.10%	67.86%	54.98%	34.24%	62.50%	52.28%
105 年	58.73%	51.09%	71.37%	53.27%	35.12%	52.63%	55.12%

(三)層級別：

105 年各層級統計值，除區域醫院(45.45%)及基層診所(34.48%)低於參考值下限外，其他層級皆符合參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
104 年	58.53%	44.24%	35.78%	33.33%	52.28%
105 年	61.83%	45.45%	47.66%	34.48%	55.12%

三、整體透析


指標 1 醫療費用核減率

(一) 整體監測結果：

105 年初核核減率為 0.05% ，與 104 年之 0.05%相當。

(二) 分區別：

105 年各分區統計值，除北區及高屏較 104 年為高，其他分區呈現下滑或平穩趨勢。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
103 年	0.01%	0.14%	0.07%	0.01%	0.01%	0.02%	0.04%
104 年	0.02%	0.11%	0.12%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%
105 年	0.01%	0.19%	0.09%	0.01%	0.02%	0.01%	0.05%

肆、結論：

105年門診透析醫療品質指標全國值，除腎功能回復脫離率與腎移植脫離率列為監控參考指標，血液透析的B型肝炎表面抗原轉陽率、腹膜透析的地區醫院透析時間 ≥ 1 年之死亡率及C型肝炎抗體轉陽率未符合參考值範圍外，其餘指標全國值均符合參考值範圍內（如附錄表1~表2），其中正（負）向趨勢不一致之指標，需留意其後續變化趨勢，而於分區別部分未符合監測目標之項目，相關分區已持續加強注意，並視情況函請院所說明原因，以釐清醫療品質是否異常。本報告指標涉臨床專業，建請台灣腎臟醫學會瞭解原因，適時輔導會員。

附錄 -表1、105年整體性監測結果表：

指標名稱	指標 正負向	參考值* (105年)	監測結果之趨勢
血液透析			
指標1： 血清白蛋白 (Albumin) -受檢率	規定合 理範圍	89.43%~100% ○	105 年受檢率為 98.91%，較 104 年之 99.37%略低，但符合參考值範圍。
血清白蛋白(BCG) $\geq$ 3.5之百分比	正向	$\geq 84.63\%$ ○	Albumin(BCG) ≥ 3.5 gm/dl 百分比之 105 年統計值為 93.78%，較 104 年之 94.03% 略低。
血清白蛋白(BCP) $\geq$ 3.0之百分比	正向	$\geq 83.57\%$ ○	Albumin(BCP) ≥ 3.0 gm/dl 百分比之 105 年統計值為 92.71%，較 104 年之 92.86% 略低。 105 年 2 種檢測方法之監測結果皆符合參考值範圍。
指標2： 尿素氮透析效 率 URR-受檢率	規定合 理範圍	89.29%~100% ○	105 年 URR-受檢率 98.90%，較 104 年之 99.21%為低，但符合參考值範圍。
URR $\geq 65\%$ 之百分比	正向	$\geq 88.97\%$ ○	105 年 URR $\geq 65\%$ 之百分比為 98.91%，較 104 年之 98.85%為高，且符合參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率	規定合 理範圍	89.55%~100% ○	105 年 Hb 受檢率為 99.19%，較 104 年之 99.50%略低，且符合參考值範圍。
Hb >8.5 g/dL之百分比	正向	$\geq 88.73\%$ ○	105 年 Hb >8.5 g/dL 之百分比為 98.52%，與 104 年之 98.59%略低，但符合參考值範圍。
指標4-1： 跨院住院率 (住院次數 /每 100 人月)	負向	醫學中心 ≤ 13.06 ○	105 年每百人月住院次數為 12.69，較 104 年之 11.83 略高，但符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 14.99 ○	105 年每百人月住院次數為 13.23，較 104 年之 13.46 略低，符合參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (105年)	監測結果之趨勢
		地區醫院 ≤ 14.20 ○	105年每百人月住院次數為12.65，較104年之12.74略低，亦符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 10.15 ○	105年每百人月住院次數為9.46，較104年之9.31略高，仍符合參考值範圍。
指標4-2： 同院住院率（住院次數/每100人月）	負向	醫學中心 ≤ 11.19 ○	105年每百人月住院次數為10.84，較104年之10.15為高，仍符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 11.90 ○	105年每百人月住院次數為10.47，較104年之10.76略低，亦符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 4.99 ○	105年每百人月住院次數為4.31，較104年之4.52略低，亦符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 0.00 ○	105年每百人月住院次數為0，與104年之0相當，亦符合參考值範圍。
指標5： 死亡率（死亡個案數/每100人月） 透析時間<1年死亡率 透析時間 ≥ 1 年死亡率	負向	醫學中心 ≤ 1.11 ○	105年透析時間<1年之死亡率為0.99，較104年之1.12略低，符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 1.25 ○	105年透析時間<1年之死亡率為1.09，較104年之1.07略高，仍符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 1.54 ○	105年透析時間<1年之死亡率為1.41，較104年之1.47略低，且符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 1.13 ○	105年透析時間<1年之死亡率為1.01，較104年之1.03略低，且符合參考值範圍。
	負向	醫學中心 ≤ 1.07 ○	105年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為0.98，較104年之0.95為高，亦符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 1.19 ○	105年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為1.09，較104年之1.04為高，但仍符合參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (105年)	監測結果之趨勢
			圍。
		地區醫院 ≤ 1.36 ○	105年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為1.24，較104年之1.19為高，但符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 1.05 ○	105年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為1.02，較104年之0.98為高，但符合參考值範圍。
指標6-1： 跨院瘻管重建率（重建次數/每100人月）	負向	≤ 0.60 ○	105年跨院執行瘻管重建率為0.48，與104年之0.53下降，且符合參考值範圍。
指標6-2： 同院瘻管重建率（重建次數/每100人月）	負向	≤ 0.16 ○	105年同院執行瘻管重建率為0.12，與104年之0.14下降，且符合參考值範圍。
指標7： 脫離率(百分比) 脫離率(I)-腎功能回復 脫離率(II)-腎移植	參考	-- --	105年「脫離率(I)-腎功能回復」為1.08%，較104年1.17%為低。 105年「脫離率(II)-腎移植」為0.27%，較104年之0.28%略低。
指標8： B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.35\%$ ●	105年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.40%，較104年之0.32%為高，且高於參考值上限。
指標9： C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百	負向	$\leq 0.72\%$ ○	105年C型肝炎抗體轉陽率為0.64%，較104年之0.65%略低，且符合參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (105年)	監測結果之趨勢
分比)			
指標10： 55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)	正向	$\geq 19.19\%$ ○	105年55歲以下血液透析病人移植登錄率為23.37%，較104年之21.32%為高，且符合參考值範圍。
腹膜透析			
指標1： 血清白蛋白(Albumin)-受檢率	規定合理範圍	89.72%~100% ○	105年Albumin受檢率為99.17%，較104年之99.69%略低，但符合參考值範圍。
血清白蛋白(BCG) ≥ 3.5 之百分比	正向	$\geq 79.14\%$ ○	Albumin(BCG) ≥ 3.5 gm/dl 百分比之105年統計值為87.55%，較104年之87.93%為低。
血清白蛋白(BCP) ≥ 3.0 之百分比	正向	$\geq 77.80\%$ ○	Albumin(BCP) ≥ 3.0 gm/dl 百分比之105年統計值為88.41%，較104年之86.44%為高。 105年2種檢測方法之監測結果皆符合參考值範圍。
指標2： 尿素氮透析效率 Weekly Kt/V-受檢率	規定合理範圍	88.07%~100% ○	105年Weekly Kt/V-受檢率為97.64%，較104年之97.85%為低，但符合參考值範圍。
Weekly Kt/V ≥ 1.7 之百分比	正向	$\geq 84.25\%$ ○	105年Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比為93.57%，較104年之93.61%略低，但符合參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率	規定合理範圍	89.77%~100% ○	105年Hb受檢率為99.10%，較104年之99.74%下降，但符合參考值範圍。
Hb > 8.5g/dL 之百分比	正向	$\geq 87.56\%$ ○	105年Hb > 8.5g/dL 之百分比為97.14%，較104年之97.29%下降，仍符合參考值範圍

指標名稱	指標 正負向	參考值* (105年)	監測結果之趨勢
			。
指標4-1： 跨院住院率（住院次數 /每100人月）	負向	醫學中心 ≤ 10.24 ○	105年每百人月住院次數為9.68，較 104 年之9.19為高，仍符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 13.68 ○	105年每百人月住院次數為12.46，較 104年之12.42略高，且符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 16.66 ○	105年每百人月住院次數為14.02，較 104年之13.27為高，仍符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 9.33 ○	105年每百人月住院次數為6.04，較 104 年之8.63為低，符合參考值範圍。
指標4-2： 同院住院率（住院次數 /每100人月）	負向	醫學中心 ≤ 8.92 ○	105年每百人月住院次數為8.48，較 104 年之8.07為高，仍符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 11.90 ○	105年每百人月住院次數為10.89，較 104年之10.93為低，符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 10.12 ○	105年每百人月住院次數為7.99，較 104 年之8.73為低，符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 0.00 ○	105年每百人月住院次數為0，與 104年 之0相當，且符合參考值範圍。
指標5： 死亡率（死亡 人數/每100人月） 透析時間<1年死亡率 透析時間 ≥ 1 年死亡率	負向	醫學中心 ≤ 0.41 ○	105年透析時間<1年死亡率為0.37，較 104年之0.38略低，且符合參考值範圍。
		區域醫院 ≤ 0.66 ○	105年透析時間<1年死亡率為0.62，較 104年之0.55為高，仍符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 0.51 ○	105年透析時間<1年死亡率為0.18，較 104年之0.75為低，且符合參考值範圍。
		基層診所 ≤ 0.00 ○	105年透析時間<1年死亡率為0，與 104年之0相當，且符合參考值範圍。
	負向	醫學中心 ≤ 0.67 ○	105年透析時間 ≥ 1 年死亡率為0.61，較 104年之0.60略高，仍符合參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (105年)	監測結果之趨勢
		區域醫院 ≤ 0.97 ○	105年透析時間 ≥ 1 年死亡率為0.81，較104年之0.87為低，且符合參考值範圍。
		地區醫院 ≤ 0.82 ●	105年透析時間 ≥ 1 年死亡率為1.03，較104年之0.56為高，且高於參考值上限。
		基層診所 ≤ 1.00 ○	105年透析時間 ≥ 1 年死亡率為0.34，較104年之0.71為低，亦符合參考值範圍。
指標6： 腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每100人月）	負向	≤ 1.71 ○	105年腹膜炎發生率為1.53，較104年1.63為低，亦符合參考值範圍。
指標7： 脫離率(百分比) 脫離率(I)-腎功能回復 脫離率(II)-腎移植	參考	-- --	105年「脫離率(I)-腎功能回復」為0.27%，較104年之0.81%為低。 105年「脫離率(II)-腎移植」為1.29%，較104年之1.22%為高。
指標8： B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.24\%$ ○	105年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.21%，較104年之0.22%略低，但仍符合參考值範圍。
指標9： C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.14\%$ ●	105年C型肝炎抗體轉陽率為0.28%，較104年之0.13%為高，且高於參考值上限。
指標10： 55歲以下腹膜透析病人移植登錄率	正向	$\geq 47.05\%$ ○	105年55歲以下腹膜透析病人移植登錄率為55.12%，較104年之52.28%為高，仍符合參考值範圍。
整體透析			
指標11： 醫療費用核減率	--	--	105年初核核減率為0.05%，與104年之0.05%相當。

【註】*「○」表該項整體性之醫療品質資訊項目符合參考值範圍

「●」表該項整體性之醫療品質資訊項目未符合參考值範圍

附錄 - 表2、105年分區別指標監測結果彙整表

105年門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標		指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全臺	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全臺	
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率		97.99%	98.97%	98.93%	98.76%	98.87%	97.80%	98.91%	規定合理範圍	89.43%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數		169	75	115	98	118	18	593	正向	-								
		Albumin(BCG)平均值		3.89	3.84	3.89	3.89	3.84	3.93	3.87		≧84.63%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)≧3.5百分		94.18%	92.62%	93.99%	94.02%	93.36%	93.28%	93.78%		-								
		Albumin(BCP)家數		9	6	12	10	1	2	40		≧83.57%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin-平均值(BCP)		3.51	3.44	3.35	3.76	3.21	3.24	3.44	正向	≧83.57%	○	○	○	○	○	○	○	
2	URR (102年新增項目， 取代原Kt/V)	URR-受檢率		98.15%	98.70%	98.94%	98.71%	98.81%	97.74%	98.90%	規定合理範圍	89.29%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		URR-平均值		75.64	75.68	74.69	74.96	74.53	74.14	75.10	正向	-								
		URR≧65%百分比		98.87%	98.72%	98.78%	99.02%	99.05%	98.34%	98.91%		≧88.97%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目， 取代原Hct)	Hb-受檢率		98.47%	99.15%	99.12%	98.96%	99.10%	98.29%	99.19%	規定合理範圍	89.55%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值		10.51	10.42	10.49	10.48	10.60	10.44	10.51	正向	-								
		Hb>8.5百分比		98.21%	98.40%	98.39%	98.49%	98.99%	98.26%	98.52%		≧88.73%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率	醫學中心	住院次數	4322	489	2180	804	1784	728	10259	-	-								
			住院率(人次/每百人月)	14.06	6.84	14.52	11.85	9.84	23.02	12.69	負向	≦13.06	>	○	>	○	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	6965	4202	5001	4959	4251	896	25960	-	-								
			住院率(人次/每百人月)	13.41	12.72	13.52	12.95	13.75	16.82	13.23	負向	≦14.99	○	○	○	○	○	>	○	
		地區醫院	住院次數	4079	4942	4527	2813	3272	721	19970	-	-								
			住院率(人次/每百人月)	12.56	11.65	11.68	15.51	14.52	17.59	12.65	負向	≦14.20	○	○	○	○	>	>	>	○
4-2	同院住院率	醫學中心	住院次數	11775	4088	6081	7744	7703	1182	36996	-	-								
			住院率(人次/每百人月)	9.97	9.70	9.30	10.24	9.14	12.45	9.46	負向	≦10.15	○	○	○	>	○	>	○	
		區域醫院	住院次數	3709	405	1797	711	1574	567	8763	-	-								
			住院率(人次/每百人月)	12.07	5.67	11.97	10.48	8.68	17.93	10.84	負向	≦11.19	>	○	>	○	○	>	○	
		地區醫院	住院次數	5710	3062	3997	3855	3312	608	20544	-	-								
			住院率(人次/每百人月)	11.00	9.27	10.80	10.06	10.72	11.42	10.47	負向	≦11.90	○	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	住院次數	926	1980	1455	916	1254	272	6803	-	-								
			住院率(人次/每百人月)	2.85	4.67	3.75	5.05	5.56	6.64	4.31	負向	≦4.99	○	○	>	>	>	>	○	
		區域醫院	住院次數	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-							
			住院率(人次/每百人月)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≦0.00	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	1.07	0.47	1.20	1.12	0.66	0.99	0.99	負向	≦1.11	○	○	>	>	○	○	>	○
			透析時間≧1年之死亡率	1.05	0.80	1.20	0.76	0.76	1.69	0.98	負向	≦1.07	○	>	○	○	○	>	>	○
6-1	跨院瘻管重建率	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	1.14	1.00	1.05	0.95	1.10	2.28	1.09	負向	≦1.25	○	○	○	○	○	>	○	
			透析時間≧1年之死亡率	0.95	1.22	1.10	1.12	1.08	1.29	1.09	負向	≦1.19	○	>	○	○	○	>	○	
		區域醫院	透析時間<1年之死亡率	1.17	1.21	1.49	1.94	1.69	0.85	1.41	負向	≦1.54	○	○	○	>	>	○	○	
			透析時間≧1年之死亡率	1.34	1.09	1.12	1.47	1.41	1.39	1.24	負向	≦1.36	○	>	○	>	>	>	○	
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	1.06	0.85	1.05	0.97	0.99	1.53	1.01	負向	≦1.13	○	○	○	○	○	>	○	
			透析時間≧1年之死亡率	1.03	1.00	1.02	1.09	0.98	1.03	1.02	負向	≦1.05	○	○	○	>	○	○	○	
6-2	同院瘻管重建率	瘻管重建次數	1120	502	1372	624	301	90	3941	-	-									
		瘻管重建率(人次/每百人月)	0.48	0.40	0.88	0.45	0.19	0.41	0.48	負向	≦0.60	○	○	>	○	○	○	○		
		瘻管重建率(人次/每百人月)	0.16	0.10	0.08	0.12	0.10	0.29	0.12	負向	≦0.16	○	○	○	○	○	>	○		
7	脫離率	腎功能恢復人數	37	15	19	15	5	3	94	-	-									
		脫離率(I)-腎功能回復	1.39%	1.14%	1.15%	1.05%	0.36%	1.30%	1.08%	參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-		
		腎移植人數	61	29	39	22	33	3	187		參考指標	-	-	-	-	-	-	-		
8	B型肝炎表面抗原轉陽率 (105全年)	脫離率(II)-腎移植	0.31%	0.28%	0.30%	0.19%	0.26%	0.17%	0.27%	負向	-									
		轉陽人數	61	38	56	30	39	5	229		-	-								
		轉陽率	15968	8747	10854	9461	10824	1442	56602		≦0.35%	>	>	>	○	>	>	>		
9	C型肝炎抗體轉陽率 (105全年)	轉陽率	0.38%	0.43%	0.52%	0.32%	0.36%	0.35%	0.40%	負向	-									
		轉陽人數	94	37	82	52	68	14	347		-	-								
		轉陽率	15811	8490	10362	8751	10274	1316	54351		≦0.72%	○	○	>	○	○	>	>	○	
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率	登錄人數	0.59%	0.44%	0.79%	0.59%	0.66%	1.06%	0.64%	正向	-									
		登錄率	1130	576	834	524	552	144	3754		-	-								
		病患人數	4538	2624	2908	2654	3109	492	16064		≧19.19%	○	○	○	○	<	○	○		

105年門診透析總額醫療品質資訊彙整表

指標項目			臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全臺	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全臺	
1	腹膜透析部分																		
	血清白蛋白	Albumin-受檢率	99.03%	99.89%	99.35%	99.25%	98.83%	97.78%	99.17%	規定合理範圍	89.72%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	23	18	18	19	16	4	98	正向	-								
		Albumin(BCG)平均值	3.70	3.80	3.71	3.72	3.73	3.74	3.73		-								
		Albumin(BCG)≥3.5百分	85.14%	90.88%	87.74%	88.48%	88.00%	89.39%	87.55%		≥79.14%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	6	2	9	-	-	-	17		-								
		Albumin-平均值(BCP)	3.23	3.22	3.22	-	-	-	3.23		-								
Albumin(BCP)≥3.0百分	86.93%	83.33%	90.88%	-	-	-	88.41%	正向	≥77.80%		○	○	○	-	-	-	○		
2	Weekly Kt/V	Weekly Kt/V-受檢率	96.70%	99.09%	98.13%	97.94%	97.89%	95.56%	97.64%	規定合理範圍	88.07%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	2.03	2.07	2.00	2.06	2.05	2.14	2.04	正向	≥84.25%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	93.71%	91.62%	91.28%	95.22%	95.30%	98.45%	93.57%		≥84.25%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb (102年新增項目， 取代原Hct)	Hb-受檢率	99.08%	99.80%	99.57%	99.23%	98.46%	93.88%	99.10%	規定合理範圍	89.77%~100%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.31	10.39	9.94	10.22	10.22	9.99	10.22	正向	-								
		Hb≥8.5百分比	97.22%	97.77%	95.96%	97.48%	97.44%	97.83%	97.14%		≥87.56%	○	○	○	○	○	○	○	
4-1	跨院住院率	醫學中心	住院次數	1526	415	945	346	761	114	4094	-								
		區域醫院	住院率(人次/每百人月)	9.73	9.27	10.68	7.41	9.67	15.10	9.68	負向	≤10.24	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	1468	447	709	808	629	84	4118	-								
		基層診所	住院率(人次/每百人月)	13.62	11.03	14.25	11.50	11.40	11.90	12.46	負向	≤13.68	○	○	○	○	○	○	○
		醫學中心	住院次數	50	130	76	-	67	-	323	-								
		區域醫院	住院率(人次/每百人月)	21.37	15.12	10.37	-	14.05	-	14.02	負向	≤16.66	○	○	○	-	-	-	○
4-2	同院住院率	醫學中心	住院次數	-	10	17	6	2	1	36	-								
		區域醫院	住院率(人次/每百人月)	-	6.58	5.61	5.83	5.41	100.00	6.04	負向	≤9.33	-	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	1354	337	825	303	671	96	3586	-								
		基層診所	住院率(人次/每百人月)	8.63	7.52	9.33	6.49	8.52	12.72	8.48	負向	≤8.92	○	○	○	○	○	○	○
		醫學中心	住院次數	1321	359	610	707	533	69	3599	-								
		區域醫院	住院率(人次/每百人月)	12.25	8.86	12.26	10.07	9.66	9.77	10.89	負向	≤11.90	○	○	○	○	○	○	○
5	死亡率 (人/每百人月)	醫學中心	住院次數	21	77	50	-	36	-	184	-								
		區域醫院	住院率(人次/每百人月)	8.97	8.95	6.82	-	7.55	-	7.99	負向	≤10.12	○	○	○	-	-	-	○
		地區醫院	住院次數	-	0	0	0	0	0	0	-								
		基層診所	住院率(人次/每百人月)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	○	○	○	○
		醫學中心	透析時間<1年之死亡率	0.49	0.00	0.51	0.45	0.08	0.61	0.37	負向	≤0.41	○	○	○	○	○	○	○
		區域醫院	透析時間≥1年之死亡率	0.67	0.59	0.70	0.55	0.49	0.34	0.61	負向	≤0.67	○	○	○	○	○	○	○
		地區醫院	透析時間<1年之死亡率	0.69	0.83	0.44	0.61	0.66	0.00	0.62	負向	≤0.66	○	○	○	○	○	○	○
		基層診所	透析時間≥1年之死亡率	0.86	0.84	0.89	0.80	0.72	0.52	0.81	負向	≤0.97	○	○	○	○	○	○	○
		醫學中心	透析時間<1年之死亡率	1.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.18	負向	≤0.51	○	○	○	-	-	-	○
		區域醫院	透析時間≥1年之死亡率	1.12	1.23	0.58	-	1.23	-	1.03	負向	≤0.82	○	○	○	-	-	-	○
6	腹膜炎發生率	醫學中心	透析時間<1年之死亡率	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	-	-	-	○
		區域醫院	透析時間≥1年之死亡率	-	0.68	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	負向	≤1.00	-	○	○	○	○	○	○
		基層診所	透析時間<1年之死亡率	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	負向	≤0.00	-	○	○	-	-	-	○
7	脫離率	醫學中心	腹膜炎發生率	409	145	235	174	219	30	1200	-								
		區域醫院	腹膜炎發生率(人次/每百人月)	1.53	1.52	1.58	1.48	1.58	2.05	1.53	負向	≤1.71	○	○	○	○	○	○	○
		基層診所	腎功能恢復人數	2	0	1	0	0	0	3	-	參考指標	-	-	-	-	-	-	-
8	B型肝炎表面抗原 轉陽率 (105全年)	醫學中心	腎移植人數	31	7	28	8	10	0	84	-								
		區域醫院	脫離率(I)-腎移植	1.37%	0.88%	2.31%	0.82%	0.88%	0.00%	1.29%	參考指標	-	-	-	-	-	-	-	-
		基層診所	轉陽人數	5	1	1	2	2	0	11	-								
9	C型肝炎抗體轉陽率 (105全年)	醫學中心	陰性人數	1833	666	1050	800	927	100	5356	-								
		區域醫院	轉陽率	0.27%	0.15%	0.10%	0.25%	0.22%	0.00%	0.21%	負向	≤0.24%	○	○	○	○	○	○	○
		基層診所	轉陽人數	3	2	5	4	2	0	16	-								
10	五十五歲以下透析 病人移植登錄率	醫學中心	陰性人數	1989	734	1110	832	1008	106	5761	-								
		區域醫院	轉陽率	0.15%	0.27%	0.45%	0.48%	0.20%	0.00%	0.28%	負向	≤0.14%	○	○	○	○	○	○	○
		基層診所	登錄人數	659	258	496	269	223	40	1943	-								
10	五十五歲以下透析 病人移植登錄率	醫學中心	病患人數	1122	505	695	505	635	76	3525	-								
		區域醫院	登錄率(百分比)	58.73%	51.09%	71.37%	53.27%	35.12%	52.63%	55.12%	正向	≥47.05%	○	○	○	○	○	○	○
		基層診所	登錄率(百分比)	58.73%	51.09%	71.37%	53.27%	35.12%	52.63%	55.12%	正向	≥47.05%	○	○	○	○	○	○	○

【說明】一、依衛福部102年8月7日衛部保字第1021280007號令發布實施「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一整體性之醫療品質資訊項目製作。
二、105年門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：正向指標以最近3年全國值平均值x(1-10%)作為參考值；負向指標以最近3年全國值平均值x(1+10%)為參考值；
若為當年度新增指標則無參考值，若監測期間未達3年指標，取其現有監測期間做為參考值期間。受檢率為規定合理範圍，最近3年平均(1±10%)。
三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍。
四、本表指標值資料源自健保資料庫給付檔案分析系統。