

95 年第 3 季
門診透析總額專業醫療服務品質報告



中央健康保險局

96 年 3 月

目 錄

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義-----	3
貳、指標值監測結果-----	13
參、本季結論-----	77
肆、前季問題及各分局採行對策-----	79
伍、建議-----	84

附 表

人口學資料

表 1 病患總數（血液透析部分）-----	86
表 2 年齡（血液透析部分）-----	87
表 3 年齡≥65 歲者（血液透析部分）-----	88
表 4 糖尿病腎病病人數（血液透析部分）-----	89
表 5 死亡個案數（血液透析部分）-----	90
表 6 病患總數（腹膜透析部分）-----	91
表 7 年齡（腹膜透析部分）-----	92
表 8 年齡≥65 歲者（腹膜透析部分）-----	93
表 9 糖尿病腎病病人數（腹膜透析部分）-----	94
表 10 死亡個案數（腹膜透析部分）-----	95

專業醫療服務品質指標

指標 5.1 血清白蛋白（血液透析部分）-----	96
指標 5.2 Kt/V（血液透析部分）-----	97
指標 5.3 Hct（血液透析部分）-----	98
指標 5.4 住院率（血液透析部分）-----	99
指標 5.5 死亡率（血液透析部分）-----	100
指標 5.6 瘻管重建率（血液透析部分）-----	101
指標 5.7 脫離率（血液透析部分）-----	102

指標 5.8	血清白蛋白（腹膜透析部分）	-----103
指標 5.9	Weekly Kt/V（腹膜透析部分）	-----104
指標 5.10	Hct（腹膜透析部分）	-----105
指標 5.11	住院率（腹膜透析部分）	-----106
指標 5.12	死亡率（腹膜透析部分）	-----107
指標 5.13	腹膜炎發生率（腹膜透析部分）	-----108
指標 5.14	脫離率（腹膜透析部分）	-----109

壹、專業醫療服務品質指標項目及定義

人口學資料（血液透析部分）

項目	監測頻率	監測內容
病患總數	每3個月	院所數；個案數
年齡（mean, $\pm$ SD）	每3個月	平均年齡；年齡標準差
年齡 $\geq$ 65歲者	每3個月	個案數；百分比
糖尿病腎病病人數	每3個月	個案數；百分比
死亡個案數	每3個月	個案數

專業醫療服務品質（血液透析部分）

指標5.1 血清白蛋白（Albumin）

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：接受血清白蛋白（Albumin）檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

（二）全體平均值

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

（三）百分比

分子：該院血清白蛋白（Albumin） <3.0 百分比值乘以該院之

樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 $< 3.5\text{gm/dl}$ (BCG) 或 $< 3.0\text{gm/dl}$ (BCP) 之百分比 $< 30\%$ ；全國合格率應 $> 80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.2 Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Kt/V檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Kt/V < 1.0 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 <1.0 (Daugirdas 公式) 之百分比 $<10\%$; 全國合格率應 $>80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.3 Hct

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Hct檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Hct $<24\%$ 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 $<24\%$ 之百分比 $<15\%$; 全國合格率應 $>80\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.4 住院率：

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人之總住院次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.5 死亡率

一、公式說明：

（一）透析時間<1年之死亡率

分子：透析少於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

（二）透析時間 $\geq$ 1年之死亡率

分子：透析大於等於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.6 瘻管重建率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：無。

三、 監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.7 脫離率

一、 公式說明：

（一）脫離率I：

分子：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

（二）脫離率II：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、積極性目標值：無

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

人口學資料（腹膜透析部分）

項目	監測頻率	監測內容
病患總數	每3個月	院所數；個案數
年齡（mean, $\pm$ SD）	每3個月	平均年齡；年齡標準差
年齡 $\geq$ 65歲者	每3個月	個案數；百分比
糖尿病腎病病人數	每3個月	個案數；百分比
死亡個案數	每3個月	個案數

專業醫療服務品質（腹膜透析部分）

指標5.8 血清白蛋白（Albumin）

一、公式說明：

（一）受檢率

分子：接受血清白蛋白（Albumin）檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

（二）全體平均值

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

（三）百分比

分子：該院血清白蛋白（Albumin） <3.0 百分比值乘以該院之樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

（一）受檢率 $\geq 90\%$ 。

（二）合格為 $<3.5\text{gm/dl}$ （BCG）或 $<3.0\text{gm/dl}$ （BCP）之百分比 $<40\%$ ；全國合格率應 $>75\%$ 。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.9 Weekly Kt/V

一、公式說明：

（一）受檢率：

分子：接受Weekly Kt/V檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Weekly Kt/V < 1.7百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 90\%$ 。

(二) 合格為 < 1.7 之百分比 < 20% ；全國合格率應 > 75% 。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.10 Hct

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：接受Hct檢驗之樣本數總和。

分母：病患總數。

(二) 全體平均值：

分子：樣本數乘以平均值之總和。

分母：樣本數總和。

(三) 百分比

分子：該院Hct<24% 百分比值乘以該院樣本數之總和。

分母：樣本數總和。

二、積極性目標值：

(一) 受檢率 $\geq 95\%$ 。

(二) 合格為<24% 之百分比<20% ;全國合格率應>75%。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.11 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人之總住院次數

分母：追蹤期間之總病人月數

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.12 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間<1年之死亡率

分子：透析少於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

(二) 透析時間 ≥ 1 年之死亡率

分子：透析大於等於1年之死亡個案數之總和。

分母：追蹤期間總病人月數之總和。

二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每3個月。

指標5.13 腹膜炎發生率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數。

分母：追蹤期間之總病人月數。

二、積極性目標值：

（一）合格為＜4次/100人月。

（二）全國合格率應＞80%。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

指標5.14 脫離率

一、公式說明：

（一）脫離率I：

分子：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

（二）脫離率II：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。


二、積極性目標值：無。

三、監測頻率：每6個月（每年第2、4季，呈現指標數值）。

貳、指標值監測結果

一、人口學資料（血液透析）


（一）院所數：95 年第 3 季院所數為 471 家。95 年第 3 季以台北區 132 家最多、其次中區 99 家、高屏區 85 家。醫學中心 20 家、區域醫院 71 家、地區醫院 159 家、基層診所 221 家。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	123	53	93	75	80	13	437
94 年第 2 季	126	55	93	77	82	13	446
94 年第 3 季	130	55	93	77	81	13	449
94 年第 4 季	134	58	96	77	83	13	461
95 年第 1 季	132	61	98	78	83	13	465
95 年第 2 季	131	62	99	79	84	12	467
95 年第 3 季	132	64	99	79	85	12	471

(二) 病患總數：95年第3季病患總數為46,120人。95年第3季以台北區12,814人最多、其次高屏區8,959人、中區8,570人。醫學中心4,822人，區域醫院11,205人，地區醫院12,704人，基層診所17,389人。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_病患總數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	11,903	6,064	7,973	7,809	8,290	1,008	43,047
94 年第 2 季	12,366	6,091	8,101	7,892	8,598	1,022	44,070
94 年第 3 季	12,552	5,974	8,064	7,853	8,616	1,036	44,095
94 年第 4 季	12,891	6,024	8,220	7,989	8,716	1,040	44,880
95 年第 1 季	12,760	6,446	8,488	8,193	8,859	1,060	45,806
95 年第 2 季	12,867	6,544	8,578	8,256	8,957	1,066	46,268
95 年第 3 季	12,814	6,460	8,570	8,235	8,959	1,082	46,120

(三) 年齡 (mean,±SD)：95 年第 3 季平均年齡為 60.37 歲，年齡標準差為 13.60。95 年第 3 季東區 61.15 歲最高、其次為中區 60.98 歲。醫學中心平均年齡 59.70 歲、區域醫院 61.15 歲、地區醫院 60.94 歲、基層診所 59.64 歲。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_平均年齡



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	60.22	59.45	60.77	59.79	58.81	60.99	59.88
94 年 第 2 季	60.61	59.82	60.73	60.05	58.89	60.94	60.09
94 年 第 3 季	60.56	59.76	60.77	60.07	58.96	61.22	60.11
94 年 第 4 季	60.67	59.89	60.91	60.22	59.12	61.09	60.24
95 年 第 1 季	60.61	59.92	60.72	60.30	59.06	60.76	60.18
95 年 第 2 季	60.83	59.97	60.91	60.40	59.24	60.86	60.34
95 年 第 3 季	60.83	59.98	60.98	60.39	59.30	61.15	60.37


(四) 年齡 ≥ 65 歲者：

1. 95 年第 3 季 ≥ 65 歲個案共 19,200 人。95 年第 3 季台北區 5,574 人最多、中區 3,727 人第二、其次南區 3,423 人。醫學中心 1,895 人、區域醫院 4,903 人、地區醫院 5,556 人、基層診所 6,846 人。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_年齡 ≥ 65 歲者

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	4,945	2,391	3,439	3,129	2,991	434	17,329
94 年第 2 季	5,245	2,463	3,494	3,197	3,142	444	17,985
94 年第 3 季	5,334	2,415	3,482	3,196	3,145	455	18,027
94 年第 4 季	5,498	2,452	3,565	3,296	3,206	454	18,471
95 年第 1 季	5,503	2,628	3,664	3,411	3,278	467	18,951
95 年第 2 季	5,606	2,677	3,727	3,458	3,330	472	19,270
95 年第 3 季	5,574	2,642	3,727	3,423	3,354	480	19,200

2. 年齡 ≥ 65 歲百分比：95年第3季 ≥ 65 歲百分比為41.63%。95年第3季東區44.36% 最高、台北區43.50% 第二、其次中區43.49%。醫學中心39.30%、區域醫院43.76%、地區醫院43.73%、基層診所39.37%。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_年齡 ≥ 65 歲者百分比

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	41.54%	39.43%	43.13%	40.07%	36.08%	43.06%	40.26%
94 年第 2 季	42.41%	40.44%	43.13%	40.51%	36.54%	43.44%	40.81%
94 年第 3 季	42.50%	40.43%	43.18%	40.70%	36.50%	43.92%	40.88%
94 年第 4 季	42.65%	40.70%	43.37%	41.26%	36.78%	43.65%	41.16%
95 年第 1 季	43.13%	40.77%	43.17%	41.63%	37.00%	44.06%	41.37%
95 年第 2 季	43.57%	40.91%	43.45%	41.88%	37.18%	44.28%	41.65%
95 年第 3 季	43.50%	40.90%	43.49%	41.57%	37.44%	44.36%	41.63%

(五) 糖尿病腎病病人數：

1. 95 年第 3 季為 14,271 人。95 年第 3 季台北區 4,118 人最高、南區 2,679 人第二、其次高屏區 2,678 人。醫學中心 1,301 人、區域醫院 3,862 人、地區醫院 3,978 人、基層診所 5,130 人


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病病人數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	3,384	1,776	1,999	2,331	2,333	344	12,167
94 年第 2 季	3,581	1,871	2,058	2,355	2,432	361	12,658
94 年第 3 季	3,659	1,801	2,060	2,357	2,444	384	12,705
94 年第 4 季	3,837	1,856	2,146	2,441	2,516	397	13,193
95 年第 1 季	4,016	2,018	2,300	2,572	2,661	402	13,969
95 年第 2 季	4,090	2,094	2,367	2,644	2,717	400	14,312
95 年第 3 季	4,118	2,035	2,350	2,679	2,678	411	14,271

2. 糖尿病腎病病人數百分比：95年第3季糖尿病腎病病人百分比30.94%。95年第3季東區37.99% 最高、南區32.53% 第二，其次台北區32.14%。醫學中心（26.98%）、區域醫院（34.47%）、地區醫院（31.31%）、基層診所（29.50%）。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_糖尿病腎病病人數百分比



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	28.43%	29.29%	25.07%	29.85%	28.14%	34.13%	28.26%
94 年第 2 季	28.96%	30.72%	25.40%	29.84%	28.29%	35.32%	28.72%
94 年第 3 季	29.15%	30.15%	25.55%	30.01%	28.37%	37.07%	28.81%
94 年第 4 季	29.76%	30.81%	26.11%	30.55%	28.87%	38.17%	29.40%
95 年第 1 季	31.47%	31.31%	27.10%	31.39%	30.04%	37.92%	30.50%
95 年第 2 季	31.79%	32.00%	27.59%	32.03%	30.33%	37.52%	30.93%
95 年第 3 季	32.14%	31.50%	27.42%	32.53%	29.89%	37.99%	30.94%

(六) 死亡個案數：95年第3季死亡個案數852人。95年第3季台北區215人最高，南區187人第二，其次高屏區163人。醫學中心73人、區域醫院250人、地區醫院284人、基層診所245人。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_死亡個案數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	226	141	197	185	204	27	980
94 年 第 2 季	240	118	176	153	181	20	888
94 年 第 3 季	280	134	138	173	171	18	914
94 年 第 4 季	242	112	151	187	169	17	878
95 年 第 1 季	281	153	175	189	189	22	1,009
95 年 第 2 季	232	137	181	177	210	24	961
95 年 第 3 季	215	122	140	187	163	25	852

二、專業醫療服務品質指標（血液透析部分）：

指標5.1：血清白蛋白（Albumin）


（一）整體：

95年第3季受檢率為97.24%，較前一季（96.73%）為高、血清白蛋白平均值（BCG）為3.87gm/dl、血清白蛋白平均值（BCP）為3.47gm/dl，<3.5 gm/dl之百分比為11.93% 較前一季（12.45%）為低，<3.0 gm/dl之百分比為12.19% 較前一季（12.89%）為低。

（二）分區別：


1. 95年第3季以北區之血清白蛋白受檢率95.99% 及東區96.12%，低於整體比率（97.24%）。
2. <3.5 gm/dl之百分比，以東區13.56%、北區13.28%、南區13.14%、中區12.74% 高於整體比率11.93%。
3. <3.0 gm/dl之百分比，以南區25.19%、北區14.92%、中區14.85% 高於整體比率（12.19%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Albumin受檢率



季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	95.15%	93.85%	95.42%	94.31%	94.31%	94.44%	94.69%
94 年第 2 季	95.96%	94.48%	96.49%	96.00%	93.96%	95.69%	95.46%
94 年第 3 季	95.81%	96.48%	96.74%	96.91%	94.94%	95.27%	96.08%
94 年第 4 季	96.13%	96.83%	97.60%	96.92%	96.27%	95.00%	96.64%
95 年第 1 季	96.65%	96.90%	97.27%	97.42%	96.92%	95.66%	96.97%
95 年第 2 季	95.92%	96.71%	97.56%	96.94%	97.12%	94.93%	96.73%
95 年第 3 季	97.29%	95.99%	97.71%	97.51%	97.51%	96.12%	97.24%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Albumin<3.0百分比




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	2.84%	2.87%	2.91%	3.66%	2.76%	4.08%	3.02%
94 年第 2 季	2.42%	3.11%	2.48%	3.86%	3.34%	5.32%	3.03%
94 年第 3 季	2.50%	3.20%	2.28%	3.53%	3.02%	3.40%	2.86%
94 年第 4 季	2.47%	2.61%	2.31%	3.11%	2.26%	4.45%	2.58%
95 年第 1 季	8.56%	8.88%	6.57%	21.22%	5.62%	19.11%	10.65%
95 年第 2 季	10.33%	11.15%	11.42%	24.40%	2.31%	23.49%	12.89%
95 年第 3 季	8.95%	14.92%	14.85%	25.19%	1.15%	9.64%	12.19%

(三) 層級別：


1. 95 年第 3 季受檢率以基層診所 97.06%、區域醫院 97.18%，低於整體比率（97.24%）。
2. <3.5 gm/dl 之百分比，以區域醫院 15.04%、地區醫院 13.64%，高於整體比率（11.93%）
3. <3.0 gm/dl 之百分比，以地區醫院 13.76%，高於整體比率（12.19%）

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Albumin 受檢率



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	94.48%	92.99%	94.89%	95.86%	94.69%
94 年第 2 季	93.58%	94.36%	96.09%	96.27%	95.46%
94 年第 3 季	94.60%	95.82%	96.25%	96.68%	96.08%
94 年第 4 季	96.45%	96.21%	96.71%	96.94%	96.64%
95 年第 1 季	97.61%	96.35%	96.82%	97.30%	96.97%
95 年第 2 季	96.99%	95.95%	96.88%	97.05%	96.73%
95 年第 3 季	97.72%	97.18%	97.36%	97.06%	97.24%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Albumin<3.0百分比



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	2.07%	4.24%	3.50%	2.11%	3.02%
94 年第 2 季	2.47%	4.28%	3.54%	1.92%	3.03%
94 年第 3 季	2.06%	4.12%	3.57%	1.71%	2.86%
94 年第 4 季	2.11%	3.63%	3.21%	1.56%	2.58%
95 年第 1 季	1.17%	3.63%	3.21%	1.56%	10.65%
95 年第 2 季	0.00%	13.76%	14.01%	2.38%	12.89%
95 年第 3 季	0.00%	11.91%	13.76%	0.00%	12.19%

指標5.2：Kt/V


(一) 整體：

95年第3季Kt/V受檢率為94.85%，較前一季（94.77%）為高。95年第3季Kt/V平均值1.71，<1.0百分比1.18% 較前一季（1.16%）為高。

(二) 分區別：


1. 95年第3季以北區之Kt/V受檢率91.44%、東區94.45%，低於整體比率（94.85%）。
2. 95年第3季<1.0之百分比，以東區1.79%、高屏區1.57%、南區1.33%、北區1.27%，高於整體比率（1.18%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V受檢率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	89.92%	88.47%	92.31%	90.33%	88.34%	91.07%	89.96%
94 年第 2 季	92.51%	90.89%	94.38%	93.41%	90.65%	93.05%	92.44%
94 年第 3 季	93.15%	90.89%	95.34%	94.63%	92.62%	92.86%	93.40%
94 年第 4 季	93.48%	94.09%	95.84%	95.41%	92.73%	92.60%	94.17%
95 年第 1 季	94.54%	94.42%	95.75%	94.51%	94.85%	93.49%	94.78%
95 年第 2 季	93.69%	94.24%	95.91%	95.25%	95.28%	93.71%	94.77%
95 年第 3 季	95.47%	91.44%	95.32%	96.03%	94.97%	94.45%	94.85%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V < 1.0百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	1.33%	1.27%	1.38%	1.56%	1.40%	3.12%	1.43%
94 年第 2 季	0.92%	1.45%	0.93%	1.48%	1.42%	1.73%	1.21%
94 年第 3 季	1.09%	1.12%	1.07%	1.49%	1.53%	2.02%	1.27%
94 年第 4 季	1.35%	0.90%	1.32%	1.70%	1.59%	2.51%	1.42%
95 年第 1 季	1.24%	1.07%	1.51%	1.95%	1.65%	2.42%	1.50%
95 年第 2 季	0.91%	0.89%	1.08%	1.38%	1.43%	2.31%	1.16%
95 年第 3 季	0.86%	1.27%	1.00%	1.33%	1.57%	1.79%	1.18%

(三) 層級別：

1. 95年第3季Kt/V受檢率以區域醫院93.35%、地區醫院94.79%，低於整體比率（94.85%）。
2. <1.0百分比，以區域醫院1.54%，高於整體比率（1.18%）。


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V受檢率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	90.21%	87.50%	89.25%	92.29%	89.96%
94 年 第 2 季	90.56%	90.12%	93.27%	93.97%	92.44%
94 年 第 3 季	91.67%	91.23%	94.15%	94.97%	93.40%
94 年 第 4 季	93.17%	92.84%	94.18%	95.41%	94.17%
95 年 第 1 季	95.18%	93.68%	94.66%	95.47%	94.78%
95 年 第 2 季	97.19%	93.31%	94.62%	95.85%	94.77%
95 年 第 3 季	95.42%	93.35%	94.79%	95.72%	94.85%

百分比

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V < 1.0百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	0.90%	2.10%	1.34%	1.25%	1.43%
94 年 第 2 季	0.79%	1.67%	1.33%	0.94%	1.21%
94 年 第 3 季	1.06%	1.68%	1.29%	1.04%	1.27%
94 年 第 4 季	1.60%	1.91%	1.34%	1.10%	1.42%
95 年 第 1 季	1.60%	2.14%	1.55%	1.14%	1.50%
95 年 第 2 季	1.13%	1.49%	1.10%	0.99%	1.16%
95 年 第 3 季	0.94%	1.54%	1.19%	1.02%	1.18%


指標5.3：Hct

(一) 整體：


95年第3季Hct受檢率為97.42%，較前一季（96.83%）為高。95年第3季Hct平均值為31.28，＜24% 百分比3.78% 較前一季（4.31%）為低。

(二) 分區別：

1. 95年第3季以北區之Hct受檢率96.19%、東區96.21%，低於整體比率（97.42%）。
2. ＜24% 之百分比，以南區4.59%、高屏區4.21%，高於整體比率（3.78%）。




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	95.21%	94.15%	95.42%	93.42%	94.46%	94.15%	94.61%
94 年第 2 季	96.23%	94.63%	96.72%	95.82%	94.15%	94.52%	95.58%
94 年第 3 季	96.02%	96.85%	96.85%	96.93%	95.10%	94.40%	96.23%
94 年第 4 季	96.29%	97.00%	97.26%	97.16%	96.43%	94.71%	96.71%
95 年第 1 季	96.10%	97.27%	96.90%	97.53%	97.26%	95.19%	96.87%
95 年第 2 季	96.11%	96.97%	97.21%	97.15%	97.32%	95.03%	96.83%
95 年第 3 季	97.40%	96.19%	97.96%	97.75%	97.63%	96.21%	97.42%



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	4.31%	5.28%	4.10%	6.26%	4.64%	7.65%	4.90%
94 年第 2 季	4.21%	4.51%	4.42%	4.98%	4.95%	6.64%	4.63%
94 年第 3 季	4.19%	4.55%	3.32%	4.91%	4.40%	6.59%	4.30%
94 年第 4 季	4.22%	4.08%	3.70%	4.91%	4.01%	6.08%	4.23%
95 年第 1 季	4.25%	3.90%	3.47%	4.92%	4.17%	5.94%	4.20%
95 年第 2 季	4.13%	3.81%	3.89%	5.27%	4.16%	6.74%	4.31%
95 年第 3 季	3.46%	3.24%	3.43%	4.59%	4.21%	3.79%	3.78%


(三) 層級別：

1. 95 年第 3 季 Hct 受檢率以基層診所 97.15% ，低於整體比率（97.42 % ）。
2. <24% 百分比，以醫學中心 4.62% 、區域醫院 4.11% ，高於整體比率（3.78% ）。



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	94.60%	93.41%	94.39%	95.66%	94.61%
94 年第 2 季	93.78%	94.54%	96.12%	96.37%	95.58%
94 年第 3 季	94.67%	96.08%	96.41%	96.75%	96.23%
94 年第 4 季	96.61%	96.53%	96.72%	96.85%	96.71%
95 年第 1 季	97.53%	96.81%	96.90%	96.70%	96.87%
95 年第 2 季	97.53%	96.33%	97.00%	96.93%	96.83%
95 年第 3 季	97.97%	97.48%	97.51%	97.15%	97.42%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Hct< 24%百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	6.17%	5.35%	4.84%	4.09%	4.90%
94 年第 2 季	5.64%	4.80%	4.92%	3.90%	4.63%
94 年第 3 季	5.13%	4.79%	4.17%	3.78%	4.30%
94 年第 4 季	5.44%	4.56%	4.01%	3.74%	4.23%
95 年第 1 季	5.77%	4.31%	4.25%	3.63%	4.20%
95 年第 2 季	4.81%	5.16%	4.02%	3.83%	4.31%
95 年第 3 季	4.62%	4.11%	3.50%	3.54%	3.78%

指標5.4：住院率（次/100人月）


（一）整體：

95年上半年住院次數為11,505次，住院率為4.46次/100人月較前期（4.05次/100人月）及去年同期（4.19次/100人月）為高。

（二）分區別：

95年上半年以中區4.70次/100人月、南區4.68次/100人月、北區4.61次/100人月，高於整體比率4.46次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	3.95	4.57	4.48	3.85	4.39	3.41	4.19
94 年下半年	3.77	4.12	4.26	3.86	4.50	3.17	4.05
95 年上半年	4.32	4.61	4.70	4.68	4.36	2.57	4.46

(三) 層級別：

95年上半年以區域醫院5.80次/100人月、醫學中心4.76次/100人月、地區醫院4.59次/100人月，高於整體比率4.46次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_住院率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	4.12	5.03	4.98	2.96	4.19
94 年下半年	4.12	5.02	4.68	2.88	4.05
95 年上半年	4.76	5.80	4.59	3.40	4.46

指標5.5：死亡率（人/100人月）


（一）整體：

95年第3季透析時間<1年之死亡率為1.08人/100人月，較前一季（1.17人/100人月）為低。透析時間 $\geq$ 1年之死亡率為0.57人/100人月，較前一季（0.66人/100人月）為低。


（二）分區別：

1. 95年第3季透析時間<1年之死亡率，以東區1.34人/100人月、北區1.21人/100人月及南區1.20人/100人月，高於整體死亡率（1.08人/100人月）。
2. 透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以南區0.73人/100人月、東區0.69人/100人月，高於整體死亡率（0.57人/100人月）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析<1年死亡率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	1.02	1.14	1.36	1.48	1.09	0.40	1.18
94 年第 2 季	0.89	1.11	1.29	0.80	1.19	1.07	1.05
94 年第 3 季	1.14	1.15	0.67	1.06	0.99	1.14	1.01
94 年第 4 季	1.19	1.03	0.91	1.17	1.12	0.69	1.09
95 年第 1 季	1.24	1.25	1.01	1.03	1.32	1.21	1.18
95 年第 2 季	0.93	1.07	1.08	1.26	1.54	1.41	1.17
95 年第 3 季	1.01	1.21	0.86	1.20	1.13	1.34	1.08


透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析 ≥ 1 年死亡率

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	0.61	0.79	0.78	0.70	0.82	1.06	0.73
94 年第 2 季	0.63	0.58	0.64	0.65	0.63	0.59	0.63
94 年第 3 季	0.69	0.69	0.57	0.70	0.61	0.45	0.65
94 年第 4 季	0.55	0.57	0.58	0.74	0.57	0.51	0.60
95 年第 1 季	0.72	0.79	0.72	0.80	0.67	0.64	0.73
95 年第 2 季	0.59	0.69	0.69	0.67	0.71	0.66	0.66
95 年第 3 季	0.51	0.57	0.52	0.73	0.55	0.69	0.57


(三) 層級別：

1. 95年第3季透析時間<1年之死亡率，以地區醫院1.39人/100人月、區域醫院1.22人/100人月，高於整體死亡率（1.08人/100人月）。
2. 透析時間 $\geq$ 1年之死亡率，以區域醫院0.70人/100人月、地區醫院0.68人/100人月，高於整體死亡率（0.57人/100人月）。
- 3.

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析<1年死亡率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	1.04	1.61	1.21	0.83	1.18
94 年第 2 季	0.38	1.27	1.75	0.47	1.05
94 年第 3 季	0.76	1.36	1.29	0.60	1.01
94 年第 4 季	0.65	1.54	1.45	0.60	1.09
95 年第 1 季	0.72	1.58	1.47	0.77	1.18
95 年第 2 季	0.88	1.36	1.67	0.69	1.17
95 年第 3 季	0.81	1.22	1.39	0.78	1.08

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析 ≥ 1 年死亡率

年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	0.58	0.91	0.92	0.51	0.73
94 年 第 2 季	0.54	0.79	0.68	0.50	0.63
94 年 第 3 季	0.56	0.86	0.68	0.51	0.65
94 年 第 4 季	0.51	0.80	0.70	0.41	0.60
95 年 第 1 季	0.77	0.93	0.80	0.54	0.73
95 年 第 2 季	0.73	0.79	0.74	0.50	0.66
95 年 第 3 季	0.48	0.70	0.68	0.45	0.57

指標5.6：瘻管重建率（次/100人月）


（一）整體：

95年上半年瘻管重建個案數為1,130人，瘻管重建率為0.44次/100人月，較前期（0.76次/100人月）及去年同期（0.90次/100人月）為低。

（二）分區別：

95年上半年瘻管重建率以東區0.97次/100人月、南區0.50次/100人月、台北區0.46次/100人月，高於整體平均值（0.44次/100人月）。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半季	1.09	0.57	0.90	0.99	0.75	1.31	0.90
94 年下半季	0.83	0.59	0.86	0.75	0.64	1.25	0.76
95 年上半季	0.46	0.41	0.36	0.50	0.37	0.97	0.44

(三) 層級別：

95年上半年瘻管重建率以地區醫院0.50次/100人月、區域醫院0.46次/100人月，高於整體平均值0.44次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_瘻管重建率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半季	0.75	1.01	1.06	0.76	0.90
94 年下半季	0.79	1.05	0.72	0.58	0.76
95 年上半季	0.41	0.46	0.50	0.39	0.44

指標5.7：脫離率


(一) 整體：

95年上半年腎功能回復脫離率1.18%，較前期（1.10%）及去年同期（0.96%）為高，腎移植脫離率0.34%，較前期（0.44%）及去年同期（0.37%）為低。

(二) 分區別：


1. 腎功能回復脫離率：95年上半年以北區0.00%、高屏區0.74%、東區1.02%，低於整體平均值1.18%。
2. 腎移植脫離率：95年上半年以東區0.09%、北區0.21%、南區0.24%、中區0.25%，低於整體平均值0.34%。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	1.01%	1.68%	1.28%	0.46%	0.39%	2.00%	0.96%
94 年下半年	1.73%	1.33%	1.23%	0.35%	0.46%	2.22%	1.10%
95 年上半年	1.97%	0.00%	1.37%	1.17%	0.74%	1.02%	1.18%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率II(腎移植脫離率)




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	0.40%	0.22%	0.43%	0.43%	0.28%	0.77%	0.37%
94 年下半年	0.71%	0.44%	0.32%	0.27%	0.28%	0.75%	0.44%
95 年上半年	0.52%	0.21%	0.25%	0.24%	0.38%	0.09%	0.34%

(三) 層級別：


1. 腎功能回復脫離率：95年上半年以地區醫院0.43%、基層診所0.63%，低於整體平均值1.18%。
2. 腎移植脫離率：95年上半年以地區醫院0.26%、區域醫院及基層診所0.33%，低於整體平均值0.34%。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	0.28%	1.65%	1.27%	0.25%	0.96%
94 年下半年	1.95%	2.24%	0.40%	0.43%	1.10%
95 年上半年	1.92%	2.30%	0.43%	0.63%	1.18%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_脫離率II(腎移植脫離率)




年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	0.48%	0.42%	0.34%	0.32%	0.37%
94 年下半年	0.55%	0.58%	0.41%	0.33%	0.44%
95 年上半年	0.61%	0.33%	0.26%	0.33%	0.34%

二、人口學資料（腹膜透析）

（一）院所數：95 年第 3 季院所數為 63 家，以台北區 19 家最多、其次高屏區、南區及中區 11 家。其中醫學中心 18 家、區域醫院 41 家、地區醫院 3 家、基層診所 1 家。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_院所數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	17	6	9	9	9	1	51
94 年 第 2 季	18	7	10	9	10	2	56
94 年 第 3 季	18	7	10	10	10	2	57
94 年 第 4 季	18	8	10	10	11	2	59
95 年 第 1 季	19	9	11	11	11	2	63
95 年 第 2 季	19	7	11	10	11	2	60
95 年 第 3 季	19	9	11	11	11	2	63

(二) 病患總數：95年第3季病患總數為3,787人。以台北區1,381人最多、其次中區755人、北區547人。其中醫學中心2,620人，區域醫院1,129人、地區醫院21人、基層診所17人。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_病患總數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	1, 231	461	739	369	405	60	3, 265
94 年 第 2 季	1, 273	472	741	395	422	60	3, 363
94 年 第 3 季	1, 293	483	720	422	430	59	3, 407
94 年 第 4 季	1, 297	501	734	429	449	63	3, 473
95 年 第 1 季	1, 336	516	746	469	474	63	3, 604
95 年 第 2 季	1, 356	497	766	489	502	69	3, 679
95 年 第 3 季	1, 381	547	755	506	525	73	3, 787

(三) 年齡(mean,±SD)：95年第3季平均年齡50.39歲，年齡標準差為15.26。台北區52.26歲、北區49.26歲、中區50.69歲、南區49.37歲、高屏區46.57歲、東區54.83歲。醫學中心平均年齡49.68歲、區域醫院51.97歲、地區醫院55.52歲、基層診所47.46歲。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_平均年齡



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	51.40	48.69	51.45	47.20	44.79	54.93	49.80
94 年第 2 季	51.58	48.47	51.28	48.06	44.71	54.38	49.85
94 年第 3 季	51.62	48.33	50.85	48.70	44.95	54.74	49.84
94 年第 4 季	51.95	48.70	50.78	48.47	45.41	55.23	50.02
95 年第 1 季	52.07	48.81	50.56	48.86	45.54	55.75	50.08
95 年第 2 季	52.01	49.00	50.87	49.21	45.84	55.45	50.22
95 年第 3 季	52.26	49.26	50.69	49.37	46.57	54.83	50.39


(四) 年齡 ≥ 65 歲者：

1. 95 年第 3 季 ≥ 65 歲個案共 685 人。95 年第 3 季台北區 297 人最多、中區 143 人第二、其次北區 83 人，醫學中心 452 人、區域醫院 221 人、地區醫院 8 人、基層診所 4 人。



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	258	62	157	39	37	17	570
94 年第 2 季	274	59	155	47	34	17	586
94 年第 3 季	284	59	144	56	36	17	596
94 年第 4 季	293	68	143	59	41	19	623
95 年第 1 季	293	72	141	72	43	18	639
95 年第 2 季	290	72	150	80	50	18	660
95 年第 3 季	297	83	143	81	63	18	685

2. ≥ 65 歲個案百分比：東區24.66% 最高、台北區21.51% 第二、其次中區18.94% 。醫學中心17.25% 、區域醫院19.57% 。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_年齡 ≥ 65 歲者百分比

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	20.96%	13.45%	21.24%	10.57%	9.14%	28.33%	17.46%
94 年 第 2 季	21.52%	12.50%	20.92%	11.90%	8.06%	28.33%	17.42%
94 年 第 3 季	21.96%	12.22%	20.00%	13.27%	8.37%	28.81%	17.49%
94 年 第 4 季	22.59%	13.57%	19.48%	13.75%	9.13%	30.16%	17.94%
95 年 第 1 季	21.93%	13.95%	18.90%	15.35%	9.07%	28.57%	17.73%
95 年 第 2 季	21.39%	14.49%	19.58%	16.36%	9.96%	26.09%	17.94%
95 年 第 3 季	21.51%	15.17%	18.94%	16.01%	12.00%	24.66%	18.09%

(五) 糖尿病腎病病人數：

1. 95 年第 3 季糖尿病個案數 663 人，台北區 261 人最高、中區 127 人第二、其次南區 98 人，醫學中心 398 人、區域醫院 258 人、地區醫院 5 人、基層診所 2 人。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎病病人數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	224	59	132	49	43	22	529
94 年 第 2 季	237	57	129	62	41	18	544
94 年 第 3 季	235	58	119	68	45	17	542
94 年 第 4 季	243	67	121	70	50	19	570
95 年 第 1 季	248	68	125	85	54	22	602
95 年 第 2 季	251	69	131	87	56	25	619
95 年 第 3 季	261	88	127	98	63	26	663

2. 糖尿病病人百分比：東區35.62% 最高、南區19.37% 、台北區18.90% 。醫學中心15.19% 、區域醫院22.85% 、地區醫院23.81% 、基層診所11.76% 。


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_糖尿病腎病病人百分比



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年 第 1 季	18.20%	12.80%	17.86%	13.28%	10.62%	36.67%	16.20%
94 年 第 2 季	18.62%	12.08%	17.41%	15.70%	9.72%	30.00%	16.18%
94 年 第 3 季	18.17%	12.01%	16.53%	16.11%	10.47%	28.81%	15.91%
94 年 第 4 季	18.74%	13.37%	16.49%	16.32%	11.14%	30.16%	16.41%
95 年 第 1 季	18.56%	13.18%	16.76%	18.12%	11.39%	34.92%	16.70%
95 年 第 2 季	18.51%	13.88%	17.10%	17.79%	11.16%	36.23%	16.83%
95 年 第 3 季	18.90%	16.09%	16.82%	19.37%	12.00%	35.62%	17.51%

(六) 死亡個案數：95年第3季死亡個案數58人。台北區30人最高，南區9人第二，中區及北區7人。醫學中心32人、區域醫院25人、地區醫院1人、基層診所0人。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_死亡個案數



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	27	10	9	9	4	3	62
94 年第 2 季	25	3	11	7	4	1	51
94 年第 3 季	23	5	7	10	0	1	46
94 年第 4 季	24	9	15	7	2	3	60
95 年第 1 季	25	6	13	4	6	6	60
95 年第 2 季	26	4	14	8	5	0	57
95 年第 3 季	30	7	7	9	3	2	58

三、專業醫療服務品質指標：(腹膜透析部分)

指標5.8：血清白蛋白(Albumin)


(一) 整體：

95年第3季血清白蛋白受檢率為96.38%，較前一季(95.79%)為高，血清白蛋白平均值(BCG)為3.74gm/dl，血清白蛋白平均值(BCP)為3.36gm/dl，<3.5 gm/dl之百分比為22.45%較前一季(22.06%)為高，<3.0 gm/dl之百分比為22.95%較前一季(21.84%)為高。

(二) 分區別：


1. 95年第3季血清白蛋白受檢率，以台北區93.92%、東區95.89%，低於整體受檢率(96.38%)。
2. 95年第3季<3.5gm/dl之百分比，以東區35.50%、中區27.74%、高屏區24.98%，高於整體百分比(22.45%)。
3. 95年第3季<3.0gm/dl之百分比，以東區25.00%及台北區24.21%，高於整體百分比(22.95%)。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin受檢率



季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	88.30%	94.14%	90.39%	93.50%	93.58%	83.33%	90.75%
94 年第 2 季	93.01%	98.94%	93.66%	94.68%	92.89%	96.67%	94.23%
94 年第 3 季	89.87%	98.76%	96.53%	96.68%	96.05%	94.92%	94.25%
94 年第 4 季	93.60%	98.80%	96.32%	96.97%	96.44%	92.06%	95.68%
95 年第 1 季	93.27%	98.84%	97.99%	95.52%	96.84%	95.24%	95.84%
95 年第 2 季	93.81%	98.39%	96.61%	96.32%	97.21%	92.75%	95.79%
95 年第 3 季	93.92%	97.44%	98.41%	97.83%	97.52%	95.89%	96.38%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin< 3.0百分比




季別	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	5.46%	4.41%	9.20%	5.37%	5.65%	14.00%	6.31%
94 年第 2 季	5.38%	4.85%	10.53%	6.29%	6.34%	15.45%	6.84%
94 年第 3 季	4.84%	6.79%	5.25%	5.99%	5.74%	12.54%	5.62%
94 年第 4 季	4.72%	5.68%	6.67%	4.31%	2.93%	13.97%	5.15%
95 年第 1 季	16.13%	19.05%	0.00%	23.50%	0.00%	33.30%	16.83%
95 年第 2 季	21.04%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	21.84%
95 年第 3 季	24.21%	15.79%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	22.95%

(三) 層級別：


1. 95年第3季以醫學中心血清白蛋白受檢率為96.34%，低於整體比率（96.38%）。
2. 血清白蛋白＜3.5之百分比，以地區醫院47.61%、區域醫院26.20%，高於整體比率（22.45%）。
3. 血清白蛋白＜3.0之百分比，以醫學中心及地區醫院為0.00%，低於整體比率（22.95%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin受檢率



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	92.39%	86.37%	0.00%	-	90.75%
94 年第 2 季	94.69%	92.96%	100.00%	-	94.23%
94 年第 3 季	94.05%	94.72%	95.24%	-	94.25%
94 年第 4 季	95.96%	94.88%	100.00%	-	95.68%
95 年第 1 季	96.32%	94.69%	100.00%	88.89%	95.84%
95 年第 2 季	95.70%	96.00%	100.00%	92.86%	89.42%
95 年第 3 季	96.34%	96.37%	100.00%	100.00%	96.38%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_血清白蛋白Albumin< 3.0百分比



季別	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	5.96%	7.29%	0.00%	-	6.31%
94 年第 2 季	5.90%	9.18%	14.50%	-	6.84%
94 年第 3 季	4.90%	7.43%	4.95%	-	5.62%
94 年第 4 季	4.81%	6.15%	0.00%	-	5.15%
95 年第 1 季	21.10%	14.67%	0.00%	0.00%	16.83%
95 年第 2 季	0.00%	21.84%	0.00%	0.00%	21.84%
95 年第 3 季	0.00%	22.95%	0.00%	0.00%	22.95%

指標5.9：Weekly Kt/V


(一) 整體：

95年上半年Kt/V受檢率為98.56%，平均值2.15，Kt/V<1.7百分比為14.23%。

(二) 分區別：


1. Kt/V受檢率，95年上半年以東區85.51%、北區90.94%、中區94.56%，低於整體平均值98.56%。
2. Kt/V<1.7百分比，95年上半年以東區20.31%、中區16.78%、台北區16.16%、高屏區15.21%，高於整體平均值14.23%。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V受檢率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	89.91%	97.05%	77.29%	94.97%	82.39%	83.87%	87.65%
94 年下半年	96.15%	99.40%	93.05%	100.00%	100.00%	93.65%	100.00%
95 年上半年	100.00%	90.94%	94.56%	99.80%	100.00%	85.51%	98.56%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_KtV < 1.7百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	20.28%	10.66%	16.88%	11.39%	17.12%	25.35%	16.72%
94 年下半年	15.72%	11.76%	14.00%	15.04%	10.72%	25.27%	14.20%
95 年上半年	16.16%	10.01%	16.78%	7.37%	15.21%	20.31%	14.23%

(三) 層級別：


1. Kt/V受檢率，95年上半年以基層診所78.57%、醫學中心96.52%，低於整體平均值98.56%。
2. Kt/V<1.7百分比，95年上半年以基層診所54.73%、地區醫院37.38%、醫學中心14.74%，高於整體平均值14.23%。

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V受檢率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	合計
94 年上半年	87.30%	89.42%	28.57%	-	87.65%
94 年下半年	97.10%	100.00%	100.00%	-	100.00%
95 年上半年	96.52%	100.00%	100.00%	78.57%	98.56%

透析總額專業醫療服務品質指標-血液透析_Kt/V < 1.7百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半季	17.17%	15.45%	50.00%	-	16.72%
94 年下半年	12.57%	17.89%	11.85%	-	14.20%
95 年上半季	14.74%	12.40%	37.38%	54.73%	14.23%

指標5.10：Hct


(一) 整體：

95年第3季受檢率為96.67%，較前一季（96.14%）為高、Hct 平均值29.15，<24% 百分比10.86% 較前一季（10.53%）為高。

(二) 分區別：


1. 95年第3季Hct受檢率以台北區94.42%，低於整體比率（96.67%）。
2. Hct<24% 百分比，95年第3季以中區13.90%、高屏區12.77%、南區11.94%、東區11.17%，高於整體比率（10.86%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct受檢率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	88.63%	94.14%	90.39%	93.50%	93.83%	83.33%	90.90%
94 年第 2 季	93.09%	98.94%	93.79%	94.68%	92.65%	96.67%	94.26%
94 年第 3 季	90.41%	98.96%	98.06%	96.92%	96.05%	94.92%	94.83%
94 年第 4 季	94.22%	99.00%	96.59%	96.97%	97.33%	92.06%	96.11%
95 年第 1 季	93.94%	99.03%	98.26%	96.38%	97.89%	95.24%	96.42%
95 年第 2 季	93.88%	98.99%	97.13%	96.32%	98.01%	94.20%	96.14%
95 年第 3 季	94.42%	97.99%	98.15%	98.02%	97.71%	97.26%	96.67%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct < 24百分比




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	11.79%	14.52%	16.51%	14.67%	15.75%	6.00%	14.00%
94 年第 2 季	8.63%	12.43%	14.88%	10.10%	13.27%	5.59%	11.25%
94 年第 3 季	8.99%	14.24%	15.71%	12.45%	11.89%	8.68%	12.04%
94 年第 4 季	11.09%	12.28%	14.96%	14.18%	12.38%	5.45%	12.54%
95 年第 1 季	10.73%	12.98%	14.83%	16.74%	13.04%	14.95%	13.09%
95 年第 2 季	9.77%	8.92%	12.03%	11.62%	11.58%	4.29%	10.53%
95 年第 3 季	8.93%	8.50%	13.90%	11.94%	12.77%	11.17%	10.86%

(三) 層級別：


1. 95年第3季Hct受檢率以區域醫院96.63%、醫學中心96.64%，低於整體比率（96.67%）。
2. Hct<24% 百分比，95年第3季以基層診所29.00%、醫學中心11.55%，高於整體比率（10.86%）。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct受檢率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	92.51%	86.60%	0.00%	-	90.90%
94 年第 2 季	94.73%	92.96%	100.00%	-	94.26%
94 年第 3 季	94.67%	95.23%	95.24%	-	94.83%
94 年第 4 季	96.37%	95.39%	100.00%	-	96.11%
95 年第 1 季	96.99%	95.07%	100.00%	88.89%	96.42%
95 年第 2 季	96.12%	96.10%	100.00%	100.00%	96.14%
95 年第 3 季	96.64%	96.63%	100.00%	100.00%	96.67%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_Hct < 24百分比



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年第 1 季	14.65%	12.14%	0.00%	-	14.00%
94 年第 2 季	11.98%	9.16%	21.50%	-	11.25%
94 年第 3 季	12.70%	10.55%	4.95%	-	12.04%
94 年第 4 季	13.23%	10.67%	18.63%	-	12.54%
95 年第 1 季	13.32%	12.51%	21.71%	0.00%	13.09%
95 年第 2 季	11.04%	9.33%	8.33%	7.00%	10.53%
95 年第 3 季	11.55%	9.11%	4.76%	29.00%	10.86%

指標5.11：住院率（次/100人月）


（一）整體：

95年上半年，住院次數1,159次，住院率為5.66次/100人月。

（二）分區別：

95年上半年，以中區6.74次/100人月、東區6.61次/100人月、北區6.35次/100人月，高於整體比率5.66次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_住院率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	3.92	3.89	4.67	4.48	4.02	1.97	4.13
94 年下半年	4.12	4.72	4.91	4.76	3.77	4.69	4.42
95 年上半年	5.17	6.35	6.74	5.20	5.00	6.61	5.66

(三) 層級別：

95年上半年，以地區醫院9.42次/100人月、醫學中心5.76次/100人月，高於整體比率5.66次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_住院率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	4.31	3.58	11.96	-	4.13
94 年下半年	4.59	3.74	14.18	-	4.42
95 年上半年	5.76	5.43	9.42	0.00	5.66

指標5.12：死亡率（人/100人月）


（一）整體：

95年第3季透析時間<1年之死亡率為0.55人/100人月，較前一季（0.72人/100人月）為低，透析時間≥1年之死亡率為0.53人/100人月，較前一季（0.50人/100人月）為高。


（二）分區別：

1. 95年第3季透析時間<1年之死亡率，以台北區1.10人/100人月、北區0.67人/100人月，高於整體死亡率0.55人/100人月。
2. 95年第3季透析時間≥1年之死亡率，以東區1.41人/100人月、台北區0.68人/100人月、南區0.66人/100人月，高於整體死亡率0.53人/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析<1年之死亡率



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	1.06	0.39	0.65	0.39	0.00	3.22	0.73
94 年第 2 季	0.64	0.39	0.63	0.36	0.79	1.57	0.62
94 年第 3 季	0.47	0.00	0.22	1.12	0.00	0.00	0.40
94 年第 4 季	0.51	0.66	0.79	0.42	0.19	2.07	0.57
95 年第 1 季	1.03	0.00	0.50	0.27	0.00	0.00	0.51
95 年第 2 季	0.77	0.71	1.18	0.53	0.31	0.00	0.72
95 年第 3 季	1.10	0.67	0.00	0.53	0.00	0.00	0.55


透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析 ≥ 1 年之死亡率

年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年第 1 季	0.60	0.79	0.35	0.89	0.38	0.87	0.58
94 年第 2 季	0.66	0.17	0.46	0.62	0.20	0.00	0.47
94 年第 3 季	0.64	0.42	0.35	0.62	0.00	0.77	0.46
94 年第 4 季	0.51	0.66	0.79	0.42	0.19	2.07	0.57
95 年第 1 季	0.58	0.50	0.66	0.32	0.58	4.48	0.62
95 年第 2 季	0.65	0.17	0.53	0.58	0.37	0.00	0.50
95 年第 3 季	0.68	0.40	0.41	0.66	0.26	1.41	0.53


(三) 層級別：

1. 95年第3季透析時間<1年之死亡率，以區域醫院0.87人/100人月，高於整體死亡率0.55人/100人月。
2. 透析時間 ≥ 1 年之死亡率，以地區醫院4.31人/100人月、區域醫院0.76人/100人月，高於整體死亡率0.53人/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析<1年之死亡率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	0.40	1.53	0.00	-	0.73
94 年 第 2 季	0.38	1.02	2.79	-	0.62
94 年 第 3 季	0.13	0.92	0.00	-	0.40
94 年 第 4 季	0.25	1.13	0.00	-	0.55
95 年 第 1 季	0.52	0.53	0.00	0.00	0.51
95 年 第 2 季	0.90	0.40	0.00	0.00	0.72
95 年 第 3 季	0.40	0.87	0.00	0.00	0.55

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析 ≥ 1 年之死亡率

年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年 第 1 季	0.52	0.76	0.00	-	0.58
94 年 第 2 季	0.41	0.63	0.00	-	0.47
94 年 第 3 季	0.36	0.68	11.03	-	0.46
94 年 第 4 季	0.49	0.73	8.27	-	0.57
95 年 第 1 季	0.47	0.73	8.70	0.00	0.62
95 年 第 2 季	0.53	0.44	0.00	0.00	0.50
95 年 第 3 季	0.43	0.76	4.31	0.00	0.53

指標5.13：腹膜炎發生率（次/100人月）


（一）整體：

95年上半年腹膜炎發生數420人，腹膜炎發生率2.05次/100人月較前期（1.59次/100人）及去年同期（1.65次/100人）為高。

（二）分區別：

95年上半年腹膜炎發生率，以東區3.16次/100人月、北區2.55次/100人月、中區2.33次/100人月，高於整體比率2.05次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半季	1.59	1.52	1.91	1.72	1.50	1.69	1.65
94 年下半季	1.56	1.83	1.18	2.10	1.72	0.83	1.59
95 年上半季	1.74	2.55	2.33	1.83	2.03	3.16	2.05

(三) 層級別：

95年上半年腹膜炎發生率，以醫學中心2.19次/100人月，高於整體比率2.05次/100人月。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_腹膜炎發生率



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	1.77	1.38	0.00	-	1.65
94 年下半年	1.63	1.45	3.38	-	1.59
95 年上半年	2.19	1.75	1.35	0.00	2.05

指標5.14：脫離率


(一) 整體

95年上半年，腎功能回復脫離率0.45% 較前期（0.60%）及去年同期（1.70%）為低，腎移植脫離率1.28% 較前期（2.04%）及去年同期（1.82%）為低。

(二) 分區別


1. 腎功能回復脫離率：95年上半年以中區1.16%，高於整體比率0.45%。
2. 腎移植脫離率：95年上半年以中區1.68%、台北區1.67%，高於整體比率1.28%。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	2.07%	0.00%	5.06%	0.00%	0.00%	0.00%	1.70%
94 年下半年	1.10%	0.00%	0.00%	1.37%	0.00%	0.03%	0.60%
95 年上半年	0.69%	0.00%	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.45%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率II(腎移植脫離率)




年季	台北分局	北區分局	中區分局	南區分局	高屏分局	東區分局	全局
94 年上半年	2.48%	0.63%	1.99%	1.01%	1.64%	1.61%	1.82%
94 年下半年	2.42%	1.99%	1.60%	1.39%	2.64%	0.00%	2.04%
95 年上半年	1.67%	0.75%	1.68%	0.40%	1.19%	0.00%	1.28%

(三) 層級別


1. 腎功能回復脫離率：95年上半年除區域醫院（0.65%）外，其餘層級低於整體比率0.45%。
2. 腎移植脫離率：95年上半年除醫學中心（1.34%）外，其餘層級低於整體比率1.28%。

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率I(腎功能回復脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	2.47%	0.55%	0.00%	-	1.70%
94 年下半年	0.65%	0.55%	0.00%	-	0.60%
95 年上半年	0.35%	0.65%	0.00%	0.00%	0.45%

透析總額專業醫療服務品質指標-腹膜透析_脫離率II(腎移植脫離率)



年季	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全局
94 年上半年	2.06%	1.26%	0.00%	-	1.82%
94 年下半年	2.30%	1.38%	3.70%	-	2.04%
95 年上半年	1.34%	1.17%	0.00%	0.00%	1.28%

參、本季結論：

一、血液透析：

- (一) 95 年第 3 季血清白蛋白 (指標 5.1) 受檢率, 較前季呈現上升趨勢, 而血清白蛋白 $< 3.0\text{gm/dl}$ 及 $< 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比皆在目標值範圍內。
- (二) 95 年第 3 季 Kt/V (指標 5.2) 受檢率, 除北區、中區及高屏外, 皆呈現上升趨勢, 且 Kt/V < 1.0 皆符合目標值範圍。
- (三) 95 年第 3 季 Hct (指標 5.3) 受檢率, 除北區外, 皆呈現上升趨勢, 而 Hct $< 24\%$ 皆符合目標值。
- (四) 95 年上半年住院率 (指標 5.4) 除高屏區及東區外, 呈現上升趨勢。
- (五) 95 年第 3 季 < 1 年死亡率 (指標 5.5) 除台北區及北區外, 皆呈現下降趨勢。95 年第 3 季 ≥ 1 年死亡率, 除南區、東區外, 皆呈現下降趨勢。
- (六) 95 年上半年瘻管重建率 (指標 5.6), 皆呈現下降趨勢。
- (七) 95 年上半年腎功能回復脫離率 (指標 5.7) 除北區、東區外, 呈現上升趨勢。95 年上半年腎移植脫離率除高屏區外, 皆呈現下降趨勢。

二、腹膜透析：

- (一) 95 年第 3 季血清白蛋白 (指標 5.8) 受檢率, 除北區外, 呈現上升趨勢, 且血清白蛋白 $< 3.0\text{gm/dl}$ 及 $< 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比皆在目標值範圍內。
- (二) 95 年上半年 Weekly Kt/V (指標 5.9) 受檢率, 東區及基層診所層級受檢率低於目標值, 地區醫院及基層診所層級 Kt/V < 1.7 之百分比高於目標值。

- (三) 95 年第 3 季 Hct (指標 5.10) 受檢率，除北區、高屏區外，皆呈現上升趨勢，且台北區低於目標值 ($\geq 95\%$)。其中以台北區醫學中心層級低於目標值， $Hct < 24\%$ 之百分比，以東區區域醫院層級及中區基層診所層級高於目標值。
- (四) 95 年上半年住院率 (指標 5.11) 皆呈現上升趨勢。
- (五) 95 年第 3 季 < 1 年之死亡率 (指標 5.12)，除台北區外，皆呈現下降趨勢，95 年第 3 季 ≥ 1 年之死亡率 (指標 5.12)，除中區、高屏區外，皆呈現上升趨勢。
- (六) 95 年上半年腹膜炎發生率 (指標 5.13)，除南區外，皆呈現上升趨勢。
- (七) 95 年上半年腎功能回復脫離率 (指標 5.14)，皆呈現下降趨勢。腎移植脫離率亦皆呈現下降趨勢。

肆、前季問題及各分局採行對策

一、95 年第 2 季監測結果

指標名稱	指標 正負向	變化趨勢	相關說明
血清白蛋白 (Albumin))-血液透析 (指標5.1)	正向	下降 ●	東區及台北區受檢率低於同儕值
Kt/V-血液透析 (指標5.2)	正向	下降 ●	台北區、北區、東區受檢率皆低於同儕值
Hct-血液透析 (指標5.3)	正向	上升 ○	北區、東區受檢率低於同儕值
住院率-血液透析 (指標5.4)	負向	上升 ●	北區、中區、南區高於同儕值
死亡率-血液透析 (指標5.5)	負向	下降 ○	東區、北區、南區及高屏區高於同儕值
瘻管重建率-血液透析 (指標5.6)	負向	下降 ○	東區、南區及台北區高於同儕值
脫離率-血液透析 (指標5.7)	正向	上升 ○	南區、高屏區低於同儕值
血清白蛋白 (Albumin))-腹膜透析 (指標5.8)	正向	下降 ●	台北區、東區受檢率低於同儕值
Weekly Kt/V-腹膜透析 (指標5.9)	正向	上升 ○	北區、中區、東區受檢率低於同儕值
Hct-腹膜透析 (指標5.10)	正向	下降 ●	台北區、東區受檢率低於目標值
住院率-腹膜透析 (指標5.11)	負向	上升 ●	北區、中區、南區及東區高於同儕值

死亡率-腹膜透析（指標5.12）	負向	上升 ●	中區、台北區高於同儕值
腹膜炎發生率-腹膜透析（指標5.13）	負向	上升 ●	東區、北區、中區高於同儕值
脫離率-腹膜透析（指標5.14）	正向	下降 ●	北區、南區、高屏區及東區低於同儕值

註：「○」表該項專業醫療服務品質提升

「●」表該項專業醫療服務品質下降

二、各分局採行對策

指標名稱	各分局採行對策
血清白蛋白 <3.0 百分比-血液透析	南區分局 業於 96 年 2 月 12 日健保南費二字第 0963000141 號函透析院所，針對指標異常部分於文到 7 日內研提問題原因及改善對策。
Kt/V <1.0 百分比-血液透析	南區分局 業於 96 年 2 月 12 日健保南費二字第 0963000141 號函透析院所，針對指標異常部分於文到 7 日內研提問題原因及改善對策。
Hct $<24\%$ 百分比-血液透析	南區分局 業於 96 年 2 月 12 日健保南費二字第 0963000141 號函透析院所，針對指標異常部分於文到 7 日內研提問題原因及改善對策。
死亡率-血液透析	高屏分局： 有關造成死亡率上升之因素多元，因無詳細資料可進行分析管理，建請鈞局轉請台灣腎臟醫學會提供轄區院所資料，俾利分局執行異常監測。

指標名稱	各分局採行對策
住院率-腹膜透析	北區分局： 為有效提昇轄區透析專業醫療服務品質，將於分局全球資訊網回饋各季品質報告卡資料，供透析院所自主管理。 高屏分局： 1. 分局將進一步分析腹膜透析病患住院率上升原因並針對異常醫院加強專業審查。 2. 為期院所專業自主管理，資訊有效回饋與共享原則，將「95 年第 1-2 季門診透析專業醫療服務品質報告」之資訊公佈於高屏分局醫院總額和西醫基層總額園地網站，並於 2 月 13 日辦理「96 年度門診透析服務品質保證保留款實施方案作業說明會」中加強宣導。
死亡率-腹膜透析	北區分局： 為有效提昇轄區透析專業醫療服務品質，將於分局全球資訊網回饋各季品質報告卡資料，供透析院所自主管理。 高屏分局： 有關造成死亡率上升之因素多元，因無詳細資料可進行分析管理，建請鈞局轉請台灣腎臟醫學會提供轄區院所資料，俾利分局執行異常監測。
腹膜炎發生率-腹膜透析	北區分局： 為有效提昇轄區透析專業醫療服務品質，將於分局全球資訊網回饋各季品質報告卡資料，供透析院所自主管理。

指標名稱	各分局採行對策
脫離率-腹膜透析	北區分局： 為有效提昇轄區透析專業醫療服務品質，將於分局全球資訊網回饋各季品質報告卡資料，供透析院所自主管理。

伍、建議：

一、血液透析部分：

- (一) 血清白蛋白(Albumin) (指標5.1)、Kt/V (指標5.2)、Hct (指標5.3) 之全國合格率，符合積極性目標值。顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求之標準。
- (二) 95年上半年住院率 (指標5.4) 除高屏區及東區外，皆呈現上升趨勢，應加強改善。
- (三) 95年第3季<1年死亡率 (指標5.5) 除台北區及北區外，皆呈現下降趨勢，95年第3季 $\geq$ 1年死亡率，除南區、東區外，呈現下降趨勢，顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求之標準。

二、腹膜透析部分：

- (一) 血清白蛋白(Albumin) (指標5.8) 之全國合格率，符合積極性目標值。顯示目前國內透析醫療服務品質尚符現階段要求之標準。
- (二) Weekly Kt/V (指標5.9) 受檢率，東區及基層診所層級受檢率低於目標值，且地區醫院及基層診所層級Kt/V<1.7百分比高於目標值，建議應加強改善。
- (三) Hct (指標5.10) 受檢率，台北區低於目標值 ($\geq 95\%$)，其中以台北區醫學中心層級低於目標值。Hct<24% 之百分比，以東區區域醫院層級及中區基層診所層級高於目標值，建議應加強改善。
- (四) 95年上半年住院率 (指標5.11) 及腹膜炎發生率 (指標5.13) 及95年第3季 $\geq$ 1年死亡率 (指標5.12)，皆呈現上升趨勢，應檢討原因並改善。