

「藥品給付規定」修訂對照表

第9 節 抗腫瘤藥物 Antineoplastics drugs

(自113年9月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
9. 37. Bevacizumab(如 Avastin)： (100/6/1、101/05/1、 106/4/1、108/3/1、109/6/1、 112/8/1、113/3/1、113/6/1、 <u>113/9/1</u>) 1. 轉移性大腸或直腸癌：(略) 2. 惡性神經膠質瘤(WHO 第 4 級)- 神經膠母細胞瘤：(略) 3. 卵巢上皮細胞、輸卵管或原發性 腹膜癌：(109/6/1、113/3/1、 <u>113/9/1</u>) (1)Bevacizumab (限使用 Avastin、<u>Vegzelma</u>) 與 carboplatin 及 paclitaxel 合併使用，接著單獨使用 bevacizumab (限使用 Avastin、<u>Vegzelma</u>) 治療， 作為第四期卵巢上皮細胞、輸 卵管或原發性腹膜癌病人接受 初次手術切除後之第一線治 療。(113/3/1、<u>113/9/1</u>) I.~IV.(略) (2)~(3) (略) (4)FIGO Stage IV disease 具	9. 37. Bevacizumab(如 Avastin)： (100/6/1、101/05/1、 106/4/1、108/3/1、109/6/1、 112/8/1、113/3/1、113/6/1) 1. 轉移性大腸或直腸癌：(略) 2. 惡性神經膠質瘤(WHO 第 4 級)- 神經膠母細胞瘤：(略) 3. 卵巢上皮細胞、輸卵管或原發性 腹膜癌：(109/6/1、113/3/1) (1)Bevacizumab (限使用 Avastin) 與 carboplatin 及 paclitaxel 合併使用，接著單 獨使用 bevacizumab (限使用 Avastin) 治療，作為第四期 卵巢上皮細胞、輸卵管或原發 性腹膜癌病人接受初次手術切 除後之第一線治療。 (113/3/1) I.~IV.(略) (2)~(3) (略) (4)FIGO Stage IV disease 具 germline or somatic BRCA

germline or somatic BRCA 1/2致病性或疑似致病性突變者，若已經申請 olaparib、niraparib 用於第一線化學治療後維持性治療時不得另外申請 bevacizumab 併用，除因 olaparib、niraparib 耐受性不良，在維持性治療可再換成 bevacizumab（限使用 Avastin、Vegzelma）單獨使用，總申請療程以17個療程為上限。(113/3/1、113/9/1) 4. 持續性、復發性或轉移性之子宮頸癌：(略) 5. 晚期、轉移性或復發性非鱗狀非小細胞肺癌(限使用 Avastin、Vegzelma)：(113/3/1、113/6/1、113/9/1) (1)~(4)(略) 6. (略)	1/2致病性或疑似致病性突變者，若已經申請 olaparib、niraparib 用於第一線化學治療後維持性治療時不得另外申請 bevacizumab 併用，除因 olaparib、niraparib 耐受性不良，在維持性治療可再換成 bevacizumab（限使用 Avastin）單獨使用，總申請療程以17個療程為上限。(113/3/1) 4. 持續性、復發性或轉移性之子宮頸癌：(略) 5. 晚期、轉移性或復發性非鱗狀非小細胞肺癌(限使用 Avastin)：(113/3/1、113/6/1) (1)~(4)(略) 6. (略)
9.29. Erlotinib (如 Tarceva)：(96/6/1、96/8/1、97/6/1、101/5/1、101/10/1、102/4/1、102/11/1、103/5/1、106/11/1、108/6/1、108/11/1、109/4/1、109/6/1、109/10/1、111/2/1、111/4/1、113/3/1、113/6/1、113/9/1)	9.29. Erlotinib (如 Tarceva)：(96/6/1、96/8/1、97/6/1、101/5/1、101/10/1、102/4/1、102/11/1、103/5/1、106/11/1、108/6/1、108/11/1、109/4/1、109/6/1、109/10/1、111/2/1、111/4/1、113/3/1、113/6/1)

1. 限單獨使用於(略) 2. Erlotinib 與 bevacizumab(限使用 Avastin、Vegzelma)併用，作為無法手術切除的轉移性（第IV期）且帶有表皮生長因子受體（EGFR）Exon 21 L858R 活性化突變之腦轉移非鱗狀非小細胞肺癌病患的第一線治療。 (113/3/1、113/9/1) 3. 使用注意事項（略）	1. 限單獨使用於(略) 2. Erlotinib 與 bevacizumab(限使用 Avastin)併用，作為無法手術切除的轉移性（第IV期）且帶有表皮生長因子受體(EGFR) Exon 21 L858R 活性化突變之腦轉移非鱗狀非小細胞肺癌病患的第一線治療。(113/3/1) 3. 使用注意事項（略）
9. 85. PARP 抑制劑(如 olaparib、niraparib、talazoparib)： (109/11/1、111/6/1、111/8/1、112/1/1、112/11/1、113/3/1、113/6/1、<u>113/9/1</u>) 1. 卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌 (olaparib、niraparib)： (109/11/1、111/6/1、111/8/1、112/1/1、113/3/1、113/6/1、<u>113/9/1</u>) (1)~(4)(略) (5)FIGO Stage IV disease 具 germline or somatic BRCA 1/2 致病性或疑似致病性突變者，若已經申請 olaparib、niraparib 用於第一線化學治療後維持性治療時不得另外申請 bevacizumab 併用，除因 olaparib、	9. 85. PARP 抑制劑(如 olaparib、niraparib、talazoparib)： (109/11/1、111/6/1、111/8/1、112/1/1、112/11/1、113/3/1、113/6/1) 1. 卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌 (olaparib、niraparib)： (109/11/1、111/6/1、111/8/1、112/1/1、113/3/1、113/6/1) (1)~(4)(略) (5)FIGO Stage IV disease 具 germline or somatic BRCA 1/2 致病性或疑似致病性突變者，若已經申請 olaparib、niraparib 用於第一線化學治療後維持性治療時不得另外申請 bevacizumab 併用，除因 olaparib、

niraparib 耐受性不良，在維持性治療可再換成 bevacizumab(限使用 Avastin、<u>Vegzelma</u>)單獨使用，總申請療程以17個療程為上限。 (113/3/1、113/9/1) 2. 三陰性乳癌：(略)。 3. 去勢療法無效的轉移性攝護腺癌(mCRPC)：(略) 4. 每日最多使用4粒。	niraparib 耐受性不良，在維持性治療可再換成 bevacizumab(限使用 Avastin) 單獨使用，總申請療程以17個療程為上限。(113/3/1) 2. 三陰性乳癌：(略)。 3. 去勢療法無效的轉移性攝護腺癌(mCRPC)：(略) 4. 每日最多使用4粒。
---	---

備註：劃線部分為新修訂規定