

112 年
醫院總額整體性醫療品質資訊公開報告
民眾版



衛生福利部
中央健康保險署
113 年 10 月

目 錄

壹、前言	1
貳、指標意義及趨勢	2
指標 1.門診注射劑使用率	2
指標 2.門診抗生素使用率	3
指標 3-1.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)	4
指標 3-2.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)	5
指標 3-3.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖	6
指標 3-4.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症	7
指標 3-5.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症	8
指標 3-6.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)	9
指標 3-7.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)	10
指標 3-8.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)	11
指標 3-9.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)	12
指標 3-10.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)	13
指標 3-11.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖	14
指標 3-12.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症	15
指標 3-13.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症	16
指標 3-14.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)	17
指標 3-15.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)	18
指標 3-16.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)	19
指標 4.慢性病連續處方箋開立率	20
指標 5.門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率	21
指標 6.十八歲以下氣喘病人急診率	22
指標 7.糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率	23
指標 8.就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率	24

指標 9.非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率.....	25
指標 10.住院案件出院後三日以內急診率.....	26
指標 11-1.剖腹產率-整體.....	27
指標 11-2.剖腹產率-自行要求.....	28
指標 11-3.剖腹產率-具適應症.....	29
指標 11-4.剖腹產率-初次具適應症.....	30
指標 12.清淨手術術後使用抗生素超過三日比率.....	31
指標 13.接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用 ESWL 次數.....	32
指標 14.子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率.....	33
指標 15-1.人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率.....	34
指標 15-2.全人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率.....	35
指標 15-3.半人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率.....	36
指標 16.住院手術傷口感染率.....	37
指標 17.急性心肌梗塞死亡率.....	38
指標 18.失智者使用安寧緩和服務使用率.....	39
指標 19.清淨手術術後傷口感染率.....	40

壹、前言

● 緣起：

本報告係依 112 年 7 月 12 日衛部保字第 1121260209 號令修正發布之「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條第二項整體性之醫療品質資訊項目暨「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」表一所列「專業醫療服務品質指標」目呈現，並利用健保特約醫療機構申報之醫療費用申報資料，進行各指標之趨勢統計。本報告區分「民眾版」與「專業版」。「民眾版」係供一般民眾使用，介紹各指標名稱主要意涵、為什麼要建立這項指標及整體趨勢統計；「專業版」則提供醫療與公共衛生領域人員使用，呈現各指標之操作型定義、整體與六個健保署分區業務組¹及各醫院層級之監測統計。

● 意義：

本報告指標項目依其特性區分為正向指標、負向指標、及非絕對正向或負向指標。對正向指標之監測目的，在於期待指標數值呈上升或平穩但維持高於某一數值之趨勢，若呈現明顯下降趨勢，則需進一步瞭解原因；反之，對負向指標，則期待指標數值呈下降或平穩但維持低於某一數值之趨勢，若呈現明顯上升趨勢，則需進一步瞭解原因；對於非絕對正向或負向指標之監測目的，在於期待指標數值呈平穩趨勢，若呈現巨幅變動，則需進一步瞭解原因。

● 特別聲明：

指標計算係以健保醫療費用申報資料，考量健保申報資料欄位有限，無法反映完整醫療過程與結果，因此，指標數字的表現可能為多重原因造成，醫療適當性仍需就病人情形由醫療專業認定，不應直接認定反映品質，請使用者審慎解讀。

註 1：健保署 6 個分區業務組，係指中央健康保險署臺北、北區、中區、南區、高屏及東區等六個服務範圍。

貳、指標意義及趨勢

指標 1.門診注射劑使用率

一、 指標名稱主要意涵：


治療疾病時，一般民眾認為打針或許會比口服藥品更快速獲得療效，但還是要尊重醫師的判斷，病人不要任意要求打針，以減少感染機會。

二、 為什麼要建立這項指標？

因為打針可能有潛在傷害，必須經由醫師的專業判斷，而不是病人的要求，這樣可以降低打針可能發生的疼痛、過敏反應和避免感染，也減少不必要的醫療。因此透過本項指標監測，若門診注射率持續偏高，則醫院有必要加強與病人溝通，以降低過敏及感染之機會。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.73%，較111年0.72%上升。



指標 2.門診抗生素使用率

一、 指標名稱主要意涵：


抗生素是一群可抑制細菌生長或殺死細菌的生化物質，基本上人類使用抗生素就是用來殺死細菌的，當有細菌侵入我們體內造成感染發生疾病時，醫師通常必需經由一些檢查或細菌培養或由醫師專業判斷造成感染的細菌種類為何，才能正確的選用各種抗生素。而抗生素對一般正常人的病毒感染造成的疾病(例如：感冒)，並沒有明顯的治療增強之效果，反而徒增環境中抗藥株的形成。因此，抗生素的使用必需經由醫師的處方使用。

二、 為什麼要建立這項指標？

抗生素雖可用以殺死細菌，但細菌也會經由基因的突變或因其他細菌身上取得抗藥性基因而演變成抗藥性的細菌。這種抗藥性細菌感染人體後，此時抗生素就殺不死細菌了。一般而言，抗生素使用的愈多，細菌的抗藥性就愈嚴重。為了避免發生大量抗藥性細菌感染的問題，對適合的病症適當的使用抗生素及適合的劑量，以免導致未來沒有抗生素能殺死所感染細菌的情形。為兼顧民眾的用藥安全及品質，所以進行本項指標的監控及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值5.8%，較111年5.4%上升。



指標3-1.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)

一、 指標名稱主要意涵：

「降血壓藥物」是高血壓病人維持正常血壓值不可或缺的藥物，醫師每次門診應該都會依據高血壓病人病情開給適當劑量及日份的「降血壓藥物」。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「降血壓藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「降血壓藥物」，可能造成血壓過低的危險。為瞭解病人於同院所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理，降血壓之用藥在於維持血壓在適當之範圍，若血壓過低則可能有暈眩、血壓過高則頭痛，過於多種的用藥，建議多與醫師討論。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.06%，較111年0.06%持平。



指標3-2.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)

一、 指標名稱主要意涵：

隨著國人生活型態改變及人口老化，罹患心臟血管疾病機會也大幅增加。心臟血管疾病發生的原因極多，在眾多因素中以高血脂症與心臟血管疾病的關係最為明確。過去的研究也顯示，積極改善血脂肪異常可以有效減少心臟血管疾病的發生。一般臨床醫師每次門診應該都會依據病人病情，開給適當劑量及日份的降血脂藥物與飲食之指導，藉以調整適當之血脂濃度。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「降血脂藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「降血脂藥物」，可能造成身體不適或嚴重的藥物副作用。為瞭解病人於同院所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.03%，較111年0.03%持平。



指標3-3.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

一、 指標名稱主要意涵：

藥物治療是控制「糖尿病」重要的方法之一，臨床醫師會在每次門診依據「糖尿病」病人病情開給適當劑量及日份的降血糖藥物組合，請確實依照醫師的處方，按時按量使用藥物，切勿自行調整。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「降血糖藥物」的狀況如下：（一）病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。（二）診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「降血糖藥物」，可能導致血糖過低，嚴重時甚至有致命的危險。為瞭解病人於同院所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理，另本指標可監測院所是否執行用藥適量之相關諮詢。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.03%，較111年0.03%持平。



指標3-4.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

一、 指標名稱主要意涵：

「思覺失調症」是一種嚴重的精神疾病。它主要的症狀包括思考、知覺、情感、行為等多方面之廣泛障礙。臨床醫師門診時會依照病人病情，處方適當劑量及日份的「抗思覺失調症藥物」。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「抗思覺失調症藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「抗思覺失調症藥物」，可能造成身體不適或嚴重的藥物副作用。為瞭解病人於同醫院此類重複拿藥的情形，所以進行本項指標的監控及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.10%，較111年0.10%持平。



指標 3-5.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

一、 指標名稱主要意涵：

藥物療法是治療「憂鬱症」的一種方式，診治的醫師會在門診時依病人病情開給適當劑量及日份的抗憂鬱症藥物，本類藥物之使用常伴隨神經症狀的異常，無論醫師或病患，尤應注意使用。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「抗憂鬱症藥物」的狀況如下：（一）病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。（二）診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「抗憂鬱症藥物」，可能造成身體不適或嚴重的藥物副作用。為瞭解病人同院所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.07%，較111年0.07%持平。



指標 3-6.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)

一、 指標名稱主要意涵：

醫師在門診時應該都會依據病人病情需要開給適當劑量及日份的「安眠鎮靜藥物」，只要能按照醫師的處方，在該吃的時候吃、不過量，避免飲酒，通常是安全而且可以改善生活品質。

二、 為什麼要建立這項指標？


病人最常見重複拿「安眠鎮靜藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「安眠鎮靜藥物」，可能造成身體不適或嚴重的藥物副作用。為瞭解病人同院所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理。安眠鎮靜藥物常有不良之神經症狀副作用出現，此類藥物應審慎使用。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.11%，與111年0.11%相較持平。

同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)



指標 3-7.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)

一、指標名稱主要意涵：

「抗血栓藥物」是心血管疾病病人用於預防及治療血栓形成的藥物，由醫師診斷評估使用，醫師每次門診應該都會依據病人病情開給適當劑量及日份的「抗血栓藥物」。本類藥物之使用應注意劑量與交互作用，無論醫師或病患，尤應注意使用。


二、為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「抗血栓藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。病人若誤食二倍或過高劑量的「抗血栓藥物」，可能造成出血的危險，也容易造成醫療資源的浪費。為瞭解病人於不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理，服用抗血栓藥物絕對不能擅自增加、減少服藥的次數與更改藥量，於就診牙醫時須告知醫師刻正服用抗血栓藥物。

<指標方向性：負向>

三、監測結果：112 年統計值 0.22%，較 111 年 0.21%上升。

同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)



指標 3-8.同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)

一、指標名稱主要意涵：


隨著國人人口老化，罹患前列腺肥大機會也大幅增加。前列腺肥大發生的原因，可能是賀爾蒙不平衡所引起前列腺增生(如老化賀爾蒙改變)，也有人認為與細菌發炎有關。適當運動，增強抵抗力，改善前列腺局部的血循環，養成良好飲食(如清淡及易消化食物和蔬菜)與排便習慣，勿長時間忍尿等預防前列腺肥大疾病的發生。一般臨床醫師每次門診應該都會依據病人病情，開給適當劑量及日份的前列腺肥大藥物。

二、為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「前列腺肥大藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。病人若誤食二倍或過高劑量的「前列腺肥大藥物」，可能造成身體不適或藥物副作用，而重複拿藥也容易造成醫療資源的浪費。為瞭解病人不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，所以進行本項指標的監控及管理。

<指標方向性：負向>

三、監測結果：112 年統計值 0.14%，與 111 年 0.14%相較持平。



指標 3-9.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服)

一、 指標名稱主要意涵：

「降血壓藥物」是高血壓病人維持正常血壓值不可或缺的藥物，醫師每次門診應該都會依據高血壓病人病情開給適當劑量及日份的「降血壓藥物」。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「降血壓藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「降血壓藥物」，可能造成血壓過低的危險。為瞭解病人於不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理。降血壓之用藥在於維持血壓在適當之範圍，若血壓過低則可能有暈眩、血壓過高則頭痛，過於多種的用藥，建議多與醫師討論。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.18%，較111年0.18%持平。



指標3-10.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服)

一、 指標名稱主要意涵：

隨著國人生活型態改變及人口老化，罹患心臟血管疾病機會也大幅增加。心臟血管疾病發生的原因極多，在眾多因素中以高血脂症與心臟血管疾病的關係最為明確。過去的研究也顯示，積極改善血脂肪異常可以有效減少心臟血管疾病的發生。一般臨床醫師每次門診應該都會依據病人病情，開給適當劑量及日份的降血脂藥物與飲食之指導，藉以調整適當之血脂濃度。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「降血脂藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「降血脂藥物」，可能造成身體不適或嚴重的藥物副作用。為瞭解病人不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，所以進行本項指標的監控及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.11%，較111年0.11%持平。



指標3-11.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖

一、 指標名稱主要意涵：

藥物治療是控制「糖尿病」重要的方法之一，臨床醫師會在每次門診依據「糖尿病」病人病情開給適當劑量及日份的降血糖藥物組合，請確實依照醫師的處方，按時按量使用藥物，切勿自行調整。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「降血糖藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「降血糖藥物」，可能導致血糖過低，嚴重時甚至有致命的危險。為瞭解病人於不同醫院及同醫院此類重複拿藥的情形，所以進行本項指標的監控及管理，另本指標可監測院所是否執行用藥適量之相關諮詢。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.09%，較111年0.08%上升。



指標3-12.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症

一、 指標名稱主要意涵：

「思覺失調症」是一種嚴重的精神疾病。它主要的症狀包括思考、知覺、情感、行為等多方面之廣泛障礙。臨床醫師門診時會依照病人病情，處方適當劑量及日份的「抗思覺失調症藥物」。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「抗思覺失調症藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「抗思覺失調症藥物」，可能造成身體不適或嚴重的藥物副作用。為瞭解病人不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，所以進行本項指標的監控及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.26%，較111年0.26%持平。



指標3-13.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症

一、 指標名稱主要意涵：

藥物療法是治療「憂鬱症」的一種方式，診治的醫師會在門診時依病人病情開給適當劑量及日份的抗憂鬱症藥物，本類藥物之使用常伴隨神經症狀的異常，無論醫師或病患，尤應注意使用。


二、 為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「抗憂鬱症藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「抗憂鬱症藥物」，可能造成身體不適或嚴重的藥物副作用。為瞭解病人於不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，所以進行本項指標的監控及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.24%，較111年0.24%持平。



指標3-14.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)

一、 指標名稱主要意涵：

醫師在門診時應該都會依據病人病情需要開給適當劑量及日份的「安眠鎮靜藥物」，只要能按照醫師的處方，在該吃的時候吃、不過量，避免飲酒，通常是安全而且可以改善生活品質。

二、 為什麼要建立這項指標？


病人最常見重複拿「安眠鎮靜藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。

病人若誤食二倍或過高劑量的「安眠鎮靜藥物」，可能造成身體不適或嚴重的藥物副作用。為瞭解病人於不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理，安眠鎮靜的用藥常有不良之神經症狀副作用出現，此類藥物應審慎使用。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.55%，較111年0.54%上升。

跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜(口服)



指標3-15.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗血栓(口服)

一、指標名稱主要意涵：


「抗血栓藥物」是心血管疾病病人用於預防及治療血栓形成的藥物，由醫師診斷評估使用，醫師每次門診應該都會依據病人病情開給適當劑量及日份的「抗血栓藥物」。本類藥物之使用應注意劑量與交互作用，無論醫師或病患，尤應注意使用。

二、為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「抗血栓藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。病人若誤食二倍或過高劑量的「抗血栓藥物」，可能造成出血的危險，也容易造成醫療資源的浪費。為瞭解病人於不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，故進行本項指標的監控及管理，服用抗血栓藥物絕對不能擅自增加、減少服藥的次數與更改藥量，於就診牙醫時須告知醫師刻正服用抗血栓藥物。

<指標方向性：負向>

三、監測結果：112 年統計值 0.45%，較 111 年 0.45%持平。



指標3-16.跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)

一、指標名稱主要意涵：

隨著國人人口老化，罹患前列腺肥大機會也大幅增加。前列腺肥大發生的原因，可能是賀爾蒙不平衡所引起前列腺增生(如老化賀爾蒙改變)，也有人認為與細菌發炎有關。適當運動，增強抵抗力，改善前列腺局部的血循環，養成良好飲食(如清淡及易消化食物和蔬菜)與排便習慣，勿長時間忍尿等預防前列腺肥大疾病的發生。一般臨床醫師每次門診應該都會依據病人病情，開給適當劑量及日份的前列腺肥大藥物。


二、為什麼要建立這項指標？

病人最常見重複拿「前列腺肥大藥物」的狀況如下：(一)病人在原來藥物未用完前，即又自行回診。(二)診治醫師未詢問或審視病人過去拿藥情形。病人若誤食二倍或過高劑量的「前列腺肥大藥物」，可能造成身體不適或藥物副作用，而重複拿藥也容易造成醫療資源的浪費。為瞭解病人不同診所及同診所此類重複拿藥的情形，所以進行本項指標的監控及管理。

<指標方向性：負向>

三、監測結果：112 年統計值 0.58%，較 111 年 0.57%上升。

跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率-前列腺肥大(口服)



指標4.慢性病連續處方箋開立率

一、 指標名稱主要意涵：


目前可以領取慢性病連續處方箋的疾病：包括糖尿病、高血壓…等，詳如「全民健康保險醫療辦法的附表」。如果醫師確認病患病情穩定，經開立連續處方箋，病患可到原開立連續處方箋的醫院、診所或任何一家健保特約藥局調劑。連續處方箋有效期間以三個月為限，可以分多次調劑，每次調劑最多給30日以內的用藥量。當服藥期間病情發生變化，一定要立即就醫。請醫師依照病情的變化，重新調整藥物，以免耽誤病情。

二、 為什麼要建立這項指標？

罹患慢性病須長期使用藥物控制病情，須定期至醫院回診，若其病情穩定，為了拿藥而每個月回診領藥，不但耗時而且也不經濟。因此健保署鼓勵醫院對罹患慢性病須長期使用藥物控制病情之病人開立「慢性病連續處方箋」。

〈指標方向性：正向〉

三、 監測結果：112 年統計值 50.34%，較 111 年 50.69%下降。



指標5.門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率

一、 指標名稱主要意涵：


「門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率」，是指一般處方每張處方之用藥品項數之平均值，處方箋是醫師根據病人個案狀況，斟酌病情嚴重度和穩定度來開給藥品，病人不應該任意要求醫師多開藥。醫師每次門診會依據病人病情，開給適當劑量及日份的「藥物」，如果病人有多重慢性疾病(如：高血壓、高血脂及糖尿病等)，醫師開立藥品的項目，可能比單純的單一疾病多。

二、 為什麼要建立這項指標？

根據研究，多重用藥(polypharmacy)面臨藥品交互作用、重複用藥、治療禁忌、副作用明顯增加等問題，藥品項數越多的處方，基於兼顧民眾的用藥安全及品質，避免重複或過量使用，並關注醫療院所病人就診情形及醫療院所的診療形態，因而進行本項指標的監控及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.61%，較111年0.59%上升。



指標 6.十八歲以下氣喘病人急診率

一、 指標名稱主要意涵：


氣喘是一種慢性氣道炎症反應的疾病，發作時可能相當嚴重甚至會致命，是世界各國重要的大眾健康問題。目前全世界有一億多人罹患氣喘，其盛行率在兒童有逐漸增加之趨勢。基於這類患者氣喘急性發作常可能奪命，因此需要平時循序漸進的預防、保養及正確用藥，才能預防氣喘變成慢性肺病及急性發作。

二、 為什麼要建立這項指標？

氣喘是兒童常見及重要的慢性疾病之一，為了瞭解「18歲以下氣喘急診率」，因此建立這項指標，作為整體醫療品質持續觀察之項目。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值13.14%，較111年11.82%上升。



指標 7.糖尿病病人糖化血紅素(HbA1c)或糖化白蛋白(glycated albumin)執行率

一、 指標名稱主要意涵：


血液中的葡萄糖分子很容易進入紅血球後，附著在血紅素上，不易脫落，直到紅血球衰老、破壞為止。被附著上葡萄糖分子的血紅素，就稱為「糖化血紅素」。當血中葡萄糖濃度愈高時，糖化血紅素就愈高，而紅血球平均壽命120天，因此，測定血中糖化血紅素百分比，可以反映最近兩、三個月來血糖控制情形。一般人糖化血紅素約4~6%之間，糖尿病患最好將之控制在7%以下。本項檢查率高，表示醫療院所對病人病情給予檢測。

二、 為什麼要建立這項指標？

原則上糖尿病病患每半年應接受一次糖化血紅素(HbA1c)檢查，最少每年也要檢查一次，所以，醫院及診所對糖尿病病患每年執行「糖化血紅素(HbA1c)檢查」的人數比率，可推估該醫療院所對糖尿病病人提供照護品質的完整性。

〈指標方向性：正向〉

三、 監測結果：112年統計值93.59%，較111年93.24%上升。



指標8.就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率

一、 指標名稱主要意涵：


「就診後同日於同醫院因同疾病再次就診率」，是指同院、同天、同診斷門診就醫2次以上人數比率。

二、 為什麼要建立這項指標？

健保開辦以來，使得民眾就醫非常方便，門診重複就醫為外界長期關注之焦點，然而，同疾病同日再次就診，也可能是因為同天前次就診後，個案覺得病情並未獲得改善，或病情進展為更加嚴重，因此同疾病同日再次就診。為了減少非必要之就醫，有必要統計病患同日再次就診率，以長期觀測診療型態變化。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.59%，較111年0.61%下降。



指標9.非計畫性住院案件出院後十四日以內再住院率

一、 指標名稱主要意涵：


用來呈現民眾住院醫療妥善照護狀況，若完成治療後，同一系統疾病或病人因病於14日內再住院，也許因治療需要之再住院，也許病人照護可能需再加強，或病人出院後未能遵循醫囑做好自我健康照護，或是其他原因導致病情不穩定而就醫。

二、 為什麼要建立這項指標？

排除因治療需要之再住院個案，本項指標採用以14天為觀察範圍，瞭解出院案件再度住院的比例高低，藉由這個指標結果，督促醫院更深入瞭解其再住院之原因，藉以提升醫療照護品質。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值5.59%，較111年5.44% 上升。



指標10.住院案件出院後三日以內急診率

一、 指標名稱主要意涵：


用來呈現民眾住院醫療妥善照護狀況，若完成治療後3日內再到同院急診，則表示醫院對住院病人照護可能需再加強，或病人出院後未能遵循醫囑做好自我健康照護，或是其他原因導致病情不穩定而再度就醫。

二、 為什麼要建立這項指標？

本項指標採用3天為觀察範圍，瞭解住院案件出院後3日內同院所再急診的比例高低，藉由此指標結果，督促醫院更深入瞭解其原因，提升住院病人的醫療照護品質。

<指標之方向性：負向>

三、 監測結果：112年統計值2.60%，較111年2.41%上升。



指標11-1.剖腹產率-整體

一、 指標名稱主要意涵：


剖腹產，是手術切開母親的腹部及子宮，不經過產道，直接將胎兒從子宮取出的生產方式。一般而言，除非是自然產對產婦或胎兒的安全造成威脅，或是胎兒無法順利生出時(例如：胎兒窘迫、胎位不正、產程遲滯、前置胎盤、催生失敗、前胎剖腹產、子宮曾動過手術或是母親有重大疾病不適合陰道生產、胎兒先天不正常可治療者……)，才符合剖腹生產的適應症。若不符合適應症，產後的身體恢復也會比自然生產慢，併發症也比較多，因此，準媽媽應充分瞭解不同生產方式的差異性，並且提早與醫師充分溝通。

二、 為什麼要建立這項指標？

台灣剖腹產率一直居高不下的原因，包括傳統對生辰的重視、錯誤的生產觀念以及名人剖腹推波助瀾的效應影響。一般情況下，自然產是比較安全、風險較少的生產方式，而剖腹產則比較接近疾病治療，只在必要時實施。為瞭解剖腹產的情形，所以進行本項指標的監測及管理。

〈指標方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值35.06%，較111年34.5%上升。



指標11-2.剖腹產率-自行要求

一、 指標名稱主要意涵：


為對婦女生產提供醫療照護，全民健康保險除給付因醫療上需要之剖腹產外，亦給付自願剖腹產。「自行要求剖腹產率」代表剖腹產之原因，並無醫療上需要剖腹產之原因。

二、 為什麼要建立這項指標？

本指標為不具適應症之剖腹產案件，指標數值若持續上升，可能顯示產婦格外留意胎兒之狀況與自身之健康，或基於其他考量；「自行要求剖腹產率」應為可避免之剖腹產，因此建立這項指標，作為長期趨勢之觀察。

<指標之方向性：負向>

三、 監測結果：112年統計值0.90%，較111年0.97%下降。



指標11-3.剖腹產率-具適應症

一、 指標名稱主要意涵：


符合本保險「婦產科審查注意事項」剖腹產的適應症而進行剖腹產手術者。

二、 為什麼要建立這項指標？

本指標為具適應症之剖腹產案件，表示剖腹產是基於臨床上有必要為之的剖腹產；因此「具適應症之剖腹產率」為不可避免之剖腹產，因此建立這項指標，作為整體長期趨勢之觀察。

<指標之正負向：合理範圍>

三、 監測結果：112年統計值34.16%，較111年33.54%上升。



指標11-4.剖腹產率-初次具適應症

一、 指標名稱主要意涵：


根據本保險「婦產科審查注意事項」剖腹產的適應症，已於前項「具適應症之剖腹產率」說明。初次非自願剖腹產代表第1次剖腹產之原因係屬於醫療上需要之剖腹產。

二、 為什麼要建立這項指標？

本指標在統計第1次剖腹產之原因係屬於醫療上需要之剖腹產，表示剖腹產是基於臨床上有必要為之的；因此「具適應症之剖腹產率」為不可避免之剖腹產，因此建立這項指標，作為整體長期趨勢之觀察。

<指標之正負向：合理範圍>

三、 監測結果：112年統計值23.47%，較111年23.11%上升。



指標12.清淨手術術後使用抗生素超過三日比率

一、 指標名稱主要意涵：


「清淨的手術」即指手術範圍於且手術過程中較不容易受到感染的手術。此類手術使用抗生素是為了預防手術後的感染，原則上連續使用三天內已經足夠。

二、 為什麼要建立這項指標？

將臨床上常見的「清淨的手術」(包含：股及腹股溝疝氣手術(單側)、股及腹股溝疝氣手術(雙側)、全膝關節置換手術(單側)、全股關節置換手術(單側)、甲狀腺切除術、全股關節置換術(雙側))等清淨手術，其抗生素使用日數大於3日以上，做為醫院品質監控指標，可督促醫院審慎使用抗生素，減少日後抗生素之抗藥性。

<指標之方向性：負向>

三、 監測結果：112年統計值10.54%，較111年10.04%上升。



指標13.接受體外震波碎石術(ESWL)病人平均利用ESWL次數

一、 指標名稱主要意涵：

ESWL(Extracorporeal shock wave lithotripsy)係指「體外震波碎石術」，是利用橢圓形聚焦的原理，將震波源發射出的能量集中到尿路結石上，來達到碎石的目的，而減少傷害身體其他組織。體外震波碎石術後，被打碎的結石在往後數日至數週內，陸續隨著小便排出體外，因此應多喝開水以利結石排出。是否適合以ESWL方式來治療尿路結石問題，須由醫師作專業判斷。


二、 為什麼要建立這項指標？

因體外震波碎石術會因震波的傷害，造成腎功能損害或降低，大多數的病人僅需一次體外震波碎石術(ESWL)就可以完成治療，少數病人的結石因為硬度較高或結石體積較大，需要接受二次以上的震波碎石術。若接受ESWL的病人之接受ESWL平均次數過高時，可能代表醫院施行ESWL的品質需檢討改善，故進行本項指標的監測。

<指標之方向性：負向>

三、 監測結果：112年統計值1.44，較111年1.45下降。

接受體外震波碎石術（ESWL）病人平均利用ESWL之
次數



指標14.子宮肌瘤手術出院後十四日以內因該手術相關診斷再住院率

一、 指標名稱主要意涵：


病患接受子宮肌瘤摘除或子宮切除術後，同一病患在手術後14日內，又由醫師診斷患有骨盆腔內器官有發炎或損傷，例如：卵巢、輸卵管、骨盆蜂窩組織炎、生殖器脫出、泌尿或生殖道瘻管、子宮腔積血…等，因而再度住院者；其再住院率與手術品質或併發症有關，因而以為手術結果面的品質指標。

二、 為什麼要建立這項指標？

當婦女因子宮肌瘤就醫，接受子宮肌瘤摘除或子宮切除術後，本項指標可判斷醫院能否提供安全、有品質的服務，從而瞭解整體發生手術併發症或後遺症情形。

<指標之方向性：負向>

三、 監測結果：112年統計值0.23%，較111年0.24%下降。



指標15-1.人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率

一、 指標名稱主要意涵：


指手術部位的深部切口發生感染，範圍包括如肌膜、肌肉層等深部軟組織，深部切口處有膿樣分泌物，病患有發燒、局部疼痛或壓痛等症狀，且感染發生於手術後90天內。

二、 為什麼要建立這項指標？

本項指標可判斷醫院能否提供膝關節置換手術(含全人工膝關節及半人工膝關節置換手術)病患安全、有品質的服務，從而瞭解整體發生手術併發症或後遺症情形。

<指標之方向性：負向>

三、 監測結果：112年統計值0.31%，較111年0.35%下降。



指標15-2.全人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率

一、 指標名稱主要意涵：

指手術部位的深部切口發生感染，範圍包括如肌膜、肌肉層等深部軟組織，深部切口處有膿樣分泌物，病患有發燒、局部疼痛或壓痛等症狀，且感染發生於手術後90天內。


二、 為什麼要建立這項指標？

本項指標可判斷醫院能否提供全人工膝關節置換手術病患安全、有品質的服務，從而瞭解整體發生手術併發症或後遺症情形。

〈指標之方向性：參考指標〉

三、 監測結果：112年統計值0.30%，較111年0.32%下降。

全人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率



指標15-3.半人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率

一、 指標名稱主要意涵：

指手術部位的深部切口發生感染，範圍包括如肌膜、肌肉層等深部軟組織，深部切口處有膿樣分泌物，病患有發燒、局部疼痛或壓痛等症狀，且感染發生於手術後90天內。


二、 為什麼要建立這項指標？

本項指標可判斷醫院能否提供半人工膝關節置換手術病患安全、有品質的服務，從而瞭解整體發生手術併發症或後遺症情形。

〈指標之方向性：參考指標〉

三、 監測結果：112年全年統計值0.34%，較111年0.69%下降。

半人工膝關節置換手術後九十日以內置換物深部感染率



指標16.住院手術傷口感染率

一、 指標名稱主要意涵：


指住院手術病人其術後發生體內裝置物、植入及移植物所致之感染、發炎反應及併發於醫療處置中之出血、血腫或血清腫、傷口破裂與手術後感染等症狀，且感染發生於手術病人同院、同住院日內。

二、 為什麼要建立這項指標？

本項指標可判斷醫院能否提供手術病患安全、有品質的服務，從而瞭解整體發生手術後感染或醫療處置品質情形。

〈指標之方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值1.23%，較111年1.29%下降。



指標17.急性心肌梗塞死亡率

一、 指標名稱主要意涵：


急性心肌梗塞(AMI) 病人指主診斷為急性心肌梗塞之病患，本指標觀察18歲以上個案發生猝死與併發症死亡之比率。

二、 為什麼要建立這項指標？

隨著時代的進步，近幾年來心臟疾病已躍居台灣十大死因前二名，而突發性急性心肌梗塞(AMI)是造成許多人猝死或嚴重心臟功能受損的主要原因，且AMI者有與日俱增的趨勢。有關心肌梗塞的診斷流程與治療策略，在醫學研究與實證醫學上已有跳躍式的進步與明顯的規範，最終目的即是要減少猝死病人與併發症的產生，改善心血管疾病病人的照護品質、降低死亡率與併發症。本項指標可瞭解整體心血管疾病病人的照護品質情形。

<指標之方向性：負向>

三、 監測結果：112年統計值8.41%，較111年9.18%下降。



指標18.失智者使用安寧緩和服務使用率

一、 指標名稱主要意涵：


失智者伴隨相關生理、神經功能退化，視病程之變化，需使用醫療照護之住院、共照及居家安寧緩和服務，本指標觀察失智者使用安寧緩和服務照護之使用率。

二、 為什麼要建立這項指標？

隨著人口的老化，近幾年來，失智者有與日俱增的趨勢。於衛福部「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」之健全失智症診斷、治療、照護之強化失智症照護服務體系方案工作項目中，將失智症病人接受安寧緩和服務的人數納入衡量項目。本項指標可觀察瞭解失智者使用安寧緩和服務照護之使用率。

<指標之方向性：非絕對正向或負向>

三、 監測結果：112年統計值4.44%，較111年3.81%上升。



指標19.清淨手術術後傷口感染率

一、 指標名稱主要意涵：

「清淨的手術」即指手術範圍於且手術過程中較不容易受到感染的手術。本指標觀察此類手術術後的感染症狀，且感染發生於手術病人同院、同住院日內。

二、 為什麼要建立這項指標？

將臨床上常見的「清淨的手術」〔包含：股及腹股溝疝氣手術(單側)、股及腹股溝疝氣手術(雙側)、全膝關節置換手術(單側)、全股關節置換手術(單側)、甲狀腺切除術、全股關節置換術(雙側)]等清淨手術，其手術術後的感染症狀，做為醫院品質監控指標，可督促醫院管控手術流程，減少術後的感染。

〈指標之方向性：負向〉

三、 監測結果：112年統計值0.14%，較111年0.12%上升。

