

全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式

(醫院總額部門-現行實施)

➤ 014-高血壓併氣喘病患不適當用藥 (NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS 之藥品) 處方率過高

[最新公告實施起日 114年1月1日(費用年月)；最初實施起日94年12月1日(費用年月)]

● 014指標版本：實施起日 114年1月1日(費用年月)--現行實施

指標名稱	014-高血壓併氣喘病患不適當用藥 (non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品) 處方率過高
實施目的	降低不當之用藥型態
指標定義	分子—高血壓併氣喘病患使用 non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品人次 分母—高血壓併氣喘病患人次 高血壓：任一診斷 ICD-9-CM 為401-405 ICD-10-CM/PCS(2014年版)為 I10-I15、 <u>ICD-10-CM/PCS(2023年版)為 I10-I15、I16.0、I16.1、I16.9(自114年1月1日起適用)</u> 氣喘：任一診斷 ICD-9-CM 為493 ICD-10-CM/PCS 為 J44-J45
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	醫院總額部門
處理方式	超過25%之部分，不予支付。 不予支付點數=(高血壓併氣喘病患使用 non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品比率-25%)×高血壓併氣喘病患使用 non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品案件總申請金額。 備註:本指標藥品檢核代碼 ATC 前五碼指「C07AA」、「C07AG」、「C07BA」、「C07BG」、「C07CA」、「C07CG」、「C07DA」、「C07EA」、「C07FA」等共9項。
衛生福利部核准日期及文號	<u>113年10月29日衛部保字第1131260624號函</u>
健保署公告日期及文號	<u>113年12月4日健保審字第1130123927號</u>
實施起日	<u>114年1月1日(費用年月)</u>

「014-高血壓併氣喘病患不適當用藥 (non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品) 處方率過高」附表

總額別	指標代碼及名稱	ICD-9-CM	ICD-10-CM/PCS (2014年版) <u>自105年1月1日起適用</u>	ICD-10-CM/PCS (2023年版) <u>自114年1月1日起適用</u>	備註
醫院	014-高血壓併氣喘病患不適當用藥 (non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品) 處方率過高	493	J44-J45	<u>J44-J45</u>	
		401-405	I10-I15	<u>I10-I15、I16.0、I16.1、I16.9</u>	

全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式

(醫院總額部門-現行實施)

➤ 016-西醫醫院 COX II inhibitor 處方不當比率過高

[最新公告實施起日 114年1月1日(費用年月)；最初實施起日95年10月1日(費用年月)]

● 016指標版本：實施起日 114年1月1日(費用年月)--現行實施

指標名稱	016-西醫醫院 COX II inhibitor 處方不當比率過高
實施目的	降低不當之用藥型態
指標定義	分子—門診 COX II inhibitor 用藥主次診斷不符藥品給付規定件數 藥品給付規定：<u>符合藥品給付規定1.1.5所列診斷。</u> (1)年齡大於等於60歲之骨關節炎病變(CELECOXIB 可用於年齡大於等於50歲之骨關節炎病變)。 (2)類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎、退化性關節炎。 (3)合併有急性嚴重創傷、中風、心血管疾病者。 (4)曾有消化性潰瘍、上消化道出血或胃穿孔病史者。 (5)肝硬化患者。 註：上述疾病之診斷碼詳如附表。 分母—門診 COX II inhibitor 用藥（含 NABUMETONE(成分代碼2808001900)、MELOXICAM(成分代碼9200038100)、ETODOLAC(成分代碼2808404700)、CELECOXIB(成分代碼2808405200)、NIMESULIDE(成分代碼2808405100)五成分）件數。 排除條件：分母門診 COX II inhibitor 用藥申報件數小於等於10件之院所。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	醫院總額部門
處理方式	不符給付規定比率超過同儕90百分位值者，超過部分申請金額不予支付。 不予支付點數=[(COX II inhibitor 用藥不符給付規定比率—同儕90百分位者) / COX II inhibitor 用藥不符給付規定比率]×不符給付規定使用 COX2inhibitor 用藥案件藥費總申請金額 同儕90百分位值：40%。
衛生福利部核准日期及文號	<u>113年10月29日衛部保字第1131260624號函</u>
健保署公告日期及文號	<u>113年12月4日健保審字第1130123927號</u>
實施起日	<u>114年1月1日(費用年月)</u>

「016-西醫醫院 COX II inhibitor 處方不當比率過高」附表

疾病	ICD-10- CM/PCS (2014年版) <u>自105年1月1日</u> 起適用	ICD-10-CM/PCS (2023年版) <u>自114年1月1日</u> 起適用	備註	ICD-9- CM (104.12.31 以前適用)
骨關節炎	M00-M08	<u>M00-M08</u>		<u>711-725</u>
病變	M11-M19	<u>M11-M19</u>		<u>711-725</u>

	M22-M25	<u>M22-M25</u>		711-725
	M32-M36	<u>M32-M36</u>		711-725
	M43	<u>M43</u>		711-725
	M45-M54	<u>M45-M54</u>		711-725
	M62830	<u>M62830</u>		711-725
	M6788	<u>M6788</u>		711-725
	M796	<u>M796</u>		711-725
	M961	<u>M961</u>		711-725
	M992-M997	<u>M992-M997</u>		711-725
	R262	<u>R262</u>		711-725
	R294	<u>R294</u>		711-725
	R29898	<u>R29898</u>		711-725
類風溼性關節炎	M05-M06	<u>M05-M06</u>		714
	M08	<u>M08</u>	排除 M081	714
	M120	<u>M120</u>		714
僵直性脊椎炎	M081	<u>M081</u>		720
	M45	<u>M45</u>		720
乾癱性關節炎	L305	<u>L305</u>		696
	L40-L42	<u>L40-L42</u>		696
	L44-L45	<u>L44-L45</u>		696
	L945	<u>L945</u>		696
退化性關節炎	M121-M129	<u>M121-M129</u>	排除 M122-M124	716
	M13	<u>M13</u>		716
合併有急性嚴重創傷	S02	<u>S02</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"	800-840
	S12	<u>S12</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"	800-840
	S22	<u>S22</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"	800-840
	S32	<u>S32</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"	800-840
	S42	<u>S42</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S43-S44	<u>S43-S44</u>	第7位碼為"A"、"D"	800-840
	S46	<u>S46</u>	第7位碼為"A"、"D"	800-840
	S49	<u>S49</u>	第7位碼為"A"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S52	<u>S52</u>	第7位碼為"A"、"B"、"C"、"D"、"E"、"F"、"G"、"H"、"J"、"K"、"M"、"N"、"P"、"Q"、"R"	800-840
	S59	<u>S59</u>	第7位碼為"A"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S62	<u>S62</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S72	<u>S72</u>	第7位碼為"A"、"B"、"C"、"D"、"E"、"F"、"G"、"H"、"J"、"K"、"M"、"N"、"P"、"Q"、"R"	800-840
	S79	<u>S79</u>	第7位碼為"A"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S82	<u>S82</u>	第7位碼為"A"、"B"、"C"、"D"、"E"、"F"、"G"、"H"、"J"、"K"、"M"、"N"、"P"、"Q"、"R"	800-840
	S89	<u>S89</u>	第7位碼為"A"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S92	<u>S92</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S06	<u>S06</u>	第7位碼為"A"、"D"	850-854
	S21	<u>S21</u>	第7位碼為"A"、"D"	860-869
	S26-S27	<u>S26-S27</u>	第7位碼為"A"、"D"	860-869
	S31	<u>S31</u>	第7位碼為"A"、"D"	860-869
	S36-S37	<u>S36-S37</u>	第7位碼為"A"、"D"	860-869
	S51	<u>S51</u>	第7位碼為"A"、"D"	881
	S569	<u>S569</u>	第7位碼為"A"、"D"	881

	S615	<u>S615</u>	第7位碼為"A"、"D"	881
	S669	<u>S669</u>	第7位碼為"A"、"D"	881
	S48	<u>S48</u>	第7位碼為"A"、"D"	885 886 → 887
	S58	<u>S58</u>	第7位碼為"A"、"D"	885 886 → 887
	S68	<u>S68</u>	第7位碼為"A"、"D"	885 886 → 887
	S71	<u>S71</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S769	<u>S769</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S78	<u>S78</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S81	<u>S81</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S869	<u>S869</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S88	<u>S88</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S91	<u>S91</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S969	<u>S969</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S98	<u>S98</u>	第7位碼為"A"、"D"	890 - 897
	S090	<u>S090</u>	第7位碼為"A"、"D"	900
	S15	<u>S15</u>	第7位碼為"A"、"D"	900
	S07	<u>S07</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S17	<u>S17</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S280	<u>S280</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S380-S381	<u>S380-S381</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S47	<u>S47</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S57	<u>S57</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S67	<u>S67</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S77	<u>S77</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S87	<u>S87</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	S97	<u>S97</u>	第7位碼為"A"、"D"	925 - 929
	T20-T32	<u>T20-T32</u>	第7位碼為"A"、"D"	940 - 949
		<u>S99.0- S99.2</u>	<u>第7位碼皆須為"A"、"B"</u>	
		<u>P91.821-P91.829</u>		
中風	I60-I69、G450-G468	<u>I60-I69、 G450-G468</u>		430 - 438
心血管疾 病	G45	<u>G45</u>		401 - 444
		<u>G90.A</u>	(2023轉版增)	
	I10-I74	<u>I10-I74</u>		401 - 444
	I777	<u>I777</u>		401 - 444
	I798	<u>I798</u>		401 - 444
	I970-I971	<u>I970-I971</u>		401 - 444
	R001	<u>R001</u>		401 - 444
	T800	<u>T800</u>		401 - 444
	T817	<u>T817</u>		401 - 444
	T828	<u>T828</u>		401 - 444
消化性潰 瘍、上消 化道出血 或胃穿孔	K20-K28	<u>K20-K28</u>		530 - 534
肝硬化	K7030-K7031	<u>K7030-K7031</u>		571 2
	K7460-K7469	<u>K7460-K7469</u>		571 5
	K743-K745	<u>K743-K745</u>		571 6

全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式

(醫院總額部門-現行實施)

➤ 027-醫院門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高

[最新公告實施起日 114年1月1日(費用年月)；最初實施起日96年2月1日(費用年月)]

● 027指標版本：實施起日 114年1月1日(費用年月)--現行指標

指標名稱	027-醫院門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高
實施目的	孕婦用藥安全
指標定義 (含分子、分母)	分子：分母懷孕婦女中，使用 ACEI 或 ARB 之人數 分母：門診高血壓且有高血壓用藥懷孕婦女人數 高血壓—ICD-9-CM 任一主次診斷前三碼為401~405； <u>ICD-10-CM/PCS(2014年版)為 I10-I15、</u> <u>ICD-10-CM/PCS(2023年版)為 I10-I15、I16.0、</u> <u>I16.1、I16.9(自114年1月1日起適用)，</u> 且有高血壓用藥紀錄之案件 高血壓用藥一指 ATC 代碼前三碼為 C02、C03、C07、C08、C09及 terazosin (G04CA(五碼)) 之品項 懷孕婦女：ICD-9-CM 主、次診斷碼前三碼為 V22、640~648；ICD-10- CM/PCS 為 Z331、Z34、O10-O16、O20-O21、O23-O26、O28-O29、O310、O330、O44-O48、O60、O67、O861-O862、O905-O908、O98-O99、O9A 或申報產檢醫令(41~67)之個案 ACEI、ARB—ATC 前四碼為 C09A、C09B、C09C、C09D、C09X 註：高血壓懷孕婦女不建議使用 ACEI 或 ARB 之藥品，以維護胎兒安全。 排除條件：分母門診高血壓且有高血壓用藥懷孕婦女人數小於等於5人之院所。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	醫院總額部門
處理方式	不予支付點數＝（院所比率-33%）*高血壓之懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 案件總醫療費用
衛生福利部核准日期及文號	<u>113年10月29日衛部保字第1131260624號函</u>
健保署公告日期及文號	<u>113年12月4日健保審字第1130123927號</u>
實施起日	<u>114年1月1日(費用年月)</u>

「027-醫院門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高」附表

總額	名稱	ICD-9-CM	ICD-10- CM/PCS (2014年版) <u>自105年1月1日起適用</u>	<u>ICD-10-CM/PCS</u> (2023年版) <u>自114年1月1日起適用</u>	備註
醫院	027-醫院門診 門診高血壓懷 孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高	401~405	I10-I15	<u>I10-I15、I16.0、I16.1、 I16.9</u>	
		640~648	O10-O16	<u>O10-O16</u>	
		640~648	O20-O21	<u>O20-O21</u>	
		640~648	O23-O26	<u>O23-O26</u>	
		640~648	O28-O29	<u>O28-O29</u>	
		640~648	O310	<u>O310</u>	
		640~648	O330	<u>O330</u>	
		640~648	O44-O48	<u>O44-O48</u>	
		640~648	O60	<u>O60</u>	
		640~648	O67	<u>O67</u>	
		640~648	O861-O862	<u>O861-O862</u>	
		640~648	O905-O908	<u>O905-O908</u>	
		640~648	O98-O99	<u>O98-O99</u>	
		640~648	O9A	<u>O9A</u>	
		V22	Z331	<u>Z331</u>	
		V22	Z34	<u>Z34</u>	

全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式

(西醫基層總額部門-現行實施)

➤ 001-眼科門診局部處置申報率

[最新公告實施起日 114年1月1日(費用年月)；最初實施起日94年7月1日(費用年月)]

● 001指標版本：實施起日 114年1月1日(費用年月)--現行實施

指標名稱	001-眼科門診局部處置申報率
實施目的	降低不當之醫療處置
指標定義	分子—眼科門診申報細隙燈顯微鏡檢查（醫令代碼為23401C）件數 分母—眼科門診申報件數 <u>排除條件：本保險對象免自行負擔費用辦法第8條所列山地離島地區且眼科門診申報件數小於等於100件之院所。</u>
指標屬性	負向
分析單位	依科別（眼科）按月分析
分析範圍	西醫基層總額部門
處理方式	申報率超過30%者，超過部分不予支付。 不予支付點數=[分子件數-(分母件數*30%)]／分子件數*細隙燈顯微鏡檢查(醫令代碼為23401C)總申報點數。
衛生福利部核准日期及文號	<u>113年11月13日衛部保字第1131260633號函</u>
健保署公告日期及文號	<u>113年12月4日健保審字第1130123927號</u>
實施起日	<u>114年1月1日(費用年月)</u>

全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式

(西醫基層總額部門-現行實施)

- 014-高血壓併氣喘病患不適當用藥 (NON-SELECTIVE BETA BLOCKING AGENTS、ALPHA AND BETA BLOCKING AGENTS 之藥品) 處方率過高
[最新公告實施起日 114年1月1日(費用年月)；最初實施起日94年12月1日(費用年月)]

- 014指標版本：實施起日 114年1月1日(費用年月) --現行實施

指標名稱	014-高血壓併氣喘病患不適當用藥 (non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品) 處方率過高
實施目的	降低不當之用藥型態
指標定義	分子—高血壓併氣喘病患使用 non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品人次 分母—高血壓併氣喘病患人次 高血壓：任一診斷 ICD-9-CM 為401-405； <u>ICD-10-CM/PCS(2014年版) 為 I10-I15、</u> <u>ICD-10-CM/PCS(2023年版) 為 I10-I15、I16.0、</u> <u>I16.1、I16.9(自114年1月1日起適用)</u> 氣喘：任一診斷 ICD-9-CM 為493 <u>ICD-10-CM/PCS 為 J44-J45</u>
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	西醫基層總額部門
處理方式	超過15%部分，申請金額不予支付。 不予支付點數＝【分子件數－(分母件數*15%)】／分子件數*高血壓併氣喘使用 (non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents) 之藥品案件總申請金額。 備註:本指標藥品檢核代碼 ATC 前五碼指「C07AA」、「C07AG」、「C07BA」、「C07BG」、「C07CA」、「C07CG」、「C07DA」、「C07EA」、「C07FA」等共9項。
衛生福利部核准日期及文號	<u>113年10月29日衛部保字第1131260624號函</u>
健保署公告日期及文號	<u>113年12月4日健保審字第1130123927號</u>
實施起日	<u>114年1月1日(費用年月)</u>

「014-高血壓併氣喘病患不適當用藥 (non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品) 處方率過高」附表

總額別	指標代碼及名稱	ICD-9-CM	ICD-10- CM/PCS (2014年版) <u>自105年1月1日起適用</u>	<u>ICD-10-CM/PCS</u> (2023年版) <u>自114年1月1日起適用</u>	備註
西醫 基層	014-高血壓併氣喘病患不適當用藥 (non-selective beta blocking agents、alpha and beta blocking agents 之藥品) 處方率過高	493	J44-J45	<u>J44-J45</u>	
		401-405	I10-I15	<u>I10-I15、I16.0、I16.1、I16.9</u>	

全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式

(西醫基層總額部門-現行實施)

- 016-西醫診所 COX II INHIBITOR 處方不當比率過高
[最新公告實施起日 114年1月1日 (費用年月)；最初實施起日 95年10月1日 (費用年月)]

- 016指標版本：實施起日 114年1月1日 (費用年月) --現行實施

指標名稱	016-西醫診所 COX II inhibitor 處方不當比率過高
實施目的	降低不當之用藥型態
指標定義	分子—門診 COX II inhibitor 用藥主次診斷不符藥品給付規定件數 藥品給付規定：<u>符合藥品給付規定1.1.5所列診斷。</u> (1)年齡大於等於60歲之骨關節炎病變(CELECOXIB可用於年齡大於等於50歲之骨關節炎病變)。 (2)類風濕性關節炎僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎、退化性關節炎。 (3)合併有急性嚴重創傷、中風、心血管疾病者。 (4)曾有消化性潰瘍、上消化道出血或胃穿孔病史者。 (5)肝硬化患者。 註：<u>上述疾病之診斷碼詳如附表。</u> 分母—門診 COX II inhibitor 用藥（含 NABUMETONE(成分代碼2808001900)、MELOXICAM(成分代碼9200038100)、ETODOLAC(成分代碼2808404700)、CELECOXIB(成分代碼2808405200)、NIMESULIDE(成分代碼2808405100)五成分）件數。 排除條件： 1.分母門診 COX II inhibitor 用藥申報件數小於等於10件之院所。 2.簡表（01）案件。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	西醫基層總額部門
處理方式	處方不當比率超過閾值，超過部分之藥費總申請金額不予支付。 不予支付點數=[（COX II inhibitor 用藥不符給付規定比率－閾值） / COX II inhibitor 用藥不符給付規定比率]×不符給付規定使用 COX2inhibitor 用藥案件藥費總申請金額 閾值：33%。
衛生福利部核准日期及文號	<u>113年10月29日衛部保字第1131260624號函</u>
健保署公告日期及文號	<u>113年12月4日健保審字第1130123927號</u>
實施起日	<u>114年1月1日(費用年月)</u>

「016-西醫診所 COX II inhibitor 處方不當比率過高」附表

疾病	ICD-10-CM/PCS (2014年版) <u>自105年1月1日</u> 起適用	ICD-10-CM/PCS (2023年版) <u>自114年1月1日</u> 起適用	備註	ICD-9-CM (104.12.31 以前適用)
骨關節炎病變	M00-M08	<u>M00-M08</u>		<u>711-725</u>
	M11-M19	<u>M11-M19</u>		<u>711-725</u>
	M22-M25	<u>M22-M25</u>		<u>711-725</u>

	M32-M36	<u>M32-M36</u>		711-725
	M43	<u>M43</u>		711-725
	M45-M54	<u>M45-M54</u>		711-725
	M62830	<u>M62830</u>		711-725
	M6788	<u>M6788</u>		711-725
	M796	<u>M796</u>		711-725
	M961	<u>M961</u>		711-725
	M992-M997	<u>M992-M997</u>		711-725
	R262	<u>R262</u>		711-725
	R294	<u>R294</u>		711-725
	R29898	<u>R29898</u>		711-725
類風溼性關節炎	M05-M06	<u>M05-M06</u>		714
	M08	<u>M08</u>	排除 M081	714
	M120	<u>M120</u>		714
僵直性脊椎炎	M081	<u>M081</u>		720
	M45	<u>M45</u>		720
乾癬性關節炎	L305	<u>L305</u>		696
	L40-L42	<u>L40-L42</u>		696
	L44-L45	<u>L44-L45</u>		696
	L945	<u>L945</u>		696
退化性關節炎	M121-M129	<u>M121-M129</u>	排除 M122-M124	716
	M13	<u>M13</u>		716
合併有急性嚴重創傷	S02	<u>S02</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"	800-840
	S12	<u>S12</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"	800-840
	S22	<u>S22</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"	800-840
	S32	<u>S32</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"	800-840
	S42	<u>S42</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S43-S44	<u>S43-S44</u>	第7位碼為"A"、"D"	800-840
	S46	<u>S46</u>	第7位碼為"A"、"D"	800-840
	S49	<u>S49</u>	第7位碼為"A"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S52	<u>S52</u>	第7位碼為"A"、"B"、"C"、"D"、"E"、"F"、"G"、"H"、"J"、"K"、"M"、"N"、"P"、"Q"、"R"	800-840
	S59	<u>S59</u>	第7位碼為"A"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S62	<u>S62</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S72	<u>S72</u>	第7位碼為"A"、"B"、"C"、"D"、"E"、"F"、"G"、"H"、"J"、"K"、"M"、"N"、"P"、"Q"、"R"	800-840
	S79	<u>S79</u>	第7位碼為"A"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S82	<u>S82</u>	第7位碼為"A"、"B"、"C"、"D"、"E"、"F"、"G"、"H"、"J"、"K"、"M"、"N"、"P"、"Q"、"R"	800-840
	S89	<u>S89</u>	第7位碼為"A"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S92	<u>S92</u>	第7位碼為"A"、"B"、"D"、"G"、"K"、"P"	800-840
	S06	<u>S06</u>	第7位碼為"A"、"D"	850-854
	S21	<u>S21</u>	第7位碼為"A"、"D"	860-869
	S26-S27	<u>S26-S27</u>	第7位碼為"A"、"D"	860-869
	S31	<u>S31</u>	第7位碼為"A"、"D"	860-869
	S36-S37	<u>S36-S37</u>	第7位碼為"A"、"D"	860-869
	S51	<u>S51</u>	第7位碼為"A"、"D"	881

	S569	<u>S569</u>	第7位碼為"A"、"D"	881
	S615	<u>S615</u>	第7位碼為"A"、"D"	881
	S669	<u>S669</u>	第7位碼為"A"、"D"	881
	S48	<u>S48</u>	第7位碼為"A"、"D"	885 886-887
	S58	<u>S58</u>	第7位碼為"A"、"D"	885 886-887
	S68	<u>S68</u>	第7位碼為"A"、"D"	885 886-887
	S71	<u>S71</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S769	<u>S769</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S78	<u>S78</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S81	<u>S81</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S869	<u>S869</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S88	<u>S88</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S91	<u>S91</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S969	<u>S969</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S98	<u>S98</u>	第7位碼為"A"、"D"	890-897
	S090	<u>S090</u>	第7位碼為"A"、"D"	900
	S15	<u>S15</u>	第7位碼為"A"、"D"	900
	S07	<u>S07</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S17	<u>S17</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S280	<u>S280</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S380-S381	<u>S380-S381</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S47	<u>S47</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S57	<u>S57</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S67	<u>S67</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S77	<u>S77</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S87	<u>S87</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	S97	<u>S97</u>	第7位碼為"A"、"D"	925-929
	T20-T32	<u>T20-T32</u>	第7位碼為"A"、"D"	940-949
		<u>S99.0- S99.2</u>	<u>第7位碼皆須為"A"、"B"</u>	
		<u>P91.821- P91.823</u>		
中風	I60-I69、G450- G468	<u>I60-I69、 G450-G468</u>		430-438
心血管疾病	G45	<u>G45</u>		401-444
		<u>G90.A</u>	(2023轉版增)	
	I10-I74	<u>I10-I74</u>		401-444
	I777	<u>I777</u>		401-444
	I798	<u>I798</u>		401-444
	I970-I971	<u>I970-I971</u>		401-444
	R001	<u>R001</u>		401-444
	T800	<u>T800</u>		401-444
	T817	<u>T817</u>		401-444
	T828	<u>T828</u>		401-444
消化性潰 瘍、上消化 道出血或胃 穿孔	K20-K28	<u>K20-K28</u>		530-534
肝硬化	K7030-K7031	<u>K7030-K7031</u>		5712
	K7460-K7469	<u>K7460-K7469</u>		5715
	K743-K745	<u>K743-K745</u>		5716

全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式

(西醫基層總額部門-現行實施)

➤ 027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高
[最新公告實施起日 114年1月1日(費用年月)；最初實施起日96年2月1日(費用年月)]

● 027指標版本：實施起日 114年1月1日(費用年月) --現行實施

指標名稱	027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高
實施目的	孕婦用藥安全
指標定義	分子：分母懷孕婦女中，使用 ACEI 或 ARB 之人數 分母：門診高血壓且有高血壓用藥懷孕婦女人數 高血壓—ICD-9-CM任一主次診斷前三碼為401-405； ICD-10-CM/PCS(2014年版)為 I10-I15、 <u>ICD-10-CM/PCS(2023年版)為 I10-I15、I16.0、I16.1、I16.9(自114年1月1日起適用)</u>， 且有高血壓用藥紀錄之案件 高血壓用藥—指 ATC 代碼前三碼為 C02、C03、C07、C08、C09 及 terazosin (G04CA(五碼)) 之品項 懷孕婦女：ICD-9-CM主、次診斷碼前三碼為V22、640-648； ICD-10- CM/PCS 為 Z331、Z34、O10-O16、O20-O21、O23-O26、O28-O29、O310、O330、O44-O48、O60、O67、O861-O862、O905-O908、O98-O99、O9A 或申報產檢醫令(41~67)之個案 ACEI、ARB—ATC 前四碼為 C09A、C09B、C09C、C09D、C09X 註：高血壓懷孕婦女不建議使用 ACEI 或 ARB 之藥品，以維護胎兒安全。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	西醫基層總額部門
處理方式	不予支付點數＝【分子人數－(分母人數＊17%)】／分子人數＊高血壓之懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 案件總醫療費用
衛生福利部核准日期及文號	<u>113年10月29日衛部保字第1131260624號函</u>
健保署公告日期及文號	<u>113年12月4日健保審字第1130123927號</u>
實施起日	<u>114年1月1日(費用年月)</u>

「027-西醫基層門診高血壓懷孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高」附表

總額	名稱	ICD-9-CM	ICD-10- CM/PCS (2014年版) <u>自105年1月1日起適用</u>	<u>ICD-10-CM/PCS</u> (2023年版) <u>自114年1月1日起適用</u>	備註
西醫 基層	027-西醫基層 門診高血壓懷 孕婦女使用 ACEI 或 ARB 之比率偏高	401~405	I10-I15	<u>I10-I15、I16.0、I16.1、 I16.9</u>	
		640~648	O10-O16	<u>O10-O16</u>	
		640~648	O20-O21	<u>O20-O21</u>	
		640~648	O23-O26	<u>O23-O26</u>	
		640~648	O28-O29	<u>O28-O29</u>	
		640~648	O310	<u>O310</u>	
		640~648	O330	<u>O330</u>	
		640~648	O44-O48	<u>O44-O48</u>	
		640~648	O60	<u>O60</u>	
		640~648	O67	<u>O67</u>	
		640~648	O861-O862	<u>O861-O862</u>	
		640~648	O905-O908	<u>O905-O908</u>	
		640~648	O98-O99	<u>O98-O99</u>	
		640~648	O9A	<u>O9A</u>	
		V22	Z331	<u>Z331</u>	
		V22	Z34	<u>Z34</u>	