

「全民健康保險藥品給付規定」(草案)

附表一

第7章 腸胃藥物 Gastrointestinal drugs

(自○○年○○月1日生效)

修訂後給付規定(草案)	原給付規定
7.2.1. Serotonin antagonists (如 ondansetron、granisetron、tropisetron、ramosetron、palonosetron 等) (93/2/1、93/9/1、98/9/1、99/5/1、<u>○○○○/○○/1</u>) 1. (略) 2. (略) 3. (略) <u>備註：</u>(刪除)	7.2.1. Serotonin antagonists (如 ondansetron、granisetron、tropisetron、ramosetron、palonosetron 等) (93/2/1、93/9/1、98/9/1、99/5/1) 1. (略) 2. (略) 3. (略) <u>備註：</u> <u>高致吐性藥品：</u> <u>cisplatin (>50mg/m²/day)，</u> <u>carmustine(≥250mg/m² /day)，</u> <u>cyclophosphamide</u> <u>(>1500mg/m²/day)，methotrexate</u> <u>(≥1.2gm/m²/day)。</u> <u>中致吐性藥品：</u> <u>cisplatin (≥30mg/m²/day, ≤</u> <u>50mg/m²/day)，carmustine</u> <u>(<250mg/m²/day)，</u> <u>Cyclophosphamide (≤1500mg/m²</u> <u>/day)，doxorubicin (≥</u> <u>45mg/m²/day)，epirubicin (≥</u> <u>70mg/m²/day)，CPT-11，idarubicin</u> <u>(≥10mg/m²/day)，daunorubicin</u>

7.2.2. Neurokinin-1 receptor antagonist (如 aprepitant) (94/10/1、101/02/1、<u>○○/○○/1</u>) 1. 與其他止吐藥劑併用，以防止由高致吐性癌症化療藥物在初次或重覆使用時所引起的急性或延遲性噁心與嘔吐。 2. 限用三天，<u>每日限用一顆</u>，除第一天外，不得併用 5-HT₃ 之藥物。 3. (刪除) 備註： 1. 高致吐性藥物： cisplatin (>50mg/m²/day)、 carmustine (≥250mg/m²/day)、 cyclophosphamide (>1500mg/m²/day)、 methotrexate (≥ 1.2gm/m²/day)、中致吐劑量之	(≥60mg/m²/day)，<u>dactinomycin (actinomycin-D)</u>，<u>arsenic trioxide</u>，<u>melphalan (≥50mg/m²/day)</u>，<u>cytarabine</u>，<u>carboplatin</u>，<u>oxaliplatin</u>，<u>ifosfamide</u>，<u>mitoxantrone</u>，<u>dacarbazine</u> 且其使用劑量為一般公認治療劑量或上述規定劑量時。 7.2.2. Neurokinin-1 receptor antagonist (如 aprepitant) (94/10/1、101/02/1) 1. 與其他止吐藥劑併用，以防止由高致吐性癌症化療藥物在初次或重覆使用時所引起的急性或延遲性噁心與嘔吐。 2. 限用三天，除第一天外，不得併用 5-HT₃ 之藥物。 3. <u>aprepitant 使用劑量如下：</u> <u>高致吐性藥品化療前 125mg，第二、三天 80mg。</u> 備註： 高致吐性藥物： cisplatin (>50mg/m²/day)， carmustine (≥250mg/m²/day)， cyclophosphamide (>1500mg/m²/day)， methotrexate (≥1.2gm/m²/day)，中致吐劑量之 anthracycline 藥物合併另一中致
---	---

anthracycline 藥物合併另一中致吐性藥物。(101/02/1) 2. <u>中致吐性藥品：</u> <u>cisplatin ($\geq 30\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$, $\leq 50\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$)、carmustine ($< 250\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$)、cyclophosphamide ($\leq 1500\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$)、doxorubicin ($\geq 45\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$)、epirubicin ($\geq 70\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$)、irinotecan、idarubicin ($\geq 10\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$)、daunorubicin ($\geq 60\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$)、dactinomycin (actinomycin-D)、arsenic trioxide、melphalan ($\geq 50\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$)、cytarabine、carboplatin、oxaliplatin、ifosfamide、mitoxantrone、dacarbazine 且其使用劑量為一般公認治療劑量或上述規定劑量時。</u>	吐性藥物<u>使用者</u>。(101/02/1)
---	----------------------------------

※劃線部分為新修訂處