

「藥品給付規定」修訂對照表

第4節 血液治療藥物 Hematological drugs

(自112年3月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
4.2.3. 第八、第九凝血因子製劑 (103/4/1、106/9/1、106/12/1、 107/11/1、108/10/1、109/3/1、 109/9/1、109/12/1、110/3/1、 111/1/1、111/3/1、<u>112/3/1</u>): 1. (略) 2. 用於 A 型或 B 型無抗體存在之血友 病人：(111/1/1) (1) (略) (2) 預防性治療(primary prophylaxis)：限嚴重型(VIII:C 小於1%)血友病病人。 I. 嚴重 A 型血友病病人： i. Eloctate：(106/9/1、 106/12/1、109/3/1、111/1/1) A. 每3天注射一次，每次25-35 IU/kg 或每4天注射一次，每次 36-50 IU/kg 或每5天注射一 次，每次51-65 IU/kg。 B. 每天最大平均劑量不可超過15 IU/kg，單次劑量不可超過65 IU/kg。若臨床上需要使用超過 上述劑量，則需要事前審查。 ii. Adynovate：(107/11/1、 109/3/1、111/1/1)	4.2.3. 第八、第九凝血因子製劑 (103/4/1、106/9/1、106/12/1、 107/11/1、108/10/1、109/3/1、 109/9/1、109/12/1、110/3/1、 111/1/1、111/3/1): 1. (略) 2. 用於 A 型或 B 型無抗體存在之血友 病人：(111/1/1) (1) (略) (2) 預防性治療(primary prophylaxis)：限嚴重型(VIII:C 小於1%)血友病病人。 I. 嚴重 A 型血友病病人： i. Eloctate：(106/9/1、 106/12/1、109/3/1、111/1/1) A. 每3天注射一次，每次25-35 IU/kg 或每4天注射一次，每次 36-50 IU/kg 或每5天注射一次， 每次51-65 IU/kg。 B. 每天最大平均劑量不可超過15 IU/kg，單次劑量不可超過65 IU/kg。若臨床上需要使用超過 上述劑量，則需要事前審查。 ii. Adynovate：(107/11/1、 109/3/1、111/1/1)

修訂後給付規定	原給付規定
A. 每週注射2次，每次40-50 IU/kg。 B. 每天最大平均劑量不可超過15 IU/kg，單次劑量不可超過65 IU/kg。若臨床上需要使用超過上述劑量，則需要事前審查。 iii. Kovaltry、Afstyla、Nuwiq：(109/3/1、109/9/1、111/1/1、111/3/1) A. 每週注射2至3次，每次20-40 IU/kg。 B. 每天最大平均劑量不可超過15 IU/kg，單次劑量不可超過65 IU/kg。若臨床上需要使用超過上述劑量，則需要事前審查。 iv. Jivi：(109/12/1、111/1/1、<u>112/3/1</u>) A. 每週注射2次，每次30-40 IU/kg；每5天注射1次，每次45-60 IU/kg；每週注射1次，每次60 IU/kg。 B. 限用於12歲以上且曾接受治療之A型血友病病人。<u>(112/3/1)</u> v. <u>Esperoct：(112/3/1)</u> A. <u>未滿12歲：每週注射1~2次，每次65 IU/kg。每天最大平均劑量不可超過15 IU/kg，單次劑量不可超過65 IU/kg。若臨床上需要</u>	A. 每週注射2次，每次40-50 IU/kg。 B. 每天最大平均劑量不可超過15 IU/kg，單次劑量不可超過65 IU/kg。若臨床上需要使用超過上述劑量，則需要事前審查。 iii. Kovaltry、Afstyla、Nuwiq：(109/3/1、109/9/1、111/1/1、111/3/1) A. 每週注射2至3次，每次20-40 IU/kg。 B. 每天最大平均劑量不可超過15 IU/kg，單次劑量不可超過65 IU/kg。若臨床上需要使用超過上述劑量，則需要事前審查。 iv. Jivi：(109/12/1、111/1/1) A. 每週注射2次，每次30-40 IU/kg；每5天注射1次，每次45-60 IU/kg；每週注射1次，每次60 IU/kg。 B. 限用於12歲<u>(含)</u>以上且曾接受治療之A型血友病病人。

修訂後給付規定	原給付規定
<u>使用超過前述劑量，則需要事前審查。</u> <u>B. 12歲以上：每4天注射1次，每次50 IU/kg，或每週注射1次，每次75 IU/kg，但每月總量不得超過350 IU/kg。</u> <u>vi. 其他製劑：每週注射1-3次，每一次劑量為15-25 IU/kg。</u> (106/12/1、109/3/1、111/1/1) II. ~ IV. (略) (3) (略) 3. 免疫耐受治療(immune toleration induction；ITI)：(略)	v. 其他製劑：每週注射1-3次，每一次劑量為15-25 IU/kg。 (106/12/1、109/3/1、111/1/1) II. ~ IV. (略) (3) (略) 3. 免疫耐受治療(immune toleration induction；ITI)：(略)

註：劃線部分為新修訂規定