

113 年

門診透析整體性醫療品質資訊公開報告



衛生福利部

中央健康保險署

114 年 7 月

目 錄

壹、前言.....	1
貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義.....	2
參、指標值監測結果.....	15
一、血液透析.....	15
指標 1：血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin).....	15
指標 2：血液透析_尿素氮透析效率-URR.....	19
指標 3：血液透析_貧血檢查-Hb.....	22
指標 4：血液透析_住院率（住院人次/每千人）.....	25
指標 5：血液透析_死亡率（死亡人數/每百人）.....	29
指標 6：瘻管重建率(重建次數/每千人月）.....	32
指標 7：血液透析_脫離率.....	34
指標 8：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率.....	37
指標 9：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率.....	39
指標 10：55 歲以下血液透析病人移植登錄率.....	41
指標 11：血液透析_鈣磷乘積.....	43
指標 12：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率.....	46
指標 13：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率.....	48
二、腹膜透析：.....	50
指標 1：腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin).....	50
指標 2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V.....	54
指標 3：腹膜透析_貧血檢查-Hb.....	57
指標 4：腹膜透析_住院率（住院人次/每千人）.....	60
指標 5：腹膜透析_死亡率（死亡人數/每百人）.....	64
指標 6：腹膜透析_腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每百人月）.....	67
指標 7：腹膜透析_脫離率.....	69
指標 8：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率.....	72
指標 9：腹膜透析_C 型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率.....	74
指標 10：55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率.....	76
指標 11：腹膜透析_鈣磷乘積.....	78
指標 12：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率.....	81
指標 13：腹膜透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率.....	83
三、整體透析.....	85
指標 1：醫療費用核減率.....	85
指標 2：C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率.....	86
指標 3：HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率.....	88
肆、結論：.....	90

附錄 表 1、113 年整體性監測結果表.....	91
附錄 表 2、113 年分區別指標監測結果彙整表	97

壹、前言

● 緣起：

本報告係依據「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」整體性醫療品質資訊之門診透析公開項目暨「全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案」之專業醫療服務品質指標編列，以健保特約醫療機構之醫療費用申報資料及透析院所上傳至健保署 VPN 系統資料為主要資料來源，彙編各指標趨勢情形而成；主要分為血液透析及腹膜透析 2 大部分，呈現各指標之操作型定義、整體與健保署 6 個分區業務組¹及醫療院所各層級別之監測統計。

● 意義：

本報告指標項目依其屬性區分為正向指標、負向指標、參考指標及規定合理範圍指標。對正向指標之監測目的，在於期待指標數值呈上升或平穩但維持高於某一數值之趨勢，若呈現明顯下降趨勢，則需進一步瞭解原因；反之，對負向指標，則期待指標數值呈下降或平穩但維持低於某一數值之趨勢，若呈現明顯上升趨勢，則需進一步瞭解原因；對於參考指標及規定合理範圍指標之監測目的，在於期待指標數值呈平穩趨勢，若呈現巨幅變動，則需進一步瞭解原因。

● 特別聲明：

本報告資料無法反映完整醫療過程與結果，因此，指標數字的表現可能為多重原因造成，醫療適當性仍需就病人情形由醫療專業認定，不應直接認定反映品質，請使用者審慎解讀。

註 1；健保署 6 個分區係指中央健康保險署臺北、北區、中區、南區、高屏及東區等六個分區服務範圍。

貳、門診透析之整體性醫療品質資訊項目及定義

第一部分：血液透析

指標1. 營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白(Albumin)人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白(Albumin)檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白(Albumin)檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白(Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl(BCP法)之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗血清白蛋白(Albumin) BCG法或BCP法人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均值*(1 $\pm$ 10%)為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均值*(1-10%)為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標2. 尿素氮透析效率-URR

一、公式說明：

(一) 受檢率：

分子：分母病人檢驗URR人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值：

分子：申報URR檢驗值之總和。

分母：申報URR檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗 $URR \geq 65\%$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗 URR 人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $值 * (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $值 * (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗 $Hb > 8.5g/dL$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $值 * (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $值 * (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標4. 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所之血液透析病人總住院次數。

分母：追蹤期間之血液透析病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*1000(住院次數/每千人)。

※病患歸屬於統計期間最多透析次數之院所，若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多之院所為歸屬。

二、參考值：本項為負向指標，依特約類別分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，以最近3年平均値*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間<1年之死亡率

分子：追蹤期間血液透析小於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間血液透析小於1年之病患歸屬原則總病人數。

(二) 透析時間≥1年之死亡率

分子：追蹤期間血液透析大於等於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間血液透析大於等於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100(人數/每百人)。

二、參考值：

(一) 透析時間<1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均値*(1+10%)為上限。

(二) 透析時間 ≥ 1 年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標6. 瘻管重建率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有血液透析病人重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術前90天申報資料計算歸屬院所之總次數。

分母：追蹤期間之血液透析病患歸屬原則總病人月數。

計算： $\left[\frac{\text{分子}}{\text{分母}} \right] \times 1000$ (人次/每千人月)。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一) 脫離率(I)-腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二) 脫離率(II)-因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值：本項列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標8. B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體 (anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下血液透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下血液透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下血液透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均 $\times(1-10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每年。

指標11. 鈣磷乘積

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人測量鈣磷乘積人數。

分母：慢性血液透析病人數。

(二) 合格率

分子：分母病人測量鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數。

分母：慢性血液透析病人測量鈣磷乘積人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\text{值} \times (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標12. B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報HBsAg檢驗病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

指標13. C型肝炎抗體(anti-HCV) 受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報anti-HCV檢驗病人數。

分母：慢性血液透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

第二部分：腹膜透析

指標1. 營養狀態-血清白蛋白 (Albumin)

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白(Albumin)人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報血清白蛋白(Albumin)檢驗值之總和。

分母：申報血清白蛋白(Albumin)檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗血清白蛋白(Albumin) ≥ 3.5 gm/dl (BCG法)或 ≥ 3.0 gm/dl(BCP法) 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗血清白蛋白(Albumin)BCG法或BCP法人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均值*(1 $\pm$ 10%)為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均值*(1-10%)為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標2. 尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Weekly Kt/V檢驗值之總和。

分母：申報Weekly Kt/V檢驗值大於0之總筆數。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Weekly Kt/V $\geq$ 1.7之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Weekly Kt/V人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\pm 10\%$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，最近3年平均 $\pm 10\%$ 為下限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標3. 貧血檢查- Hb

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人檢驗Hb人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 全體平均值

分子：申報Hb檢驗值之總和。

分母：申報Hb檢驗值大於0之總筆數。

※排除正在接受化學療法之癌症病患及非腎性貧血(如地中海貧血)。

(三) 合格率

分子：分母病人檢驗Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人檢驗Hb人數。

二、參考值：

(一) 受檢率：最近3年平均 $\pm 10\%$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\pm 10\%$ 為下限。

三、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標4. 住院率

一、公式說明：

分子：追蹤期間第一次住院前90天申報資料計算歸屬院所之腹膜透析病人總住院次數。

分母：追蹤期間之腹膜透析病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*1000(住院次數/每千人)。

※病患歸屬於統計期間最多透析次數之院所，若有院所次數相同，則以申報醫療費用最多之院所為歸屬。

二、參考值：本項為負向指標，依特約類別分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，以最近3年平均値*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標5. 死亡率

一、公式說明：

(一) 透析時間<1年之死亡率

分子：追蹤期間腹膜透析小於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間腹膜透析小於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100(人數/每百人)。

(二) 透析時間≥1年之死亡率

分子：追蹤期間腹膜透析大於等於1年病人之死亡前90天申報資料計算歸屬院所之死亡個案數。

分母：追蹤期間腹膜透析大於等於1年之病患歸屬原則總病人數。

計算：〔分子/分母〕*100(人數/每百人)。

二、參考值：

(一) 透析時間<1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均

值*(1+10%)為上限。

(二) 透析時間 $\geq$ 1年死亡率：本項為負向指標，以最近3年平均
值*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每3個月（每季別呈現指標數值）。

指標6. 腹膜炎發生率

一、公式說明：

分子：追蹤期間所有病人發生腹膜炎前90天申報資料計算歸屬院所之發生腹膜炎總次數。

分母：追蹤期間之病患歸屬原則總病人月數。

計算：〔分子/分母〕*100 (人次/每百人月)。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均值*(1+10%)為上限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標7. 脫離率

一、公式說明：

(一) 脫離率(I)-腎功能回復而不須再透析者：

分子：追蹤期間新病人因腎功能回復而不須再繼續接受
透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有新病人數。

(二) 脫離率(II)-因腎移植而不須再透析者：

分子：追蹤期間因腎移植而不須再接受透析治療之人數。

分母：追蹤期間之所有病人數。

二、參考值：本項列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標8. B型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間HBsAg由陰性轉為陽性(新感染)之病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每年。

指標9. C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率

一、公式說明：

分子：追蹤期間anti-HCV由陰性轉為陽性(新感染)之人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間之陰性病人數。

二、參考值：本項為負向指標，以最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限。

三、監測頻率：每年。

指標10. 55歲以下腹膜透析病人移植登錄率

一、公式說明：

分子：55歲以下腹膜透析病患移植登錄人數。

分母：55歲以下腹膜透析病患人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均 $\times(1-10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每年。

指標11. 鈣磷乘積

一、公式說明：

(一) 受檢率

分子：分母病人測量鈣磷乘積人數。

分母：慢性腹膜透析病人數。

(二) 合格率

分子：分母病人測量鈣磷乘積 $<60 \text{ mg}^2/\text{dL}^2$ 之人數。

分母：慢性腹膜透析病人測量鈣磷乘積人數。

二、參考值：本項為正向指標。

(一) 受檢率：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

(二) 合格率：本項為正向指標，以最近3年平均 $\text{值} \times (1 - 10\%)$ 為下限。

三、監測頻率：每6個月(以上、下半年，呈現指標數值)。

指標12. B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報HBsAg檢驗病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

指標13. C型肝炎抗體(anti-HCV) 受檢率

一、公式說明：

分子：分母病人追蹤期間申報anti-HCV檢驗病人數。

分母：慢性腹膜透析病人追蹤期間前一年之陰性病人數。

二、參考值：最近3年平均 $\text{值} \times (1 \pm 10\%)$ 為規定合理範圍。

三、監測頻率：每年。

第三部分：整體透析

指標1:醫療費用核減率

一、公式說明：

分子：申請點數扣除核定點數之初核核減點數。

分母：申請點數加總部分負擔之醫療費用點數。

二、監測頻率：每3個月(每季別呈現指標數值)。

指標2：C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率

一、公式說明：

分子：統計期間及追蹤統計期前3年申報HCV RNA檢查或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數。

分母：慢性透析病人C型肝炎抗體(anti-HCV)陽性人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均值*(1-10%)為下限。

(此項指標為110年新增項目)

三、監測頻率：每年。

指標3：HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率

一、公式說明：

分子：C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數(排除最末次收案治療失敗、復發與再感染者)。

分母：於統計期間及追蹤統計期前3年慢性透析病人HCV RNA陽性或C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫收案治療人數。

二、參考值：本項為正向指標，以最近3年平均值*(1-10%)為下限。(此項指標為110年新增項目)

三、監測頻率：每年。

參、指標值監測結果

一、 血液透析

指標 1：血液透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

(一) 參考值：

1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，113 年為 88.30%~100.00%。

2.合格率：

(1)血清白蛋白(Albumin)≥3.5gm/dl(BCG 法)之百分比：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，113 年為≥84.90%。

(2)血清白蛋白(Albumin)≥3.0gm/dl(BCP 法)之百分比：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，113 年為≥85.99%。

(二) 整體監測結果：


1.113 年 Albumin 受檢率為 98.11%，較 112 年之 98.1%上升，符合規定合理範圍。

2.113 年 Albumin(BCG 法)≥3.5gm/dl 之百分比為 94.87%，較 112 年之 94.3%上升，於參考值範圍。

3.113 年 Albumin(BCP 法)≥3.0gm/dl 之百分比為 94.92%，較 112 年之 94.6%上升，於參考值範圍。


(三) 分區別：

Albumin 受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.00%	97.90%	97.64%	98.31%	97.49%	97.38%	98.00%
112年	97.95%	98.28%	97.71%	98.17%	97.63%	97.06%	98.10%
113年	97.91%	98.15%	97.63%	98.00%	98.09%	97.00%	98.11%

Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	94.77%	93.98%	93.56%	94.47%	94.19%	95.53%	94.33%
112年	95.26%	94.58%	92.86%	94.28%	93.83%	94.17%	94.30%
113年	95.66%	95.01%	94.28%	94.65%	94.22%	94.52%	94.87%


Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	96.57%	95.28%	93.73%	94.58%	98.25%	98.48%	95.87%
112年	94.02%	93.84%	94.04%	97.30%	100.00%	100.00%	94.60%
113年	94.30%	93.59%	95.13%	94.77%	100.00%	97.50%	94.92%

(四) 層級別：


Albumin 受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.12%	97.95%	96.37%	98.01%	98.00%
112年	98.15%	98.11%	96.82%	98.03%	98.10%
113年	98.44%	97.82%	97.02%	98.01%	98.11%

Albumin(BCG 法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。


血液透析_Albumin(BCG) ≥ 3.5 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	94.52%	93.50%	91.98%	95.03%	94.33%
112年	95.09%	92.93%	92.20%	95.00%	94.30%
113年	95.10%	93.68%	92.76%	95.54%	94.87%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。

血液透析_Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	-	95.43%	97.31%	96.47%	95.87%
112年	100.00%	92.38%	98.07%	98.67%	94.60%
113年	96.79%	92.73%	96.83%	98.51%	94.92%

-：當年度該層級院所無使用 BCP 法檢測 Albumin。

指標 2：血液透析_尿素氮透析效率-URR

(一) 參考值：


- 1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，113 年為 88.26%~100.00%。
- 2.合格率：URR $\geq$ 65%之百分比以最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，113 年為 $\geq$ 88.99%。

(二) 整體監測結果：

- 1.113 年 URR 受檢率為 98.05%，較 112 年之 98.06%下降，符合規定合理範圍。
- 2.113 年 URR $\geq$ 65%之百分比為 98.84%，較 112 年之 98.93%下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


URR 受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.00%	97.82%	97.59%	98.27%	97.43%	97.38%	97.96%
112年	97.91%	98.14%	97.71%	98.16%	97.59%	96.97%	98.06%
113年	97.87%	97.97%	97.59%	97.97%	98.00%	96.96%	98.05%

URR $\geq$ 65%之百分比：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。

血液透析_尿素氮透析效率- $\geq$ 65%之百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.80%	98.49%	98.65%	98.95%	98.83%	98.61%	98.79%
112年	98.96%	98.54%	98.88%	99.05%	99.03%	98.37%	98.93%
113年	98.91%	98.54%	98.83%	98.89%	98.89%	97.91%	98.84%

(四) 層級別：


URR 受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。

血液透析_尿素氮透析效率-URR檢查比率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.02%	97.90%	96.36%	97.97%	97.96%
112年	98.05%	98.00%	96.77%	97.99%	98.06%
113年	98.32%	97.64%	96.95%	97.97%	98.05%

URR $\geq$ 65%之百分比：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.16%	98.47%	98.50%	98.98%	98.79%
112年	98.72%	98.61%	98.57%	99.04%	98.93%
113年	98.74%	98.55%	98.55%	98.88%	98.84%

指標 3：血液透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


- 1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，113 年為 88.45%~100.00%。
- 2.合格率：Hb>8.5g/dL 之百分比以最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，113 年為 ≥88.52%。

(二) 整體監測結果：

- 1.113 年 Hb 受檢率為 98.25%，與 112 年之 98.25%相同，符合規定合理範圍。
- 2.113 年 Hb>8.5g/dL 之百分比為 98.43%，較 112 年之 98.33%上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：


Hb 受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.15%	98.15%	97.60%	98.48%	97.72%	97.85%	98.17%
112年	98.00%	98.39%	97.80%	98.35%	97.98%	97.23%	98.25%
113年	97.88%	98.41%	97.85%	98.23%	98.31%	97.27%	98.25%

Hb>8.5g/dL 之百分比：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。

血液透析Hb>8.5g/dL百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.28%	98.27%	97.85%	98.40%	98.63%	96.99%	98.30%
112年	98.15%	98.41%	97.98%	98.58%	98.68%	97.02%	98.33%
113年	98.17%	98.23%	98.25%	98.46%	99.06%	97.93%	98.43%

(四) 層級別：


Hb 受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。

血液透析- Hb 受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.34%	98.09%	96.64%	98.16%	98.17%
112年	98.41%	98.17%	97.09%	98.16%	98.25%
113年	98.53%	97.91%	97.27%	98.13%	98.25%

Hb>8.5g/dL 之百分比：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.38%	98.85%	97.83%	97.92%	98.30%
112年	98.60%	98.77%	97.88%	98.03%	98.33%
113年	98.87%	98.61%	98.24%	98.06%	98.43%

指標 4：血液透析_住院率（住院人次/每千人）

（一）參考值:最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，113年為 ≤ 449.25 。


1. 醫學中心： ≤ 422.00 。
2. 區域醫院： ≤ 497.87 。
3. 地區醫院： ≤ 488.29 。
4. 基層診所： ≤ 418.24 。

（二）整體監測結果：

113 年住院率統計值為 409.91，較 112 年之 417.87 下降，於參考值範圍。

（三）分區別：


住院率：113 年各分區統計值除東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	396.97	374.65	432.40	423.95	398.52	481.32	406.94
112年	400.42	392.58	453.95	423.66	414.11	491.83	417.87
113年	397.35	386.95	435.44	418.00	409.88	452.20	409.91


(四) 層級別：

住院率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。




年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	384.45	450.57	440.94	379.26	406.94
112年	396.62	454.96	459.71	390.29	417.87
113年	377.61	465.72	445.37	380.97	409.91

醫學中心：113 年各分區統計值除東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	422.86	304.83	428.07	320.62	325.06	452.88	384.45
112年	419.28	339.44	417.29	351.44	354.56	501.44	396.62
113年	386.45	306.61	405.59	357.48	358.34	487.44	377.61

區域醫院：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	457.37	374.94	484.25	469.48	456.41	496.21	450.57
112年	445.91	399.34	518.44	444.31	463.97	482.61	454.96
113年	463.09	430.98	478.05	481.22	479.35	444.91	465.72

地區醫院：113 年各分區統計值除東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	434.80	405.02	433.22	480.90	454.97	554.07	440.94
112年	443.83	423.13	469.58	494.58	462.49	550.42	459.71
113年	437.54	414.60	452.93	478.89	444.35	495.11	445.37

基層診所：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	361.31	358.51	406.82	396.66	377.79	431.42	379.26
112年	371.32	370.75	420.17	398.99	395.51	445.21	390.29
113年	370.98	355.23	409.26	381.08	387.56	402.19	380.97

指標 5：血液透析_死亡率（死亡人數/每百人）

（一）參考值：


- 1.透析時間<1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，
113 年為 ≤ 2.78 。
- 2.透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，
113 年為 ≤ 3.16 。

（二）整體監測結果：

- 1.113 年透析時間<1 年之死亡率為 2.36，較 112 年之 2.51 下降，於參考值範圍。
- 2.113 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率為 2.82，較 112 年之 2.93 下降，於參考值範圍。


（三）分區別：

透析時間<1 年之死亡率：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	2.41	3.06	2.88	2.84	2.46	2.86	2.69
112年	2.35	2.63	2.85	2.65	2.14	2.77	2.51
113年	2.29	2.50	2.58	2.17	2.26	2.50	2.36


透析時間 ≥ 1 年之死亡率：113年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	3.05	3.03	3.05	3.06	2.99	3.13	3.04
112年	2.89	2.98	2.97	2.83	2.93	3.19	2.93
113年	2.82	2.86	2.73	2.86	2.87	2.68	2.82

(四) 層級別：


透析時間 < 1 年之死亡率：113年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	1.89	2.54	3.23	2.65	2.69
112年	1.83	2.07	3.09	2.60	2.51
113年	1.55	2.12	2.72	2.50	2.36

透析時間 ≥ 1 年之死亡率：113年各層級統計值除地區醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。

血液透析_透析時間 ≥ 1 年死亡率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	2.30	2.93	3.37	3.09	3.04
112年	2.18	2.75	3.23	3.01	2.93
113年	2.23	2.73	3.17	2.84	2.82

指標 6：瘻管重建率(重建次數/每千人月)


(一) 參考值：最近3年平均値*(1+10%)為上限，113年為 ≤ 2.78 。

(二) 整體監測結果：

113 年瘻管重建率為 2.25，較 112 年之 2.38 下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


瘻管重建率：113 年各分區統計值除中區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	1.82	1.75	6.00	2.48	1.04	1.55	2.55
112年	1.83	2.03	5.06	2.27	0.93	1.72	2.38
113年	1.77	1.90	4.70	1.95	1.02	2.06	2.25

(四) 層級別：

瘻管重建率：113 年各層級統計值除醫學中心、區域醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	3.02	3.68	2.57	1.75	2.55
112年	3.13	3.36	2.41	1.56	2.38
113年	3.02	3.45	2.06	1.41	2.25

指標 7：血液透析_脫離率

(一) 參考值:


- 1.脫離率(I)-腎功能回復：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。
- 2.脫離率(II)-腎移植：列為參考指標，惟不列正負向及參考值。

(二) 整體監測結果：

- 1.113 年脫離率(I)腎功能回復為 1.85%，較 112 年之 1.79%上升。
- 2.113 年脫離率(II)腎移植為 0.28%，較 112 年之 0.29%下降。

(三) 分區別:


脫離率(I)腎功能回復：113 年各分區統計值與 112 年比較除北區、高屏、東區下降，其他分區皆上升。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	1.37%	1.18%	1.79%	1.26%	1.24%	2.57%	1.42%
112年	1.38%	2.30%	1.84%	1.71%	2.01%	2.33%	1.79%
113年	1.82%	2.07%	2.17%	2.01%	1.21%	1.90%	1.85%

脫離率(II)腎移植：113 年各分區統計值與 112 年比較，除北區、高屏下降，其他分區皆上升。。


血液透析_脫離率(II)-腎移植



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	0.25%	0.24%	0.18%	0.12%	0.20%	0.25%	0.21%
112年	0.40%	0.32%	0.23%	0.14%	0.30%	0.24%	0.29%
113年	0.44%	0.24%	0.26%	0.14%	0.19%	0.29%	0.28%


(四) 層級別：

脫離率(I)腎功能回復：113 年各層級統計值與 112 年比較，除醫學中心下降，其他層級皆上升。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	1.16%	1.69%	1.19%	1.42%	1.42%
112年	1.42%	1.57%	2.11%	1.88%	1.79%
113年	1.25%	1.61%	2.34%	2.02%	1.85%

脫離率(II)腎移植：113 年各層級統計值與 112 年比較，地區醫院、基層診所下降，醫學中心、區域醫院上升。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	0.45%	0.17%	0.21%	0.18%	0.21%
112年	0.68%	0.30%	0.22%	0.24%	0.29%
113年	0.70%	0.34%	0.20%	0.20%	0.28%

指標 8：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率


(一) 參考值：最近3年平均值*(1+10%)為上限，113年為 $\leq 0.21\%$ 。

(二) 整體監測結果：

113 年 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.2%，與 112 年之 0.2%相同，於參考值範圍。

(三) 分區別：


B 型肝炎表面抗原轉陽率：113 年各分區統計值除臺北、中區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	0.19%	0.17%	0.20%	0.07%	0.15%	0.31%	0.17%
112年	0.20%	0.13%	0.21%	0.16%	0.24%	0.31%	0.20%
113年	0.24%	0.18%	0.23%	0.10%	0.18%	0.18%	0.20%

(四) 層級別：

B 型肝炎表面抗原轉陽率：113 年各層級統計值除區域醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	0.24%	0.19%	0.15%	0.14%	0.17%
112年	0.20%	0.27%	0.19%	0.16%	0.20%
113年	0.19%	0.33%	0.20%	0.13%	0.20%

指標 9：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，113年為 $\leq 0.37\%$ 。

(二) 整體監測結果：

113 年 C 型肝炎抗體轉陽率為 0.2%，較 112 年之 0.26% 下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


C 型肝炎抗體轉陽率：113 年各分區統計值除東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	0.22%	0.27%	0.20%	0.24%	0.21%	1.45%	0.26%
112年	0.20%	0.22%	0.34%	0.32%	0.18%	0.91%	0.26%
113年	0.16%	0.22%	0.24%	0.17%	0.14%	0.55%	0.20%

(四) 層級別：

C 型肝炎抗體轉陽率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	0.15%	0.18%	0.40%	0.24%	0.26%
112年	0.19%	0.26%	0.33%	0.24%	0.26%
113年	0.13%	0.30%	0.27%	0.13%	0.20%

指標 10：55 歲以下血液透析病人移植登錄率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1-10\%)$ 為下限，113年為 $\geq 26.51\%$ 。

(二) 整體監測結果：

113年55歲以下血液透析病人移植登錄率為31.33%，較112年之31.3%上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：


55歲以下血液透析病人移植登錄率：113年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	30.36%	26.88%	35.26%	24.39%	23.51%	26.37%	28.73%
112年	33.46%	29.18%	36.32%	27.19%	26.02%	30.74%	31.30%
113年	33.00%	28.87%	35.60%	27.81%	27.19%	30.17%	31.33%

(四) 層級別：

55 歲以下血液透析病人移植登錄率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	44.72%	28.64%	27.56%	24.79%	28.73%
112年	48.00%	31.07%	30.14%	26.94%	31.30%
113年	46.36%	29.74%	30.21%	27.38%	31.33%

指標 11：血液透析_鈣磷乘積

(一) 參考值：


- 1.受檢率:最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，113 年為 88.30%~100.00%。
- 2.合格率(鈣磷乘積 $<60\text{mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比): 最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，113 年為 $\geq 87.61\%$ 。

(二) 整體監測結果：

- 1.113 年血液透析鈣磷乘積受檢率為 98.11%，較 112 年之 98.09%上升，符合規定合理範圍。
- 2.113 年血液透析鈣磷乘積合格率为 97.38%，較 112 年之 97.44%下降，於參考值範圍。


(三) 分區別：

血液透析鈣磷乘積受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.03%	97.90%	97.63%	98.26%	97.48%	97.38%	98.00%
112年	97.95%	98.24%	97.70%	98.16%	97.63%	97.01%	98.09%
113年	97.92%	98.12%	97.62%	97.99%	98.09%	97.00%	98.11%


血液透析鈣磷乘積合格率：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	97.12%	96.96%	97.51%	97.96%	96.92%	96.90%	97.33%
112年	96.84%	97.39%	97.46%	98.07%	97.57%	97.06%	97.44%
113年	96.94%	97.12%	97.65%	97.87%	97.21%	97.09%	97.38%


(四) 層級別：

血液透析鈣磷乘積受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.08%	97.97%	96.39%	97.99%	98.00%
112年	98.10%	98.12%	96.80%	98.01%	98.09%
113年	98.43%	97.79%	97.03%	98.00%	98.11%

血液透析鈣磷乘積合格率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	97.17%	96.97%	96.80%	97.32%	97.33%
112年	97.31%	97.32%	97.05%	97.32%	97.44%
113年	97.67%	97.04%	96.99%	97.19%	97.38%

指標 12：血液透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率


(一) 參考值：最近3年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，113年為88.15%~100.00%。

(二) 整體監測結果：

113 年血液透析 B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率為 98.25%，較 112 年之 97.86%上升，符合規定合理範圍。

(三) 分區別：


血液透析 B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	96.82%	98.07%	97.64%	98.61%	98.14%	96.90%	98.18%
112年	95.87%	98.24%	96.89%	98.64%	98.40%	96.87%	97.86%
113年	97.27%	97.79%	98.21%	98.19%	97.75%	96.86%	98.25%

(四) 層級別

血液透析 B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	97.58%	97.67%	95.91%	96.75%	98.18%
112年	97.73%	96.97%	96.57%	96.38%	97.86%
113年	98.21%	97.23%	95.27%	97.39%	98.25%

指標 13：血液透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，113年為88.59%~100.00%。

(二) 整體監測結果：

113 年血液透析 C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率為 98.46%，較 112 年之 98.22%上升，符合規定合理範圍。

(三) 分區別：


血液透析 C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	97.83%	98.31%	97.70%	98.72%	98.25%	94.44%	98.48%
112年	97.00%	98.34%	97.02%	98.70%	98.36%	96.56%	98.22%
113年	97.75%	97.82%	98.20%	98.21%	98.19%	96.99%	98.46%

(四) 層級別：

血液透析 C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.15%	97.91%	96.39%	97.11%	98.48%
112年	97.75%	98.08%	96.52%	96.61%	98.22%
113年	98.31%	97.49%	95.67%	97.62%	98.46%

二、腹膜透析：

指標 1：腹膜透析_營養狀態-血清白蛋白(Albumin)

(一) 參考值：

1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，113 年為 88.25%~100.00%。

2.合格率：

(1)血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.5 gm/dl(BCG 法)之百分比：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，113 年為 $\geq 80.39\%$ 。

(2)血清白蛋白 (Albumin) ≥ 3.0 gm/dl(BCP 法)之百分比：最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，113 年為 $\geq 85.42\%$ 。

(二) 整體監測結果：


1.113 年 Albumin 受檢率為 98.39%，較 112 年之 98.31%上升，符合規定合理範圍。

2.113 年 Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比為 90.09%，較 112 年之 89.33%上升，於參考值範圍。

3.113 年 Albumin(BCP 法) ≥ 3.0 gm/dl 之百分比為 85.84%，較 112 年之 94.24%下降，於參考值範圍。


(三) 分區別：

Albumin 受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.06%	99.14%	95.12%	98.10%	98.75%	98.82%	97.72%
112年	98.48%	99.67%	97.14%	97.79%	98.63%	98.83%	98.31%
113年	99.00%	99.67%	96.45%	98.05%	99.01%	98.27%	98.39%


Albumin(BCG 法) ≥ 3.5 gm/dl 之百分比：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	90.58%	90.91%	87.08%	89.30%	89.47%	89.82%	89.52%
112年	92.06%	90.43%	86.03%	87.57%	89.50%	82.84%	89.33%
113年	91.13%	90.94%	88.25%	89.37%	90.77%	83.53%	90.09%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：113 年各分區統計值除臺北、北區低於參考值，其他分區皆於參考值範圍。

腹膜透析 Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	95.11%	87.50%	89.74%	-	100.00%	-	94.48%
112年	95.60%	77.78%	89.74%	95.77%	-	-	94.24%
113年	81.43%	75.00%	97.06%	-	100.00%	-	85.84%

-：當年度分區業務組所轄院所無使用 BCP 法檢測 Albumin。

(四) 層級別：

Albumin 受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。


腹膜透析Albumin-受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.75%	98.11%	88.43%	97.87%	97.72%
112年	98.81%	98.22%	94.61%	100.00%	98.31%
113年	98.88%	97.54%	99.07%	100.00%	98.39%

Albumin(BCG 法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。


腹膜透析 Albumin(BCG) ≥ 3.5 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	90.07%	89.78%	82.77%	91.30%	89.52%
112年	90.07%	89.53%	80.09%	97.22%	89.33%
113年	90.57%	88.88%	89.97%	94.12%	90.09%

Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比：113 年各層級統計值地區醫院低於參考值，區域醫院、基層診所於參考值範圍。

腹膜透析 Albumin(BCP) ≥ 3.0 百分比



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	-	94.66%	88.89%	-	94.48%
112年	-	94.80%	77.78%	-	94.24%
113年	-	86.00%	83.33%	100.00%	85.84%

-：當年度該層級院所無使用 BCP 法檢測 Albumin。

指標 2：腹膜透析_尿素氮透析效率-Weekly Kt/V

(一) 參考值：


1. Weekly Kt/V 受檢率：最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，113 年為 86.98%~100.00%。
2. 合格率：Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比以最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，113 年為 $\geq 83.53\%$ 。

(二) 整體監測結果：

1. 113 年 Weekly Kt/V 受檢率為 97.44%，較 112 年之 97.01% 上升，符合規定合理範圍。
2. 113 年 Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比為 92.86%，較 112 年之 93.33% 下降，於參考值範圍。


(三) 分區別：

Weekly Kt/V 受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	96.32%	97.63%	93.43%	96.65%	98.25%	98.82%	96.34%
112年	97.14%	98.15%	95.67%	96.87%	97.00%	98.25%	97.01%
113年	97.96%	98.56%	95.44%	96.84%	98.30%	97.69%	97.44%


Weekly Kt/V $\geq$ 1.7 百分比：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	91.49%	94.27%	90.81%	93.26%	93.31%	93.41%	92.34%
112年	93.67%	94.14%	92.55%	93.82%	92.59%	92.26%	93.33%
113年	93.72%	92.38%	90.16%	95.49%	91.98%	94.67%	92.86%


(四) 層級別：

Weekly Kt/V 受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	97.15%	96.80%	87.31%	97.87%	96.34%
112年	97.49%	96.88%	92.95%	100.00%	97.01%
113年	98.17%	96.07%	98.46%	100.00%	97.44%

Weekly Kt/V $\geq$ 1.7 百分比：113 年各層級統計值除基層診所低於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	92.71%	92.86%	88.03%	76.09%	92.34%
112年	94.09%	93.67%	85.71%	80.56%	93.33%
113年	93.11%	92.78%	90.60%	79.41%	92.86%

指標 3：腹膜透析_貧血檢查-Hb

(一) 參考值：


- 1.受檢率：最近 3 年平均值*(1±10%)為規定合理範圍，113 年為 88.16%~100.00%。
- 2.合格率：Hb>8.5 g/dL 之百分比以最近 3 年平均值*(1-10%)為下限，113 年為 ≥87.53%。

(二) 整體監測結果：

- 1.113 年 Hb 受檢率為 98.33%，較 112 年之 98.37%下降，符合規定合理範圍。
- 2.113 年 Hb>8.5 g/dL 之百分比為 97.1%，與 112 年之 97.27%下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


Hb 受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.22%	99.13%	93.77%	98.08%	98.63%	98.11%	97.53%
112年	98.64%	99.81%	97.25%	97.39%	98.99%	98.13%	98.37%
113年	99.07%	99.64%	96.04%	97.99%	98.94%	98.26%	98.33%

Hb>8.5 g/dL 之百分比：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。

腹膜透析Hb>8.5 g/dL百分比




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	97.60%	97.54%	95.96%	97.56%	97.78%	94.23%	97.27%
112年	97.46%	97.73%	96.56%	97.32%	97.09%	99.05%	97.27%
113年	97.32%	97.82%	95.88%	96.24%	97.70%	98.23%	97.10%

(四) 層級別


Hb 受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。

腹膜透析 HB-受檢率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.79%	98.02%	86.69%	100.00%	97.53%
112年	98.73%	98.44%	95.12%	100.00%	98.37%
113年	98.80%	97.47%	99.44%	100.00%	98.33%

Hb>8.5 g/dL 之百分比：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	96.82%	98.16%	95.22%	96.77%	97.27%
112年	97.62%	96.95%	95.60%	100.00%	97.27%
113年	97.32%	96.51%	96.65%	94.44%	97.10%

指標 4：腹膜透析_住院率（住院人次/每千人）

（一）參考值:最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，113年為 ≤ 451.51 。

1.醫學中心： ≤ 402.90 。

2.區域醫院： ≤ 490.63 。

3.地區醫院： ≤ 547.95 。


4.基層診所： ≤ 972.00 。

（二）整體監測結果：

113 年住院率統計值為 433.53，較 112 年之 419.47 上升，於參考值範圍。

（三）分區別：


住院率：113 年各分區統計值除中區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	410.40	369.84	459.46	398.79	395.74	444.10	412.03
112年	436.26	410.08	444.94	378.84	391.44	462.69	419.47
113年	435.19	414.94	477.51	403.27	421.56	392.75	433.53


(四) 層級別：

住院率：113 年各層級統計值除地區醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	374.36	441.09	488.12	833.33	412.03
112年	373.28	451.69	537.70	1067.57	419.47
113年	386.63	483.90	562.50	812.50	433.53


醫學中心：113 年各分區統計值除中區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	363.57	369.32	426.70	326.13	366.11	370.00	374.36
112年	396.50	362.70	406.04	273.61	353.83	404.76	373.28
113年	392.48	399.51	421.27	308.60	383.68	337.96	386.63

區域醫院：113 年各分區統計值除臺北、中區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。


腹膜透析(區域醫院)_住院率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	475.04	357.23	454.43	451.31	416.75	524.59	441.09
112年	479.11	431.76	444.03	450.26	410.44	560.00	451.69
113年	527.40	410.14	529.53	469.42	434.07	486.96	483.90

地區醫院：113 年各分區統計值，除中區、南區、高屏高於參考值，臺北、北區於參考值範圍。

腹膜透析(地區醫院)_住院率




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	389.94	403.64	582.95	425.00	450.98	-	488.12
112年	513.16	426.47	603.29	589.74	558.82	-	537.70
113年	266.67	461.83	712.71	583.33	663.79	-	562.50

-：該分區業務組所轄地區醫院無歸戶之個案。

基層診所：113 年各分區統計值高屏高於參考值，北區、中區於參考值範圍。

腹膜透析(基層診所)_住院率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	-	413.79	551.72	2500.00	7000.00	-	833.33
112年	-	807.69	395.83	-	-	-	1067.57
113年	-	625.00	456.52	-	2500.00	-	812.50

-：該分區業務組所轄地區醫院無歸戶之個案。

指標 5：腹膜透析_死亡率（死亡人數/每百人）

（一）參考值

1. 透析時間 < 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，113 年為 ≤ 1.31 。
2. 透析時間 ≥ 1 年死亡率：最近 3 年平均值*(1+10%)為上限，113 年為 ≤ 2.10 。


（二）整體監測結果：

1. 113 年透析時間 < 1 年之死亡率統計值為 1.23，較 112 年之 1.35 下降，於參考值範圍。
2. 113 年透析時間 ≥ 1 年之死亡率統計值為 1.94，較 112 年之 2.02 下降，於參考值範圍。

（三）分區別：


透析時間 < 1 年之死亡率：113 年各分區統計值除高屏、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。

腹膜透析_透析時間 < 1 年之死亡率



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	1.11	0.69	1.59	0.68	1.38	0.00	1.11
112年	1.36	1.50	1.55	1.05	1.15	1.85	1.35
113年	1.26	0.76	1.11	0.50	2.40	1.90	1.23


透析時間 ≥ 1 年之死亡率：113年各分區統計值除北區、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	1.92	1.99	2.02	1.70	1.48	1.10	1.82
112年	2.00	2.11	1.77	2.38	2.00	1.51	2.02
113年	1.76	2.14	1.98	1.92	1.97	2.86	1.94


(四) 層級別：

透析時間 < 1 年之死亡率：113年各層級統計值，除區域醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	0.74	1.23	2.40	0.00	1.11
112年	0.96	1.50	3.05	0.00	1.35
113年	0.96	1.61	1.27	0.00	1.23

透析時間 ≥ 1 年之死亡率：113年各層級統計值，區域醫院、地區醫院高於參考值，醫學中心、基層診所於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	1.55	2.01	2.76	2.92	1.82
112年	1.51	2.51	3.41	0.89	2.02
113年	1.59	2.26	3.48	2.06	1.94

指標 6：腹膜透析_腹膜炎發生率（發生腹膜炎次數/每百人月）


（一）參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，113年為 ≤ 1.75 。

（二）整體監測結果：

113年腹膜炎發生率統計值為1.57，較112年之1.65下降，於參考值範圍。

（三）分區別：

腹膜炎發生率：113年各分區統計值除北區、東區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。




年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	1.66	1.63	1.66	1.39	1.66	1.25	1.60
112年	1.83	1.65	1.91	1.29	1.45	1.18	1.65
113年	1.46	1.80	1.63	1.48	1.60	2.37	1.57

(四) 層級別：

腹膜炎發生率：113 年各層級統計值除區域醫院、地區醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。

腹膜透析_腹膜炎發生率



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	1.58	1.67	1.47	2.42	1.60
112年	1.67	1.66	1.62	1.94	1.65
113年	1.62	1.82	2.39	1.39	1.57

指標 7：腹膜透析_脫離率

(一) 參考值:

1.脫離率(I)-腎功能回復：參考指標，不列正負向及參考值。

2.脫離率(II)-腎移植：參考指標，不列正負向及參考值。


(二) 整體監測結果：

1.113 年脫離率(I)腎功能回復為 0.79%，較 112 年之 1.12% 下降。

2.113 年脫離率(II)腎移植為 1.5%，較 112 年之 1.54% 下降。


(三) 分區別：

脫離率(I)腎功能回復：113 年各分區統計值與 112 年比較，除北區、高屏上升及東區持平，其餘分區皆下降。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	0.58%	0.00%	0.69%	0.61%	0.62%	0.00%	0.53%
112年	1.26%	1.31%	1.39%	1.56%	0.00%	0.00%	1.12%
113年	0.74%	1.52%	1.23%	0.00%	0.66%	0.00%	0.79%


脫離率(II)腎移植：113 年各分區統計值與 112 年比較，除臺北、高屏下降，其他分區皆上升。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	0.90%	1.23%	1.15%	0.63%	1.38%	1.91%	1.06%
112年	2.11%	1.64%	1.23%	0.74%	1.65%	0.00%	1.54%
113年	1.83%	1.76%	1.48%	1.31%	0.75%	1.34%	1.50%


(四) 層級別：

脫離率(I)腎功能回復：113 年各層級統計值與 112 年比較，除地區醫院上升及基層診所持平，其餘層級別皆下降。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	0.36%	0.67%	0.93%	0.00%	0.53%
112年	1.04%	1.33%	0.83%	0.00%	1.12%
113年	0.70%	0.44%	3.09%	0.00%	0.79%

脫離率(II)腎移植：113 年各層級統計值與 112 年比較，醫學中心、區域醫院下降，其餘層級別皆上升。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	1.44%	0.59%	0.87%	0.00%	1.06%
112年	2.10%	0.89%	0.99%	4.00%	1.54%
113年	1.98%	0.60%	2.46%	4.35%	1.50%

指標 8：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)轉陽率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，113年為 $\leq 0.28\%$ 。

(二) 整體監測結果：

113 年腹膜透析 B 型肝炎表面抗原轉陽率為 0.17%，較 112 年之 0.38%下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


腹膜透析 B 型肝炎表面抗原轉陽率：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	0.35%	0.00%	0.19%	0.00%	0.11%	0.79%	0.19%
112年	0.34%	0.44%	0.39%	0.00%	0.84%	0.00%	0.38%
113年	0.17%	0.15%	0.28%	0.13%	0.12%	0.00%	0.17%

(四) 層級別：

腹膜透析 B 型肝炎表面抗原轉陽率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	0.21%	0.14%	0.34%	0.00%	0.19%
112年	0.32%	0.38%	0.68%	4.17%	0.38%
113年	0.13%	0.25%	0.00%	0.00%	0.17%

指標 9：腹膜透析_C 型肝炎抗體（anti-HCV）轉陽率


（一）參考值：最近3年平均 $\times(1+10\%)$ 為上限，113年為 $\leq 0.13\%$ 。

（二）整體監測結果：

113 年腹膜透析 C 型肝炎抗體轉陽率為 0.14%，較 112 年之 0.11%略上升，高於參考值。

（三）分區別：


腹膜透析 C 型肝炎抗體轉陽率：113 年各分區統計值除北區、中區高於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	0.00%	0.00%	0.17%	0.11%	0.00%	0.00%	0.05%
112年	0.05%	0.00%	0.18%	0.00%	0.33%	0.00%	0.11%
113年	0.11%	0.14%	0.26%	0.12%	0.11%	0.00%	0.14%

(四) 層級別：

腹膜透析 C 型肝炎抗體轉陽率：113 年各層級統計值除醫學中心、區域醫院高於參考值，其他層級皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	0.00%	0.14%	0.00%	0.00%	0.05%
112年	0.10%	0.14%	0.00%	0.00%	0.11%
113年	0.15%	0.15%	0.00%	0.00%	0.14%

指標 10：55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率


(一) 參考值：最近3年平均值*(1-10%)為下限，113年為 $\geq 56.23\%$ 。

(二) 整體監測結果：

113 年 55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率為 65.92%，較 112 年之 63.87%上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：


55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率：113 年各分區統計值，除東區低於參考值，其他分區皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	62.84%	57.17%	72.47%	61.68%	52.45%	54.43%	61.99%
112年	65.37%	59.07%	72.13%	65.19%	54.78%	47.37%	63.87%
113年	64.85%	64.18%	74.20%	65.90%	60.09%	53.09%	65.92%

(四) 層級別：

55 歲以下腹膜透析病人移植登錄率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	70.38%	49.54%	57.34%	52.38%	61.99%
112年	69.99%	55.77%	53.77%	60.00%	63.87%
113年	71.10%	56.78%	63.27%	60.00%	65.92%

指標 11：腹膜透析_鈣磷乘積

(一) 參考值：


- 1.受檢率:最近 3 年平均值 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，113 年為 88.23%~100.00%。
- 2.合格率(鈣磷乘積 $<60\text{mg}^2/\text{dL}^2$ 之百分比): 最近 3 年平均值 $\times(1-10\%)$ 為下限，113 年為 $\geq 86.27\%$ 。

(二) 整體監測結果：

- 1.113 年腹膜透析鈣磷乘積受檢率為 98.38%，較 112 年之 98.28%上升，符合規定合理範圍。
- 2.113 年腹膜透析鈣磷乘積合格率为 96.31%，較 112 年之 96.11%上升，於參考值範圍。


(三) 分區別：

腹膜透析鈣磷乘積受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	98.14%	99.14%	95.12%	98.19%	98.75%	98.82%	97.76%
112年	98.44%	99.67%	97.07%	97.79%	98.63%	98.83%	98.28%
113年	99.00%	99.67%	96.38%	98.05%	99.01%	98.27%	98.38%


腹膜透析鈣磷乘積合格率：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	95.26%	96.53%	95.69%	96.31%	96.55%	95.21%	95.92%
112年	96.07%	96.30%	95.47%	96.23%	96.53%	95.86%	96.11%
113年	96.22%	97.23%	95.55%	96.30%	96.11%	97.06%	96.31%


(四) 層級別：

腹膜透析鈣磷乘積受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	98.75%	98.18%	88.43%	100.00%	97.76%
112年	98.78%	98.18%	94.61%	100.00%	98.28%
113年	98.88%	97.54%	98.77%	100.00%	98.38%

腹膜透析鈣磷乘積合格率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



指標 12：腹膜透析_B 型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，113年為86.83%~100.00%。

(二) 整體監測結果：

113 年腹膜透析 B 型肝炎表面抗原受檢率為 96.9%，較 112 年之 96.4%上升，符合規定合理範圍。

(三) 分區別：


腹膜透析 B 型肝炎表面抗原受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	97.58%	96.49%	95.35%	97.97%	95.02%	99.21%	96.75%
112年	96.50%	96.02%	96.71%	97.86%	93.55%	96.83%	96.40%
113年	99.03%	94.43%	95.84%	97.10%	95.02%	93.02%	96.90%

(四) 層級別

腹膜透析 B 型肝炎表面抗原受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	96.11%	97.30%	97.95%	81.82%	96.75%
112年	95.06%	97.78%	94.56%	95.83%	96.40%
113年	97.08%	96.48%	91.28%	95.24%	96.90%

指標 13：腹膜透析_C 型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1\pm 10\%)$ 為規定合理範圍，113年為86.83%~100.00%。

(二) 整體監測結果：

113 年腹膜透析 C 型肝炎抗體受檢率為 97%，較 112 年之 96.27%上升，符合規定合理範圍。

(三) 分區別：


腹膜透析 C 型肝炎抗體受檢率：113 年各分區統計值皆符合規定合理範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	97.47%	97.86%	95.16%	98.06%	94.74%	99.24%	96.82%
112年	96.21%	95.79%	96.80%	97.57%	93.93%	96.32%	96.27%
113年	98.99%	95.40%	95.66%	97.23%	95.09%	93.38%	97.00%

(四) 層級別

腹膜透析 C 型肝炎抗體受檢率：113 年各層級統計值皆符合規定合理範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	96.01%	97.79%	97.48%	77.78%	96.82%
112年	95.01%	97.48%	95.42%	95.65%	96.27%
113年	96.96%	96.84%	92.44%	95.24%	97.00%

三、整體透析


指標 1：醫療費用核減率

(一) 整體監測結果：

113 年初核核減率為 0.04%，與 112 年之 0.04%持平。

(二) 分區別：

113 年各分區統計值與 112 年比較，除北區上升，其他分區皆持平。



年季	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	合計
111年	0.01%	0.09%	0.04%	0.01%	0.01%	0.25%	0.03%
112年	0.01%	0.13%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%
113年	0.01%	0.14%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%

指標 2：C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率


(一) 參考值：最近3年平均 $\times(1-10\%)$ 為下限，113年為 $\geq 77.38\%$ 。

(二) 整體監測結果：

113 年 C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率為 86.31%，較 112 年之 86.97% 下降，於參考值範圍。

(三) 分區別：


C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	85.96%	94.12%	89.90%	89.43%	90.44%	97.14%	89.90%
112年	86.40%	92.09%	80.60%	84.95%	90.39%	97.02%	86.97%
113年	88.03%	89.69%	81.96%	84.36%	87.34%	94.76%	86.31%

(四) 層級別：

C 型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA 檢查率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	91.56%	90.16%	93.17%	88.46%	89.90%
112年	93.06%	86.69%	89.60%	85.61%	86.97%
113年	93.25%	86.96%	88.95%	84.37%	86.31%

指標 3：HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率


(一) 參考值：最近3年平均 $\geq 82.84\%$ 為下限，113年為 $\geq 82.84\%$ 。

(二) 整體監測結果：

113年 HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率為 92.54%，較 112 年之 92.15% 上升，於參考值範圍。

(三) 分區別：


HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率：113 年各分區統計值皆於參考值範圍。



年度	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
111年	87.09%	86.69%	93.51%	90.93%	91.30%	92.49%	90.13%
112年	88.85%	89.52%	95.26%	93.09%	92.94%	97.56%	92.15%
113年	90.00%	91.23%	92.70%	94.56%	92.07%	96.20%	92.54%

(四) 層級別：

HCV RNA 陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率：113 年各層級統計值皆於參考值範圍。



年度	醫學中心	區域醫院	地區醫院	基層診所	全署
111年	95.45%	93.00%	92.01%	87.08%	90.13%
112年	95.62%	94.76%	94.10%	89.72%	92.15%
113年	91.67%	95.14%	92.68%	91.33%	92.54%

肆、結論：

- 一、113年全國統計值之整體監測結果如附錄表1，血液透析部分皆於參考值範圍內；腹膜透析部分除「住院率(地區醫院)」、「C型肝炎抗體轉陽率」高於參考值，其餘指標皆於參考值範圍內。
- 二、各分區統計值指標監測結果如附錄表2，部分指標未於參考值範圍：

(一) 負向指標有部分分區高於參考值：

1. 血液透析：住院率、瘻管重建率、B型肝炎表面抗原轉陽率、C型肝炎抗體轉陽率。
2. 腹膜透析：住院率、透析時間 <1 年死亡率、透析時間 ≥ 1 年之死亡率、腹膜炎發生率、C型肝炎抗體轉陽率。

(二) 正向指標有部分分區低於參考值：腹膜透析「血清白蛋白(Albumin) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ (BCP法)之百分比」及「55歲以下透析病人移植登錄率」。

附錄 表1、113年整體性監測結果表

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)	監測結果之趨勢
血液透析			
指標1：營養狀態 血清白蛋白 (Albumin) -受檢率	規定合理範圍	88.30%~100.00% O	113年Albumin受檢率為98.11%，較112年之98.1%上升，符合規定合理範圍。
血清白蛋白(BCG) $\geq$ 3.5之百分比	正向	$\geq 84.90\%$ O	113 年 Albumin(BCG 法) $\geq 3.5\text{gm/dl}$ 之百分比為94.87%，較112年之94.3%上升，於參考值範圍。
血清白蛋白(BCP) $\geq$ 3.0之百分比	正向	$\geq 85.99\%$ O	113 年 Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比為94.92%，較112年之94.6%上升，於參考值範圍。
指標2： 尿素氮透析效率 URR-受檢率	規定合理範圍	88.26%~100.00% O	113年URR受檢率為98.05%，較112年之98.06%下降，符合規定合理範圍。
URR$\geq 65\%$之百分比	正向	$\geq 88.99\%$ O	113 年 URR $\geq 65\%$ 之百分比為98.84%，較112年之98.93%下降，於參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率	規定合理範圍	88.45%~100.00% O	113年Hb受檢率為98.25%，較112年之98.25%相同，符合規定合理範圍。
Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比	正向	$\geq 88.52\%$ O	113 年 Hb $>8.5\text{g/dL}$ 之百分比為98.43%，較112年之98.33%上升，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)		監測結果之趨勢
指標4： 同院住院率 (住院人次/每千人)	負向	醫學 中心	≤ 422.00 O	113年統計值為409.91，較112年之417.87上升，於參考值範圍(≤ 449.25)。各層級別住院率均於參考值範圍。
		區域 醫院	≤ 497.87 O	
		地區 醫院	≤ 488.29 O	
		基層 診所	≤ 418.24 O	
指標5： 死亡率 (死亡人數/每百人)	透析時間<1年 負向	≤ 2.78 O		113年透析時間<1年之死亡率為2.36，較112年之2.51下降，於參考值範圍。
	透析時間 $\geq$ 1年 負向	≤ 3.16 O		113年透析時間 $\geq$ 1年之死亡率為2.82，較112年之2.93下降，於參考值範圍。
指標6： 瘻管重建率 (重建次數/每千人月)	負向	≤ 2.78 O		113年瘻管重建率為2.25，較112年之2.38下降，於參考值範圍。
指標7： 脫離率(百分比) 脫離率(I)- 腎功能回復 脫離率(II)- 腎移植	參考指標	不另訂定		113年脫離率(I)腎功能回復為1.85%，較112年之1.79%上升。113年脫離率(II)腎移植為0.28%，較112年之0.29%下降。
指標8： B型肝炎表面抗原 (HBsAg)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.21\%$ O		113年B型肝炎表面抗原轉陽率為0.2%，較112年之0.2%相同，於參考值範圍。
指標9： C型肝炎抗體(anti-HCV)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.37\%$ O		113年C型肝炎抗體轉陽率為0.2%，與112年之0.26%下降，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)	監測結果之趨勢
指標10： 55歲以下血液透析病人移植登錄率(百分比)	正向	≥26.51% O	113年55歲以下血液透析病人移植登錄率為31.33%，較112年之31.3%上升，於參考值範圍。
指標11： 鈣磷乘積-受檢率	規定合理範圍	88.30%~100.00% O	113年血液透析鈣磷乘積受檢率為98.11%，較112年之98.09%上升，符合規定合理範圍。
鈣磷乘積< 60 mg ² /dL ²	正向	≥87.61% O	113年血液透析鈣磷乘積合格率为97.38%，較112年之97.44%下降，於參考值範圍。
指標12： B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率	規定合理範圍	88.15%~100.00% O	113年血液透析B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率為98.25%，較112年之97.86%上升，符合規定合理範圍。
指標13： C型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率(百分比)	規定合理範圍	88.59%~100.00% O	113年血液透析C型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率為98.46%，較112年之98.22%上升，符合規定合理範圍。
腹膜透析			
指標1：營養狀態 血清白蛋白(Albumin)-受檢率	規定合理範圍	88.25%~100.00% O	113年Albumin受檢率為98.39%，較112年之98.31%上升，符合規定合理範圍。
血清白蛋白(BCG) ≥ 3.5之百分比	正向	≥80.39% O	113年Albumin(BCG法) ≥ 3.5gm/dl之百分比為90.09%，較112年之89.33%上升，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)		監測結果之趨勢
血清白蛋白(BCP) $\geq$ 3.0之百分比	正向	$\geq 85.42\%$ O		113 年 Albumin(BCP 法) $\geq 3.0\text{gm/dl}$ 之百分比為85.84%，較112年之94.24%下降，於參考值範圍。
指標2： 尿素氮透析效率 Weekly Kt/V-受檢率 Weekly Kt/V ≥ 1.7 之百分比	規定合理範圍	86.98%~100.00% O		113 年 Weekly Kt/V 受檢率為97.44%，較112年之97.01%上升，符合規定合理範圍。
	正向	$\geq 83.53\%$ O		113 年 Weekly Kt/V ≥ 1.7 百分比為92.86%，較112年之93.33%下降，於參考值範圍。
指標3： Hb-受檢率 Hb>8.5g/dL之百分比	規定合理範圍	88.16%~100.00% O		113 年 Hb 受檢率為98.33%，較112年之98.37%下降，符合規定合理範圍。
	正向	$\geq 87.53\%$ O		113 年 Hb>8.5 g/dL 之百分比為97.1%，與112年之97.27%下降，於參考值範圍。
指標4： 住院率 (住院人次/每千人)	負向	醫學中心	≤ 402.90 O	113年統計值為433.53，較112年之419.47上升，於參考值範圍(≤ 451.51)；各層級統計值除地區醫院高於參考值，其餘層級皆於參考值範圍。
		區域醫院	≤ 490.63 O	
		地區醫院	≤ 547.95 >	
		基層診所	≤ 972.00 O	

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)	監測結果之趨勢
指標5： 死亡率 (死亡人數/每百人)	透析時間<1年 負向	≤ 1.31 O	113年透析時間<1年之死亡率統計值為1.23，較112年之1.35下降，略高於參考值範圍。
	透析時間 ≥ 1 年 負向	≤ 2.10 O	113年透析時間 ≥ 1 年之死亡率統計值為1.94，較112年之2.02下降，略高於參考值範圍。
指標6： 腹膜炎發生率(發生 腹膜炎次數/每100人 月)	負向	≤ 1.75 O	113年腹膜炎發生率統計值為1.57，較112年之1.65下降，於參考值範圍。
指標7： 脫離率(百分比) 脫離率(I) -腎功能回復 脫離率(II) -腎移植	參考指標	不另訂定	113年脫離率(I)腎功能回復為0.79%，較112年之1.12%下降。 113年脫離率(II)腎移植為1.5%，較112年之1.54%下降。
指標8： B型肝炎表面抗原 (HBsAg)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.28\%$ O	113年腹膜透析B型肝炎表面抗原轉陽率為0.17%，較112年之0.38%下降，且高於參考值。
指標9： C型肝炎抗體(anti- HCV)轉陽率(百分比)	負向	$\leq 0.13\%$ >	113年腹膜透析C型肝炎抗體轉陽率為0.14%，較112年之0.11%略上升，於參考值範圍。
指標10： 55歲以下腹膜透析病人 移植登錄率	正向	$\geq 56.23\%$ O	113年55歲以下腹膜透析病人移植登錄率為65.92%，較112年之63.87%上升，於參考值範圍。

指標名稱	指標 正負向	參考值* (112年)	監測結果之趨勢
指標11： 鈣磷乘積 -受檢率 -鈣磷乘積 $<60\text{mg}^2/\text{dL}^2$	規定合理範圍	88.23%~100.00% ○	113年腹膜透析鈣磷乘積受檢率為98.38%，較112年之98.28%上升，符合規定合理範圍。
	正向	$\geq 86.27\%$ ○	113年腹膜透析鈣磷乘積合格率为96.31%，較112年之96.11%上升，於參考值範圍。
指標12： B型肝炎表面抗原 (HBsAg)受檢率	規定合理範圍	86.83%~100.00% ○	113年腹膜透析B型肝炎表面抗原受檢率為96.9%，較112年之96.4%上升，符合規定合理範圍。
指標13： C型肝炎抗體(anti-HCV)受檢率	規定合理範圍	86.83%~100.00% ○	113年腹膜透析C型肝炎抗體受檢率為97%，較112年之96.27%上升，符合規定合理範圍。
整體透析			
指標1： 醫療費用核減率	參考指標	不另訂定	113年初核核減率為0.04%，與112年之0.04%持平。
指標2： C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA-檢查率	正向	$\geq 77.38\%$ ○	113年C型肝炎抗體陽性慢性透析病人HCV RNA檢查率為86.31%，較112年之86.97%略下降，於參考值範圍。
指標3： HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物-治療率	正向	$\geq 82.84\%$ ○	113年HCV RNA陽性慢性透析病人抗病毒藥物治療率為92.54%，較112年之92.15%上升，於參考值範圍。

【註】*「○」表該項整體性之醫療品質資訊項目於參考值範圍

「>」表該項整體性之醫療品質資訊項目高於參考值上限

附錄 表 2、113 年分區別指標監測結果彙整表

113年門診血液透析部分

指 標	指 標 項 目		臺 北	北 區	中 區	南 區	高 屏	東 區	全 署	指 標 方 向	參 考 值	臺 北	北 區	中 區	南 區	高 屏	東 區	全 署	
	血 液 透 析 部 分																		
1	血清白蛋白		Albumin-受檢率	97.91%	98.15%	97.63%	98.00%	98.09%	97.00%	98.11%	合理範圍	88.30%~100.00%	○	○	○	○	○	○	
			Albumin(BCG)家數	223	102	143	110	143	21	742									
			Albumin(BCG)平均值	3.954	3.9018	3.8992	3.9161	3.8964	3.9036	3.9179									
			Albumin(BCG)≥3.5百分比	95.66%	95.01%	94.28%	94.65%	94.22%	94.52%	94.87%	正向	≥84.90%	○	○	○	○	○	○	○
			Albumin(BCP)家數	7	4	6	3	1	1	22									
			Albumin-平均值(BCP)	3.3972	3.6125	3.6534	3.6028	3.7947	3.8548	3.5779									
2	URR(102年新增項目,取代 原Kt/V)		Albumin(BCP)≥3.0百分比	94.30%	93.59%	95.13%	94.77%	100.00%	97.50%	94.92%	正向	≥85.99%	○	○	○	○	○	○	
			URR-受檢率	97.87%	97.97%	97.59%	97.97%	98.00%	96.96%	98.05%	合理範圍	88.26%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
			URR-平均值	75.1353	74.5101	74.14	74.7843	74.4987	73.1159	74.6295									
3	Hb(102年新增項目,取代 原Hct)		URR≥65%百分比	98.91%	98.54%	98.83%	98.89%	98.89%	97.91%	98.84%	正向	≥88.99%	○	○	○	○	○	○	
			Hb-受檢率	97.88%	98.41%	97.85%	98.23%	98.31%	97.27%	98.25%	合理範圍	88.45%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
			Hb-平均值	10.4407	10.3533	10.3787	10.4367	10.5104	10.3117	10.4248									
4	住院率		Hb> 8.5百分比	98.17%	98.23%	98.25%	98.46%	99.06%	97.93%	98.43%	正向	≥88.52%	○	○	○	○	○	○	
			醫學中心	住院次數	1,420	274	516	225	545	165	3,143								
				住院率(住院次數/千人)	386.45	306.61	405.59	357.48	358.34	487.44	377.61	負向	≤422.00	○	○	○	○	○	>
			區域醫院	住院次數	2,083	1,241	1,688	1,339	1,236	212	7,799								
住院率(住院次數/千人)	463.09	430.98		478.05	481.22	479.35	444.91	465.72	負向	≤497.87	○	○	○	○	○	○	○		
5	地區醫院		住院次數	1,028	1,542	1,682	1,095	1,040	304	6,690									
			住院率(住院次數/千人)	437.54	414.60	452.93	478.89	444.35	495.11	445.37	負向	≤488.29	○	○	○	○	○	>	○
			基層診所	住院次數	4,944	1,782	2,790	2,830	3,164	276	15,783								
				住院率(住院次數/千人)	370.98	355.23	409.26	381.08	387.56	402.19	380.97	負向	≤418.24	○	○	○	○	○	○
6	死亡率 (人/百人)		透析時間<1年之死亡率	2.29	2.50	2.58	2.17	2.26	2.50	2.36	負向	≤2.78	○	○	○	○	○	○	○
			透析時間≥1年之死亡率	2.82	2.86	2.73	2.86	2.87	2.68	2.82	負向	≤3.16	○	○	○	○	○	○	○
7	瘻管重建率		瘻管重建次數	205	117	358	124	73	22	897									
			瘻管重建率(人次/千人月)	1.7655	1.9000	4.7019	1.9455	1.0200	2.0645	2.2490	負向	≤2.78	○	○	>	○	○	○	○
8	脫離率		腎功能恢復人數	54	29	40	29	20	5	177	參考指標	不另訂定							
			脫離率(I)-腎功能回復	1.82%	2.07%	2.17%	2.01%	1.21%	1.90%	1.85%									
			腎移植人數	101	29	39	18	27	6	220	參考指標	不另訂定							
			脫離率(II)-腎移植	0.44%	0.24%	0.26%	0.14%	0.19%	0.29%	0.28%									
9	B型肝炎表面抗原轉陽率		轉陽人數	44	18	27	10	20	3	122									
			陰性人數	18,117	9,749	11,822	10,202	11,313	1,688	62,304									
			轉陽率	0.24%	0.18%	0.23%	0.10%	0.18%	0.18%	0.20%	負向	≤0.21%	>	○	>	○	○	○	○
10	C型肝炎抗體轉陽率		轉陽人數	31	22	29	17	16	9	124									
			陰性人數	19,220	10,040	11,921	9,996	11,317	1,629	63,521									
			轉陽率	0.16%	0.22%	0.24%	0.17%	0.14%	0.55%	0.20%	負向	≤0.37%	○	○	○	○	○	>	○
11	五十五歲以下透析病人移 植登錄率		登錄人數	1,439	802	1,053	617	732	146	4,780									
			病患人數	4,360	2,778	2,958	2,219	2,692	484	15,256									
			登錄率(百分比)	33.00%	28.87%	35.60%	27.81%	27.19%	30.17%	31.33%	正向	≥26.51%	○	○	○	○	○	○	○
12	鈣磷乘積指標		鈣磷乘積-受檢率	97.92%	98.12%	97.62%	97.99%	98.09%	97.00%	98.11%	合理範圍	88.30%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
			鈣磷乘積< 60 mg²/dL²	96.94%	97.12%	97.65%	97.87%	97.21%	97.09%	97.38%	正向	≥87.61%	○	○	○	○	○	○	○
13	B型肝炎表面抗原 (HBsAg)受檢率		申報HBsAg檢驗值之人數	17,622	9,534	11,610	10,017	11,058	1,635	61,211									
			B肝-前一年之陰性人數	18,117	9,749	11,822	10,202	11,313	1,688	62,304									
			B肝-受檢率	97.27%	97.79%	98.21%	98.19%	97.75%	96.86%	98.25%	合理範圍	88.15%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○
14	C型肝炎抗體(Anti-HCV) 受檢率		申報Anti-HCV檢驗值之人數	18,788	9,821	11,706	9,817	11,112	1,580	62,544									
			C肝-前一年之陰性人數	19,220	10,040	11,921	9,996	11,317	1,629	63,521									
			C肝-受檢率	97.75%	97.82%	98.20%	98.21%	98.19%	96.99%	98.46%	合理範圍	88.59%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○

113年門診腹膜透析總額醫療品質資訊彙整表

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	
	腹膜透析部分																		
1	血清白蛋白	Albumin-受檢率	99.00%	99.67%	96.45%	98.05%	99.01%	98.27%	98.39%	合理範圍	88.25%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCG)家數	27	18	27	17	19	4	112										
		Albumin(BCG)平均值	3.7611	3.7796	3.6806	3.7426	3.7806	3.6179	3.7436										
		Albumin(BCG)≥3.5百分比	91.13%	90.94%	88.25%	89.37%	90.77%	83.53%	90.09%	正向	≥80.39%	○	○	○	○	○	○	○	
		Albumin(BCP)家數	3	1	4	0	1	0	9										
		Albumin-平均值(BCP)	3.051	2.9143	3.6489		3.5		3.182										
		Albumin(BCP)≥3.0百分比	81.43%	75.00%	97.06%		100.00%		85.84%	正向	≥85.42%	<	<	○		○		○	
2	Weekly Kt/V	Weekly Kt/V-受檢率	97.96%	98.56%	95.44%	96.84%	98.30%	97.69%	97.44%	合理範圍	86.98%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Weekly Kt/V-平均值	1.9926	2.0858	1.9707	2.0328	2.0262	2.0044	2.0124										
		Weekly Kt/V≥1.7百分比	93.72%	92.38%	90.16%	95.49%	91.98%	94.67%	92.86%	正向	≥83.53%	○	○	○	○	○	○	○	
3	Hb(102年新增項目,取代原Hct)	Hb-受檢率	99.07%	99.64%	96.04%	97.99%	98.94%	98.26%	98.33%	合理範圍	88.16%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		Hb-平均值	10.3302	10.1856	10.0888	10.2745	10.3873	10.677	10.2732										
		Hb>8.5百分比	97.32%	97.82%	95.88%	96.24%	97.70%	98.23%	97.10%	正向	≥87.53%	○	○	○	○	○	○	○	
4	住院率	醫學中心	住院次數	616	162	351	144	221	37	1,530									
			住院率(住院次數/千人)	392.48	399.51	421.27	308.60	383.68	337.96	386.63	負向	≤402.90	○	○	>	○	○	○	○
		區域醫院	住院次數	385	134	265	261	198	28	1,270									
			住院率(住院次數/千人)	527.40	410.14	529.53	469.42	434.07	486.96	483.90	負向	≤490.63	>	○	>	○	○	○	○
		地區醫院	住院次數	6	61	65	11	39		180									
		住院率(住院次數/千人)	266.67	461.83	712.71	583.33	663.79		562.50	負向	≤547.95	○	○	>	>	>		>	
		基層診所	住院次數		5	11		3		26									
			住院率(住院次數/千人)		625.00	456.52		2,500.00		812.50	負向	≤972.00		○	○		>		○
5	死亡率 (人/百人)	透析時間<1年之死亡率	1.2634	0.7576	1.1111	0.4975	2.3973	1.9048	1.2343	負向	≤1.31	○	○	○	○	>	>	○	
		透析時間≥1年之死亡率	1.7629	2.1371	1.9772	1.9237	1.9747	2.8571	1.9384	負向	≤2.10	○	>	○	○	○	>	○	
6	腹膜炎發生率	腹膜炎發生次數	375	173	261	170	194	43	1,206										
		腹膜炎發生率(人次/百人月)	1.4641	1.7992	1.6349	1.4832	1.6023	2.3665	1.5749	負向	≤1.75	○	>	○	○	○	>	○	
7	脫離率	腎功能恢復人數	3	2	3	0	1	0	9										
		脫離率(I)-腎功能回復	0.74%	1.52%	1.23%	0.00%	0.66%	0.00%	0.79%	參考指標	不另訂定								
		腎移植人數	40	14	19	12	7	2	94										
		脫離率(II)-腎移植	1.83%	1.76%	1.48%	1.31%	0.75%	1.34%	1.50%	參考指標	不另訂定								
8	B型肝炎表面抗原轉陽率	轉陽人數	3	1	3	1	1	-	9										
		陰性人數	1,759	664	1,058	793	804	129	5,186										
		轉陽率	0.17%	0.15%	0.28%	0.13%	0.12%	0.00%	0.17%	負向	≤0.28%	○	○	○	○	○	○	○	
9	C型肝炎抗體轉陽率	轉陽人數	2	1	3	1	1	-	8										
		陰性人數	1,877	718	1,152	829	876	136	5,566										
		轉陽率	0.11%	0.14%	0.26%	0.12%	0.11%	0.00%	0.14%	負向	≤0.13%	○	>	>	○	○	○	>	
10	五十五歲以下透析病人移植登錄率	登錄人數	655	292	486	315	280	43	2,068										
		病患人數	1,010	455	655	478	466	81	3,137										
		登錄率(百分比)	64.85%	64.18%	74.20%	65.90%	60.09%	53.09%	65.92%	正向	≥56.23%	○	○	○	○	○	<	○	
11	鈣磷乘積指標	鈣磷乘積-受檢率	99.00%	99.67%	96.38%	98.05%	99.01%	98.27%	98.38%	合理範圍	88.23%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
		鈣磷乘積<60 mg2/dL2	96.22%	97.23%	95.55%	96.30%	96.11%	97.06%	96.31%	正向	≥86.27%	○	○	○	○	○	○	○	
12	B型肝炎表面抗原(HBsAg)受檢率	申報HBsAg檢驗值之人數	1,742	627	1,014	770	764	120	5,025										
		B肝-前一年之陰性人數	1,759	664	1,058	793	804	129	5,186										
		B肝-受檢率	99.03%	94.43%	95.84%	97.10%	95.02%	93.02%	96.90%	合理範圍	86.83%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	
13	C型肝炎抗體(Anti-HCV)受檢率	申報Anti-HCV檢驗值之人數	1,858	685	1,102	806	833	127	5,399										
		C肝-前一年之陰性人數	1,877	718	1,152	829	876	136	5,566										
		C肝-受檢率	98.99%	95.40%	95.66%	97.23%	95.09%	93.38%	97.00%	合理範圍	86.83%~100.00%	○	○	○	○	○	○	○	

113年門診整體透析部分

指標	指標項目		臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署	指標方向	參考值	臺北	北區	中區	南區	高屏	東區	全署
	整體透析(血液與腹膜合併計算)																	
1	醫療費用核減率(初核) (104年新增)		0.01%	0.14%	0.05%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	合理範圍	無							
2	HCV RNA檢查率 (110年新增)	C型肝炎抗體陽性慢性透析病人 HCV RNA-檢查率(年)	88.03%	89.69%	81.96%	84.36%	87.34%	94.76%	86.31%	正向	≥77.38%	○	○	○	○	○	○	○
3	抗病毒藥物治療率 (110年新增)	HCV RNA陽性慢性透析病人抗 病毒藥物-治療率(年)	90.00%	91.23%	92.70%	94.56%	92.07%	96.20%	92.54%	正向	≥82.84%	○	○	○	○	○	○	○

備註：

- 一、依據「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」第二條附表一「整體性之醫療品質資訊」項目製作。
- 二、門診透析總額專業醫療服務品質指標之參考值：依全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案所訂參考值。
- 三、>為高於參考值上限，<為低於參考值下限，○為位於參考值範圍，"- "為統計值分母為0。
- 四、本表指標值資料擷自健保倉儲醫療給付檔案分析系統。