

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自112年3月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.1.4.2.Rivaroxaban(如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、 103/5/1、104/12/1、105/5/1、 110/7/1、111/2/1、<u>112/3/1</u>)</p> <p>限用於</p> <p>1. 靜脈血栓高危險(符合下列條件之一)病患,接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時,預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE),限用10mg 錠劑,每日一粒,人工髖關節手術術後治療,最多5週;人工膝關節手術術後治療,最多2週: <u>(112/3/1)</u></p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史(須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程)之病患;</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查(Venous ultrasonography)或靜脈攝影(Venography)檢測,診斷為靜脈血栓症之病患。<u>(112/3/1)</u></p> <p>2. <u>18歲以上</u>非瓣膜性心房纖維顫動病患,須符合下列條件之一: (102/2/1、103/5/1、105/5/1、111/2/1、<u>112/3/1</u>)</p>	<p>2.1.4.2.Rivaroxaban(如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、 103/5/1、104/12/1、105/5/1、 110/7/1、111/2/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. 靜脈血栓高危險(符合下列條件之一)病患,接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時,預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE),限用10mg 錠劑,每日一粒,人工髖關節手術術後治療,最多5週;人工膝關節手術術後治療,最多2週:</p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史(須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程)之病患;</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查(Venous ultrasonography)、靜脈攝影(Venography)或血中 D-dimer 檢測,診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患,須符合下列條件之一:(102/2/1、103/5/1、105/5/1、111/2/1)</p>

<p>(1)曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2)左心室射出分率小於40%。</p> <p>(3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4)75歲以上。(111/2/1)</p> <p>(5)<u>50</u>歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。(111/2/1、112/3/1)</p> <p>(6)每日1次，每次限1<u>粒</u>。</p> <p>(7)排除標準：</p> <p>I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</p> <p>II. 14天內發生中風。</p> <p>III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。</p> <p>IV. 有增加出血風險的情況。</p> <p>V. 肌酸酐清除率小於15mL/min。</p> <p>VI. 活動性肝病和懷孕。</p> <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞(103/5/1、104/12/1)：(略)</p> <p>4. Rivaroxaban 2.5mg 與 aspirin 併用，可用於發生缺血事件高危險族群之冠狀動脈(CAD)或症狀性周邊動脈疾病(PAD)病人，以預防動脈粥狀硬化血栓形成事件(Atherothrombotic events)：(110/7/1) (略)</p>	<p>(1)曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2)左心室射出分率小於40%。</p> <p>(3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4)75歲以上。(111/2/1)</p> <p>(5)<u>65</u>歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。(111/2/1)</p> <p>(6)每日1次，每次限1<u>顆</u>。</p> <p>(7)排除標準：</p> <p>I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</p> <p>II. 14天內發生中風。</p> <p>III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。</p> <p>IV. 有增加出血風險的情況。</p> <p>V. 肌酸酐清除率小於15mL/min。</p> <p>VI. 活動性肝病和懷孕。</p> <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞(103/5/1、104/12/1)：(略)</p> <p>4. Rivaroxaban 2.5mg 與 aspirin 併用，可用於發生缺血事件高危險族群之冠狀動脈(CAD)或症狀性周邊動脈疾病(PAD)病人，以預防動脈粥狀硬化血栓形成事件(Atherothrombotic events)：(110/7/1) (略)</p>
---	---

備註：劃線部分為新修訂規定

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自112年3月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)： Dabigatran(如 Pradaxa) (101/6/1、104/12/1、 107/9/1、111/2/1、 <u>112/3/1</u>)</p> <p>1. 用於非瓣膜性心房纖維顫動病患：(略)</p> <p>2. 用於靜脈血栓高危險病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。<u>(112/3/1)</u></p> <p>(1)須符合下列條件之一：</p> <p>I. 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史 (須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程)之病患。</p> <p>II. 經靜脈超音波檢查(Venous ultrasonography) <u>或</u>靜脈攝影(Venography) 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。<u>(112/3/1)</u></p> <p>(2)~(3) (略)</p> <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞： (107/9/1)</p>	<p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)： Dabigatran(如 Pradaxa) (101/6/1、104/12/1、 107/9/1、111/2/1)</p> <p>1. 用於非瓣膜性心房纖維顫動病患：(略)</p> <p>2. 用於靜脈血栓高危險病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。</p> <p>(1)須符合下列條件之一：</p> <p>I. 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史 (須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程)之病患。</p> <p>II. 經靜脈超音波檢查(Venous ultrasonography)、靜脈攝影(Venography) <u>或血中 D-dimer</u> 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>(2)~(3) (略)</p> <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞： (107/9/1)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定